





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3226/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3226/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3226/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3226/A

3226
A →

A-X-O-I

2

Aut Paris gel. 1-4.

generally in d. x.
post p. s. t. o. n. e. m.
p. o. u. r. z. a. d. i. s. p. o. s. i. t. i. o. n. e. m.

APH

HIP

M

Exqu

Et Sq

DOC

CON

S

COM

Pr

SENTE

M E

Opera

Apud L


42510
APHORISMORVM

HIPPOCRATIS COI
DISPOSITIVA

METHODVS .

Exquisito Doctrinæ Ordine
institu ta.

Et Segmentis quatuor comprehensa.



QVÆ

DOCTRINÆ MEDICÆ

CONSERVATA QVÆDAM EST

SYNOPSIS

COMPLECTENS ILLVSTRIORA

PRINCIPIS MEDICORVM


THEOREMATA

SENTENTIAS { *DIAGNOSTICAS.*
PROGNOSTICAS.

MEDENDI LEGES,

& *Decreta saluberrima.*

Opera & Studio I. Æ. MARIN. Doct. Medici.



PARISIIS,

Apud LVDOVICVM BOVLLENGER, viâ
Iacobæâ, sub signo S. Ludouici.

M. DC. XX XIX.

PHYSIOLOGIA

PROLOGUS

DISPOSITIO

METHODVS

PRINCIPALIS

INSTITVT

DE LEGIBVS

QVA

DOCTRINAE MEDICAE

CONSERVATA

SYNOPSIS

COMPLECTENS

PRINCIPALIA



REPERTORIUM

MEDICINAE

DE

PHYSIOLOGIA

PARIS

ANNO DOMINI

MDCCLXXII



D. D O M.

C. BOV V A R D

CHRISTIANISSIMI

REGIS LODOICI XIII.

Confiliario & Comiti Archia-
trorum Illustrissimo

FOELICITATEM PERPETVAM.



*ARA & exi-
mia fuit Ale-
xandro Ma-
gno (Comes Archiatro-
rum Illustrissime) ex tot
insignibus olim scriptori-
bus Homeri commenda-*

ā ij

EPISTOLA

tio , Scipioni Africano
Xenophontis , Augusto
Imperatori Virgilij , &
Alphonso regi Arrago-
num mira Tullij laus &
existimatio. Quo qui-
dam illustrium Autho-
rum censu & studio ,
Magni illi Principes ,
literis ornatissimi , prae-
clare videntur sanxisse,
vnius cuiusdam in qua-
uis disciplina ineundum
sibi ex plurimis euoluen-
dis Antesignani delectū,
in cuius eruditione Mu-
sarum studiosos elabora-

EPISTOLA.

re insigniter seduloq; im-
morari sit opera pretium.
Horum itaque exemplo
laudatissimo cuius lau-
ream Apollinis ambien-
ti sacre illius artis Anti-
stes, summusque Meden-
di Dictator Hippocrates,
maximè omnium enixè
perscrutandus, utpote
qui πολλῶν αἰτῶν ἑῶς ἀλλῶν, ἔ
solidiori scientia specta-
tissimus, laudem primam
merito consequatur, cu-
ius ad aram, tanquam
Limētini cuiusdam Dei,
omnis Medendi norma
ā ij

EPISTOLA.

attentè examinari de-
beat, adeoque huius Do-
gmata, velut summi in
arte Legislatoris atque
Ducis, excoli mereantur.
Istius autem salutiferæ
artis Genio, quia præ cun-
ctis familiariter te appli-
cas, Vir Illustrissime, nec
non eminenti eius doctri-
na in excelsum emicas,
disertè itidem ac velut è
suggesto præscribis, ut
omnes Medicinæ studiū
percurrētes ad eum haud
fallente luminis acie col-
liment scopum, & tua

EPISTOLA.

emulatione freti, magni
illius fluminis perennes
ortus adeant, cuius nem-
pè fontibus purissimis, po-
tius quàm Neotericorum
lacubus aut riuulis sit fas
oblectari; etenim

Dulcius ex ipso fonte
bibuntur aquæ.

An ijs reuera mysterijs,
quæ tu ex communi illo
Medicorū Apolline plus-
quàm alius hausisti, excultâ
peritiam supra cōmunem
sortem euehis? An istis
legibus Spartam quam
nactus es, Regia Maie-
a iiij

EPISTOLA.

*statis salutem foeliciter
 sospitem tueris atque con-
 tines? ac demum orna-
 tissimi ordinis sublimi
 fastigio sine fastu emines?
 Quibus ideo meritis ho-
 noris insignibus illustrem
 te magnopere suspicienti
 mihi, in votis fuit præ-
 clariora Diuini Senis de-
 creta & oracula, quæ te
 veluti meritissimum Va-
 tem agnoscunt, nomini
 tuo consecrare. Etsi enim
 quiddam duntaxat, vel
 tenuissimo ingenij filo cõ-
 textum, his meditari va-*

EPISTOLA.

leam, , quod à te versa-
tissimo, ne nummo qui-
dem plumbeo sit estimā-
dum (cū forsā impru-
dentius rei ornatissima
spero addere ornatum &
Apellæ Veneris tabu-
la quid elegantius imi-
tari:) Istud nihilominus
quamvis expenderim a-
deoque censoria animad-
versioni tuæ, me famæ
discrimine subiecerim:
hanc tamen aleam subij.
Optima namq; spes fuit,
te conatus nostros profi-
ciendique studium senili

EPISTOLA.

tua, & æquanimi prudentia spectaturum, qua, velut Palladis agide tutus, iudiciorum asperitatem, elatamque multorum despicientiam præterij, ut qui te unum fauentem habere Roscium, potius quàm totius theatri plausum referre maluerim.

Patiare itaque (Archiatrorum Comes Illustrissime) hoc leuidentse munus amplitudini tuæ, velut quoddam obseruantia meæ deuotissimæ

EPISTOLA.

monimentum sacrari,
haud renuentis sanè nec
inuiti Apollinis mihi spe-
cimen eximium: Ego
verò in gratiam, tam
splendida humanitatis
tuæ, præcellenti ingenio
claræque doctrinæ liquido
in te perfusa, ore Me-
nandri canam.

Ὡς ἰδοὺ συνέσθ' ἡμεῖς χριστοῦ τις κεχα-
ρισμένη.

Interim fœlix viue, &
ingentibus tuis erga Re-
gem, vniuersamq; Gal-
liam meritis excelsum

EPISTOLA.

*tibi nomen, & decus
augere non desine, cuius
haud nusquam*

Cultor studiosissimus
A. E. M.



AD LECTOREM
CANDIDVM,
DE
METHODI
HVIVS RATIONE
ET
INSTITVTO.
PRAE NOTIO.



LAROS artium In-
uentores, Cultoresque
eximios, adeo magni-
fica honoris commen-
datione prisca exorna-
uit ætas, vt non modo
foelicem illis *τῷ μα-*

Vigil. 6. x-
neid.

αἰωνίῳ sedem in amœnis Elysiorum spa-
tiis post vitam edixerit, sed præterea
multos tanquam Heroas in cœlum eue-
ctos, thuris honoribus dignata sit. Non
minori vero tum splendore claruere, Me-

*

AD LECTOREM.

dicinæ Mortalium fauissæ Authores ce-
leberrimi, Immortalium quoque censu
& cultu peramplè venerati; cùm nempe
Apollinem, primum illius opificem ex
cælituum ordine perennis fama cecine-
rit, eiusque filium altiori itidem & san-
ctiori honore coluerit. Nec mirum id
censeri debet cùm per se omnino sacra sit
Medendi disciplina. Quæ tanquam *Vita*
Servatrix inclita, *Natura auxiliatrix*
benenola, *Sanuatique Imperatrix &*
regina ad diuini Numinis præstantiam
propius cæteris accedit, & ideo humanæ
mentis vim Inuentricem altiori gradu
transcendit; vnde haud immerenter ar-
canorum eius scrutator sacrorumque
præsul *Ἰητῆς* dictus est *φίλοςφθ' ἰσό-*
δεφθ'. Huius vero impertitæ cælitus do-
ctrinæ salutiferæ, in artis primum Syn-
tagma speciemve conditæ, laurum in
æternum florentem retulit Diuinus Hip-
pocrates ab omnibus retro sæculis celebri
hoc diffusæ laudis nomine commenda-
tus, ac demùm Præniæ artis Mystæ sa-
cratissimi gloria perillustris, quippe qui
tanquam Naturæ genius acerrima dis-
quisitione mentis & obseruatione sagaci
huius adyta rimatus penitissimè, Primus
Medicinæ leges Naturæ consentaneas
fanciuerit, & post hominum memoriam
Edicta medendi saluberrima condiderit,
Rudiores etenim & informi specie de-
prehensam in natalitiis disciplinam, ex-
triuis ad Gymnasia reuocans, sic hono-

Hippoc. lib.
περὶ εὐ-
χημοσύ-
νης.

Plin lib. 36.

AD LECTOREM

rifice excoluit, ut doctis Musarum Exercitiis, literisque adiungere aggressus hanc ab humili ductam, ad insignem perfectionem euekerit. Scripsit vero & in obfignandis operibus eiusmodi fuit dictionis ratio, ut ἀσυνδέτω & conciso, attamen acuto dicendi stylo diuina animi sensa protulerit, & arguta breuitate, solidam doctrinam ac auctoritatem philosophicam sapere videatur, In eoque heroas & semideos imitari, quos aiunt ὑψιλόγως ἔμμεναι, loquendi maiestate verborumque pondere in dicendo valuisse, ut de hoc aptissime efferri queat, Quod ab Homero de Menelao proditum. Iliados 3.

ἐπιτοχάδην ἀρόρετε παῖδες
μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγύως, ἐπεὶ ἔ πο-
λύμιθ'.

Verum inter plurima, summi Medendi præsulis monumenta, cuncta equidem mirè suspicienda, non postremam mereri gloriam Aphorismorum libros, & inter germanos illius foetus primo censeri ordine, percrebuit, His namque non modo in verbis, genuina auctoris & in phrasi plane Homerica, locutio est conspicua, dictionisque concisa proprietates, sed & in eruditione dogmatum salutarium vbertas, grauitas sententiarum, præstantia iudicii, denique solidæ & antiquæ doctrinæ fulgent lumina, ut de his sermonem faciens Suidas dixerit eos οὗτοι εἰσι δυνάστητιν ὑπερβαίνον, Ne-

AD LECTOREM.

quicquam enim ex antiquorum scriptis facile est inuenire, quod adeo sit in ore omnium & ad incudem verum censeatur, atque *Aphorismi Hippocratis* ut etiamnum plerique cum rem aliquam tanquam verissimam asserere cupiunt, Aphorismis æquiparent. Tanta idcirco in Medicorum disciplina, his accessio sit atque dignitas, ut doctrinæ totius semina, mole quamuis exigua, viribus tamen ingentia, velut flosculi, ex amœnis Hippocraticæ scholæ hortis elegantissimi, velut saluberrimi fructus ex Medica lauri excerpti, denique tanquam gemmæ pretiosissimæ ex vasto medicinæ pelago erutæ æstimari mereantur; Quare cum percelebris adeo sint famæ atque pretii; sanè Hippocratis omnibus præclaris repertis spectabili dignitate præmittendi, eodemque numero, ac in Mathesi, Euclidis elementa perhibentur, & in cæteris disciplinis, Principia, Philosophorum axiomata, prudentum responsa, Legislatorum Decreta, virorum illustrium apophthegmata, sic in Medicinæ scientia censendi Aphorismi; A quibus scilicet præcipuis Artis theorematibus, vniuersæ medendi præcōs operibus, velut à sole lux oriatur & agendi certitudo accedat. Porro eiusmodi operum laudato artificio, Methodi dispositiue speciem dignum est expendere, quandoquidem arte sine methodo nil inertius omnisque disciplina splendorem methodi & gratiam, apte sibi de-

AD LECTOREM.

beat adsciscere, *πάσαι γὰρ τέχναι, ἃς Hippoc lib.*
μὴ μὲν αἰγροκέρδεϊς καὶ ἀγχιμοσύνης, περὶ εὐ-
κακείνοισι μέθοδ' ὅτις ἐοῦσα τεχνικὴ γχιμοσύνης
ἐργάζεταιται, In eo propterea, totius artis
 insigniori sermone, velut angusto quo-
 dam Systemate atque compendio, venit
 observatione dignissima, ut doctrinæ
 tam præcellenti sua constet venustas ele-
 ganti ordi ne concinnata. An vero ab
 Hippocrate in condendis Aphorismo-
 rum libris fuerit instituta, doctrinæ Me-
 thodus, lis est, inter eruditos, artisque
 præstantia etiamnum insignes viros,
 Galenus enim Methodi cultor omnium
 studiosissimus & Hippocratis Dogmatum
 Illustrator egregius, hanc in commenta-
 riis nullatenus aperuit, Quod procul du-
 bio honoris ergo minime siluisset, si quem
 ut artis ducem habuit, sic exactæ Metho-
 di textorem agnouisset, quinimo Hippo-
 cratem (ut & veteres) exquisitum ordi-
 nem aut nondum intellexisse, aut asper-
 natum fuisse asserit. lib. de fracturis:
 Cui sententiæ & magnæ vir authoritatis
 Mercurialis assentitur, qui nulla certa at-
 que continua & inter se commissa me-
 thodo digestos aphorismos, parum aut
 nihil connectaneos esse prodidit, sed eo
 modo ab Hippocrate exaratos, ut pro va-
 rietate rerum in praxi ultro incidentium
 longo usu compertarum in codicillos
 suos consignati fuerint, absque delectu
 & ordine. Alienæ autem ex aduerso, in-

in Præfat.
 aphor. & in
 aphor 4.

AD LECTOREM.

stiterent sententiæ, claræ notæ & conditionis insignes viri, inter quos videtur Heurnius, qui ab Hippocrate initam Methodum, in multis luculenter exhibuit, præsertim prima & tertia sectione ordinis quodam lumine adumbrata. Quod & Benedictus Bustamantes Hispanus suscepto opere promovere sustinuit, ac nuper modo Fogarolæus, qui Schematon artificio demonstrata methodo, inter omnes cuiusvis sectionis aphorismos ordinem veluti digito ostendere conatus est. Hisce autem virorum Illustrum dissidentibus iudiciis, si nostram fuerit fas innuere mentem, videtur sanè hoc ita componendum dissidium, ut omnis Methodi expertes & artificio ubique carentes aphorismos censere, factum videatur iniustius tanti viri existimationi atque laudi, cum ingeniosa & solerti Medicorum insignium indagine, fuerit quodammodo designata, neque enim velut cornix, aquilas prouocare aggredior, virosque doctos tanquam vano labore delusos incescere.

Verumtamen Galeni & Mercurialis, magis standum reor estimationi atque iudicio, qui nullam disciplinæ methodum exactam statamque in aphorismis Hippocratem affectum profitentur, ac interdum quidem videri ordinem, interdum vero nullum notari, omninoque nec Synthetice, analyticæ, aut definitivæ methodi exquisitam speciem observari, cum aphoristicas sententias, subiecti varii &

AD LECTOREM.

diuerso scopo scriptas, nec mutuo sensu
inuicem coherentes, simul & vniuer-
sim sectio quaelibet complectatur, eo mo-
do vt legenti cuius methodi studio
minime inter senecti, apteque consenti-
re videantur. Cum igitur sic clarè inno-
tescat, eximium Aphorismorum opus,
dispositionis lumine minus quàm deceat
præfulgere: At vero, caput artis sit, de-
cère, quod facias, & eleganti methodo
contexere, hoc propterea merito splen-
dori & ornatui asserendum esse duxi.

Verùm cum istud negotii, vulgari serie
atque ordine præclarè institui nusquam
possit, diuerso equidem aphorismorum
nexu, & artificio moliendum æstimavi.
Nec vero interim audaciæ sum insimu-
landus grauitè, apud Doctos, quod Hip-
pocratis Aphorismos peruertere aut tan-
quam peruersos arguere videar, Hip-
pocratis siquidem ab omni æuo traditum
ordinem laudo, & inuenta sapientum a-
nimi velut incitamenta complexus, in-
uentores honoris causa semper appello.
At duntaxat, si quid possim Aphorismis
illustrandis, hoc exili delineamento pro-
dere est animus & post tot præclare
commenta oculis omnium subicere,
(ἀνεωγμένα μὲν δὲ παλαιά,) Nec enim Suidas,
de posteris sic malè merita est natura
vt illis inuestigandi aliquid occasionem
præcluserit, & quamuis à veteribus
omnia pænè sint comperta, hoc sem-
per nouum fuerit, inuentorum ab

Seneca
epist. 64.

Methodus
& institu-
tum autho-
ris.

AD LECTOREM.

aliis scientia & dispositio

Porro hæc nobis est in eo Methodi dispositiua consilio propositi ratio, ut doctrinæ ordo, in digerendis Aphorismis exquisitus & artis Medicæ dispositioni à Galeno prodita, subiectique eius tradendi rationi congruus statuatur. Ad cuius scilicet exemplar belle expressa Medendi Decreta, artificiosè nexa diductaque cernantur. At verò cum de vniuersa Medicinæ obiecta materia Aphorismos minime agere liquido constet, sed duntaxat insigniori atque præcipua, nempe de Affectibus præternaturam & Consideratione Morborum huius ideo subiecti visa sic mihi habenda ratio in tradendi methodo, ut (quemadmodum in quavis arte fieri consuevit, primum Cognitio subiecti comparatur, tum demùm Operandi ratio circa subiectum instituitur) simili modo Morborum Cognitionem ianuentes Aphorismi primo in limine, Medendi scilicet Theoremata seorsim distincta, tùm vero Sententiæ tam Diagnosticæ quam Prognosticæ, suis classibus diremptæ, denique Curationem prodentes Diorismi, siue Medendi Leges serie collocentur, quo pacto non solum docendi norma, sed & agendi typo quævis disposita conspiciantur. Eiusmodi porro in genere constitutum ordinem, sic deinceps, in singulari subiecti cuiusvis mentione sum assecutus, ut sensus cognitione affinique complexu con-

AD LECTOREM.

nexos inuicem Aphorismos coniunxerim, & ad exquisitam intelligentiam è margine adnotatione breui illustrarim, data amplius opera vt latinus contextus sermone tersissimus eniteret, ad prolationem audiret suauius, & è Græcæ dictio- nis regione appositus cerneretur. Quæ sic obsignata artificii specie atque Me- thodo mira Diuini Senis doctrina, Iudi- cii vis atque præstantia, foelicius innotef- cer, & Synopsis quædam insigniorum artis medicæ præceptionum ob oculos versabitur, Cuius ductu tanquam certæ Cynosuræ, quicumque huic difficili & pulcherrimæ Arti noui Mystæ vela pan- dunt procinctu facili poterunt ad Hippo- cratis doctrinæ notitiam appellere. Hoc Methodi nimirum ordinato rerum situ & apparatu huius utili- tas. Topico menti affulgebit ad clariorem intelligentiam perspicuitas, memoriæ ad capiendum dexteritas, in Consiliis ine- undis optata ratio & autoritas, denique in Medendi Praxi, pro vsu postulante Aphorismorum inuentio facilis & expe- dita subiicietur. Desiderari quidem am- plius, in eo cœpto, veluti Colophonem, haud inficias ibo, qui nempe ex Ratione, cuilibet Aphorismo subiuncta imponi potuisset. Verùm hoc longè melius, ex- tot præclaris in Hippocratem Commen- tariis Medicinæ alumni quæsierint, istud nihilominus ex votis aliquando præstan- di expectatione (fauente numine) ductus, ni hæc opella à limine statim detrusa,

AD LECTOREM.

repulsam apud artis studiosos patiatur. Quandoquidem ideo charissimis philia-
tris noster hic vnicè sacratus labor, (ne-
que enim artis proceribus quid dignum
edidisse magnificè de me censeo) eos to-
to animo supplex hortor, vt pari affectu
& beneuolentia, qua hæc nostri studii
vouetur signatura, eâdem acceptam be-
nignè amplectantur, nec si minus ex cu-
iusque sententia cumulatè fecero, male
affecti criminentur.

Primitias dedimus, quas noster agellus
habebat,

Quales è tenui rure venire solent.

M O N I T V M.

PORRÒ Lectori beneuolo id aduer-
tendum velim, plerosque Aphorif-
mos diuersis locis & capitibus fuisse re-
petitos, atque vbi secundario reponuntur
Charactere vario fuisse notatos, hoc au-
tem de industria præstitum norit, quod
scilicet Aphorismi nonnulli, variis quas
complectuntur partibus ad diuersa inter-
dum subiecta spectare valeant, adeoque
multiplici loco possint aptè appositèque
reponi, nè Lectori toties ad reuoluendos
Aphorismos ad idem subiectum perti-
nentes fieret negotium. Deinceps quo-
que monuero me numerum Aphorismi
cuiusvis & sectionem è qua depromptus

AD LECTOREM.

est, Aphorismo cuilibet subiunxisse, primo equidem numero Aphorismi & secundo cuius sit sectionis designato, ut scilicet unicuique sit fas, hos in ordine Aphorismorum vulgato perquirere, & e proprio loco vestigare.

M E T H O D I A P H O R I S M O R U M

*Dispositiua Generalis Index,
hoc Schemate.*

Aphorismi
Hippocratis,

Nonnulli
spectant ad
Affectuum
Præternatu-
ram.

Cognitionem

Generalem tum

1. Affectuum præ-
ter naturam, in
Genere.

Particularem.

1. Affectuum præ-
ter naturam in
specie.

Vel

Ætiologiam

Diagnosim

Prognosim

Therapiam.

Medendi
Methodum

Quæ
Vniuersim
consistit in
duobus, Sco-
pis, à Medi-
co exequen-
dis Nempe.

Scopo Vitali. 1.

Conseruatione
Naturæ Virium.

Dietæ subsidio
molienda.

Scopo curatiuo.

1. Ablatione Af-
fectuum præter
naturam.

Per R E M E D I A
seu Contraria.

ineunda, quorum

Ætiologiam. { De Causis morbificis, at externis potissimum, tum etiam differentiis multis Morborum & Symptomatum. p. 1


Simioticen. de signis insalubribus. { **Diagnosticis** pauci in genere. p. 23
 { **Prognosticis.** { Prog. Criticis in genere. p. 30
 { Prog. Salutis & mortis. p. 40
 { Prog. Longitudinis & brevitatis, morbi. p. 61
 { Et signis Magnitudinis ac leuitatis, Morbi. p. 65

Affectuum partium internarum. { **Capitis.** p. 71
 { **Faucium.** p. 83
 { **Pectoris.** p. 85
 { **Abdominis.** p. 93
 { **Artuum.** p. 111
 { **Affectuum Mulierum** { **Non prænantium.** p. 114
 { **Prægnantium** { Vt prænantium. p. 118
 { Vt Affectibus aliis. cum viris communibus laborantium. p. 126

Affectuum externarum. { **Totius corporis, puta FEBRIVM.** p. 139
 { **Tumorum.** p. 128
 { **Vlcerum.** p. 132
 { **Vulnerum.** p. 155
 { De fracturis autem & luxationibus. Aphor. nulli. p. 147

Prima & præcipua, sunt CAUSARVM MORBORVM INTERNARVM REMEDIA, (nempe Contentorum Vitia corrigentia.) Et ex his præsertim humorum redundantiam **VASANTIA**, dicta Maiora Remedia, Puta { **Sang missio per venæsectionem.** p. 164
 { **Purgatio humorum qualitate vitiosorum, per Medicamentum.** p. 167

Alia Morbis ipsis, formaliter contraria, alia Symptomata graua, mitigantia. { **De quibus Aphorismi pauci.** p. 132



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

PROOEMIUM

OMNIVM

APHORISMORVM.



ITA BREVIS, Ars ve-
rò longa, occasio præ-
ceps, experientia peri-
culosa, iudicium diffici-
le. Non solum porrò, seipsum præ-
stare decet, necessaria peragentem,
sed & ægrum, & affidentes, & ex-
teriora.

Ο βίος βραχύς, ἢ ὁ τέχνη μακρὴ,
ὁ δὲ καμὸς ὀξύς, ἢ ὁ πείρα σφα-
λερὴ, ἢ ὁ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ ὁ μόνον
ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεόντα, δὴ-
λὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοὺς παρτέοντα,
καὶ τὰ ἐξωθεν.



METHODI
APHORISMORVM
DISPOSITIVÆ

SECTIO PRIMA.


COMPLECTENS DIORISMOS
& DOGMATA

Ad Aetiologiam spectantia;

*Ac praesertim de Causis Morborum Pro-
ca: arcticis, siue Rebus non Naturalibus,
Corporis nostri Symmetriam immutan-
tibus, agentia.*

PRÆFATIO

Et ducti à Causis exordij ratio.

APIENTER qui-
dē præscripsit olim
Biātes philosophus,
Νόμ, καὶ τὸ τε νόμῳ, hocque
edicto præclarè sanxit, eos,
qui

PRÆFATIO:

qui vel in virtutum actionibus probe instituendis studiosè inuigilant, vel optimarum artium quoddam genus excolunt, præuia quadam rei agendæ notitia debere auspicari: Quod sanè insigniter eos respicit, qui Arti medicæ, omnium illustrissimæ, suam dicarunt operam, quos scilicet præexistente cognitione, velut duce, huius discipline sacris initiari necesse est, ut salutiferam manum mortalibus sint fœliciter porrecturi. At vero cum rei cuiusque notio, maximè ex causarum inuestigatione pēdeat, nulliusque parari scientia pos-

é

PRÆFATIO.

fit, nisi per eas exploratè
quæsitæ sit. Sanè Medico,
Naturâ quidem primùm,
eamque cōstituentibus cau-
sis erudito, & morborum
demùm cognitionē medi-
tanti, Causarum in primis
quæ morbos concitant ob-
servatio præmittēda. A cau-
sis autem sic ducto exordio,
Causarum externarum seu
evidentium corpori nostro.
mox salubrium & insalu-
brium primas obtinet spe-
culatio. Quarum prior & in-
creandis morbis efficacior,
nobis obuiam prodit, CIR-
CUMFVSVS AER. Qui nēpè,
ab Hippoc. *lib. de Flat.* VI-
TAE ET MORBORVM CAU-

P R Æ F A T I O .

SA perhibetur. Vitę quidem
sanitatísque Causa conser-
uatric, eo quòd vita nostra
maximè nititur spiritibus,
hi autem ab Aëre respiratio-
ne ac transpiratione attra-
cto, velut pastu suo, refi-
ciuntur. Hoc verò præstat
munus, cum dispositione
constitutus est laudabili,
Qualitatum scilicet prima-
rum clemēti temperie, Sub-
stantiæ puritate, Motus cō-
uenientis agitatione, Ven-
torum lenium, suauitérque
spirantium aurâ diffusus;
Nullo vero interim inqui-
namentorum & contagij
feminum situ, nulla putre-
dinis corruptela, aut vligine

ē ij

PRÆFATIO.

est perfusus. Ex aduerso autem morborum Causa est effectrix, cum praua constitutione est affectus. Primo scilicet, Qualitatum primarum intemperie calidior est, vel frigidior, humidior aut siccior. 2. Consistentiæ vitio, putâ crassitie vel caligine obductus est. 3. Totius Substantiæ dissidio, cum putredinis lue, vel maligna pestilentique pernicië inquinatus. 4. Motu haud conuenienti, cum nimis concitatus est vel placidus. 5. Mutatione & alteratione varia & repentina, qua inæqualis fit & instabilis.

Hæc vero multiplex Aë-

PRÆFATIO.

ris, Cœlivè morbifica dispositio, plurimis de Causis in Aëre procreatur, quarū numero prior est, TEMPO-
RVM ANNI QVATVOR VNI-
VERSALIVM VARIA CON-
STITVTIO, Veris scilicet,
Æstatis, Autumni, & Hye-
mis, à Solis motu maximè,
syderūque nobilium ortu
& occasu distincta. 2. Cœli
particularis quædam tem-
pestas, serena aut imbrifera,
Australis vel Aquilonia, sy-
derum aspectu vario & in-
fluxu excitata. 3. REGIO-
NVM situs varius, à diuerso
Cœli partium respectu, ad
Orientem, vel Occidentem,
Meridiem aut Septentrio-

PRÆFATIO.

nem conuersus. 4. LOCI
cuiusdam particularis, seu
ciuitatis, seu domus, diuersa
positio, tum respectu Cœli
eodem modo; tum etiam
terræ (putâ ratione mon-
tium, edita vel depressa, vel
Aquarum vicinia, humida
& palustris, sicca vel areno-
sa.) 5. VENTORVM aura di-
uersa, Euri, Fauonij, Austri
& Aquilonis à diuersis Cœ-
li plagis efflata. 6. denique
Aëri perfusa INQVINAMEN-
TA aliena, siue sint conta-
gij semina, syderum mali-
gno influxu in aëra demissa,
siue halitus nidorésque pu-
tridi, inferius à terra, vel a-
qua, cadaueribus aut plan-

PRÆFATIO


tis corruptis supernè eleua-
ti. Quarum certè omnium
Aërem immutantium Cau-
sarum solennis magis , &
peruulgata est TEMPORVM
ANNI QVATVOR DIVERSA
CONSTITVTIO. Aër nam-
que per tempora anni variè
dispositus , corporis nostri
εὐρασίαν excellenter conti-
nentérque alterat , ex quo
Morborum soboles magna
solet oboriri.

Quare Hippocrates *lib. de*
Aëre , locis , &c. ab exor-
dio præcipit. QVISQVIS
MEDICAM VULT DISQVI-
RERE ARTEM , in primis,
ANNI TEMPORA CONSI-
DERET , QVÆNAM SCILI-

PRÆFATIO.

CET ET QVANTVM SINGV-
LA POSSINT. De his vero
doctè in Aphorismis, etsi
haud multa edisserit, cæte-
ras autem causas attigit lib.
de Aëre, locis, & aquis.

APHO-



APHORISMI

DE AERE PER TEMPORA ANNI
CAVSARVM EVIDENTIVM

Corpori nostro salubrium, insa-
lubriumve præsigniori.

ET DE
MORBIS VARIIS
Ab eius aduersa constitutione
prognatis.

PROÆMII VERO LOCO

*Aphorismus generalis, hinc Impositus; quo
statuuntur genera Causarum eviden-
tium insigniora, scilicet Aer
atque Diæta.*

NATURÆ quædam, &
ætates per alia tempora
& loca, & victus ratio-
nes, bona aut mala valetudine
constant.

Ex Aph. 3. sect. 3.

NATURARVM, quædam ad

A

CAVSARVM
evidentium
insigniores
statuuntur.

AER tã ra-
tione tẽpo-
rum, quam
locorũ, variẽ
dispositus, &
DIAETA di-
uersa, Qua-
rũ varietas
in specie,
quomodo
corporis aliq
cõstitutioni,
(scu naturæ,
scu etatis) sit
salubris, &
alia alteri in-
salubris, in-
fra docetur.

AER
PER TEM-

ORA ANNI
A. variè cō-
stitutus sta-
tuitur, CAV-
SA Sanitatis
aut Morbi,
pro diuersis
hominum
temperaturis.

Æstatem, quædam ad hyemem, be-
nè aut malè sunt constitutæ.

2. 3.

Τῶν φύσεων αἱ μὲν πρὸς θέρος, αἱ
δὲ πρὸς χειμῶνα εἴη ἡ κακῶς περὶναισι.

AER
PER TEMPO-
RA ANNI
VARIA, sta-
tuitur CAV-
SA modo sa-
nitatis ac
morbi, pro
diuersis æ-
tatibus, seu
ætatum tem-
peraturis.

PER TEMPORA VERO ANNI;
Vere quidem & prima æstate, Puc-
ri, & his ætate proximi, degunt,
valentque maximè: Æstate verò
& Autumno ad aliquam vsque
partem Senes: reliquo Autumno &
Hyeme mediam ætatem agentes.

18. 3.

Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τὰ μὲν ἥρος καὶ
ἄκρῃ τῇ θέρεσσι, οἱ παῖδες, καὶ οἱ νε-
τέων ἐχόμενοι τῇσιν ἡλικίῃσιν αἰετὰ τε
διάρουσι καὶ ὑγιαίνουν μάλιστα. Τῇ δὲ
θερεσσι καὶ τῇ φθινοπώρῃ μέγιστον μὲν πνός,
οἱ γέροντες. τὸ δὲ λοιπὸν τῇ φθινοπώρῃ καὶ
τῇ χειμῶνι, οἱ μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσιν.

AER
PER TEMPO-
RA ANNI
variè dispo-
situs, CAUSA
est, tū Mor-
borum effe-
ctrix, si tem-
pora sint si-
milis cum

MORBORVM alij ad alia tempo-
ra bene aut male se habent, & quæ-
dam ætates, ad alia tempora & lo-
ca, & victus rationes.

3. 3.

Τῶν νέσων ἀγαθὰ πρὸς ἀγὰς εὖ ἢ κακῶς
πεφύκασι, καὶ ἡλικίαι πινὲς πρὸς ὥρας, καὶ
χῶρας, καὶ διαίτας.

IN CONSTANTIBVS TEMPORI-
BVS, cum tempestiuè, tempestiua
fiunt, morbi stabiles & boni iudicij
accidunt. Inconstantibus autem,
instabiles & mali iudicij.

8. 3.

Ἐν τοῖσι κατεσθῆσι καμνοῖσιν ἡ ὥρα ὡς
καὶ ὥρα ἀποδιδῶσιν, ἐν σαθέες καὶ ἐν κρι-
νέες αἱ νέσοι γίνονται. Ἐν δὲ τοῖσιν ἀκατα-
στάτοισιν, ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι.

MVTATIONES TEMPORVM,
maximè pariunt morbos, & in ipsis
temporibus magnæ Mutationes
frigoris aut caloris, & alia pro si-
mili ratione.

I. 3.

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρων μάλιστα τικ-
τεσι νοσήματα, καὶ ἐν τῇσιν ὥρῃσιν αἱ με-
ταβολαὶ μέγιστα ἢ φύξις ἢ θάλαψις,
καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λόγον ἔτως.

A ij

morbis intē-
periei ; iūma
Curatrix, si-
ue Remediū,
cū tempora
sunt Morbo-
rum intēper-
iei cōtraria.

CONSTITV-
TIO STATA
TEMPORVM
ANNI in tem-
perie sua,
CAUSA est
tum genitrix
morbōrū
miliū, ac
boni moris;
tum Causa
facilis solu-
tionis & bo-
ni iudicij,
MVTATIO
vero & in-
constantia ē
contra.

MVTATIO-
NES ANNI
TEMPORVM
seu intem-
peries Ma-
gnæ, & præ-
sertim Calo-
ris aut Fri-
goris, sunt
CAUSAE
morbōrum
præcipuæ.

MUTATIO-
NES quoque
que altera-
tiones diur-
næ, Caloris
& frigoris.

CAUSAE
sunt morbo-
rum similiū
nempe inæ-
qualium.

CONSTITU-
TO SICCA,
temporum
humiditati
collata, causa
est minus in-
salubris.

IN TEMPORIBVS, cū eod-
em die, modo calor, modo fri-
gus fit, Autumnales morbi expe-
ctandi.

4.3.

Εν τῇσιν ὥρῃσιν ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέρας
ὅτε μὲν δάλπος, ἐτε δὲ ψύχθῃ γίνηται,
φθινοπωρινὰ τὰ νουσήματα προσδέχεται
χρῆ.

EX TEMPESTATIBVS ANNI,
in vniuersum siccitates sunt imbri-
bus salubriores, & minus mortife-
ræ.

15. 3.

Τῶν δὲ χατὰ σασίαν τῆ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν
ὅλον οἱ αὐχμοῖ τῆς ἐπομβριῶν εἰσιν ὑμ-
εινότεροι, καὶ ἥσσον θανάτωδες.

MORBORVM
species Quo-
uis tempore
grassantes.

Et Primo
MORBI siccitate immodi-
ca temporū,
excitari soli-
ti.

PER SICCITATES (magnas)
febres acutæ fiunt. Quod si annus
magna ex parte talis fuerit, qua-
lem tēporis statū effecerit, tales vt
plurimum morbi expectandi.

7.3.

Εν τοῖσιν αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γί-
νοντο. Καὶ ὡς μὲν ἐπὶ πλέον ἢ τὸ ἔτος
τοιοῦτον ἐόν, οἷον πλεονάζουσιν ἐποίη-
σεν, ὥς ὅπου πολλὰ καὶ τὰ νουσήματα τοιαῦ-
τα δεῖ προσδέχεται.

MORBI ab
humiditate
nimia tem-

PER ASSIDVOS IMBRES, Morbi
fere fiunt, febres longæ, alui pro-
fluua, putredines, epilepsia, apo-

DE ÆTATIBVS.

plexiæ. PER SICCITATES VERO, Morbitabifici, ophthalmiæ, arthritides, stranguriæ, dysenterici. 16.3.

porum pro-
creari soliti.

Νοσήματα ὅ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομβείησιν
ὡς τὸ πολλὰ γίνεσθαι πυρετοὶ τε μακροὶ, καὶ
κοιλίης ῥύσιες, καὶ σηπεδόνες, καὶ ἐπίλη-
πτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυστικαὶ ἐν ὅ τοῖς
σιν αὐχμοῖσι, φθινώσεις, ὀφθαλμῖαι,
ἀρθρίπιδες, τραγγεῖαι, καὶ δυσεντεῖαι.

AVSTER auditū hebetat, caligi-
nem visui obducit, caput grauat,
corpus pigrum & languidum red-
dit: Cū itaque hic dominabitur,
talīa in morbis ægroti patiuntur. Si
vero aquilonia fuerit tēpestas, tuf-
ses fiunt, faucium asperitates alui
duræ, dysuriæ, horrores, laterum
& pectoris dolores; Cum itaque
hæc dominabitur, talīa in morbis
expectanda.

MOTVS AE-
RIS SIVE
VENTI, VE
aërem alie
rando, Cau-
sam Morbi-
ficā, efficiat,
& MORB-
ab aëre huius
alterato
progeniti,
Et præsertim
ab auditio &
aquilone or-
ti.

§. 3.

Νότοι βαρυήκοι, ἀχλυώσεις, καρμβα-
εικοὶ, νωθροὶ διδυπκοὶ, ὀκότες ἔτος δυ-
νας δὲ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσισι πά-
χυουσιν. Ἦν ὅ βορειον ἢ, βῆχες, φάρυγγες,
κοιλίαι σκληραὶ, δυσουεῖαι φεικώσεις,
ὀδυῖαι πλῆθύνων, σηπείων. ὀκότες ἔτος
διωασεύη, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσισι
προσδέχονται.

A iij

MOTVS AË-
RIS DIVINI,
feu Cæli sta-
tus à ventis
diuersis affe-
cti, tum Cō-
moda, tum
Morbi & in-
commoda :
puta Cæli
status Aquil-
lonij ac Au-
strini.

QVOTIDIANÆ AVTEM CON-
STITVTIONES Aquiloniæ qui-
dem cogunt corpora, firma & agi-
lia, benè colorata, & auditu valen-
tiora reddunt, aluum siccant, ocu-
los mordent, Et si pectus, dolor ali-
quis prius habuerit, magis exaspe-
rant: At Austrinæ dissoluunt cor-
pora & humectant, auditum hebe-
tant, caput grauant, vertiginem
oculis, tarditatem corporibus affe-
runt, aluum humectant. 17. 3.

Αἱ δὲ καὶ ἡμέριαι καταισσεις, αἱ μὲν
βόρειοι τὰτε σώματα σικνωσῶσι, καὶ ἀπο-
να, καὶ ἐνκίνητα, καὶ εὐχρεα, καὶ ἐνυκοῦτε-
ρα ποιεῖσι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι, καὶ
τὰ ὄμματα δάκνουσι, καὶ πρὸς τὸν θώρακα
δύνημα ὡς πὺρ πυρῶν μᾶλλον ποιεῖ-
σιν. Αἱ δὲ νότοι διδύμουσι τὰ σώματα καὶ
ὕγραίνουσι, καὶ βαρυκοΐας, καὶ καρδιαίας
ποιέουσιν, καὶ ἰλίχθας ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖ-
σι καὶ τοῖσι σώμασι δυσκίνησίην, καὶ τὰς
κοιλίας ὑγραίνουσι.

Aphor. ge-
ralis,
MORBOS O-
anis gene-
s, omni tē-
ore genera-

MORBI QVIDEM OMNES,
in omnibus temporibus fiunt. Non-
nulli tamen horum in quibusdam
ipforum magis fiunt & irritantur.

19. 3.

Νοσήματα δὲ πάντα μὲν ἐν πάσῃσι
τῇσιν ὥρῃσι γίνεθ· μᾶλλον ὃ ἐνία καὶ
ἐνίας αὐτέων καὶ γίνεθ καὶ παροξύνεθ.

ri. Attamen
quasdam spe-
cies magis
in certis tē-
poribus ob-
oriri.

VERE QUIDEM, furores, me-
lancholiæ, epilepsiæ, hæmorrhagiæ,
anginæ, grauedines, raucedines,
tussis, lepræ, impetigines, vitiligi-
nes, & pustulæ ulcerosæ plurimæ,
tubercula, & articulorum dolo-
res.

Primo
MORBORVM
SPECIES, ve-
re tempesti-
uo grassan-
tes, tam huic
cognati, quā
alieni.

20. 3.

Τὴ μὲν γὰρ ἡσθ τὰ μανικὰ καὶ τὰ με-
λαγχολικὰ, καὶ τὰ ὀπιλητικὰ, καὶ αἵμα-
τος ῥύσιες, καὶ κυῶσται, καὶ κόρυζαι, καὶ
βράγχαι, καὶ βήχες, καὶ λέπροι, καὶ λευχῶες,
καὶ ὄφθοι, καὶ ξανθήσιες ἐλκώδεις πλείσται,
καὶ φύματα, καὶ ἀφθριπικὰ.

ÆSTATE VERO, nonnulli horum,
& febres continuæ & ardentes, &
tertianæ plurimæ, & quartanæ, vo-
mitiones item & alui profluuia,
ophthalmiæ, & aurium dolores,
oris ulcerationes, genitalium pu-
tredines & sudationes.

2.
MORBI ÆS-
TIVI, tam
propriij, quā
alieni.

21. 3.

Τὴ δὲ θέρῃ ἐνιά τε τετέων, καὶ πυ-
ρετοὶ ξυνοχέες, καὶ καῦσοι καὶ τειπαῖοι
πλείσται, καὶ τελαπαῖοι, καὶ ἔμετοι, καὶ διάρ-

A iiij

APHORISMI

ῥοιαι καὶ ὀφθαλμῖαι, καὶ ὠτῶν πόνοι, καὶ σμάτων ἐλκώσεις, καὶ σηπεδόνες αἰδοῖων, καὶ ἰδῶα.

3.
MORBI AUTUMNALES
tam consen-
tanci, quam
alieni.

AUTUMNO VERO; etiam multi morbi æstiuī fiunt, & febres quartanæ & erraticæ, lienis tumores, hydropes, tabes, stranguriæ, lienterix, dysenterix, coxæ dolores, angina, asthmata, voluuli, epilepsix, furores, melancholiæ.

22. 3.

Τῷ ὃ φθινοπώρῃ καὶ τῷ θεινῶν τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι καὶ πλάνη-
τες, καὶ σπληνῆνες, καὶ ὕδρωπες, καὶ φθίσεις, καὶ
σπληνεῖαι, ὃ λειεντεῖαι, καὶ δυσεντε-
εῖαι, καὶ ἰσχάδες, καὶ κυστέχαι, καὶ αἰματὰ
καὶ εἰλεοὶ, καὶ ὀπιληψίαι, καὶ τὰ μανικὰ, καὶ τὰ
μελαγχολικὰ.

AUTUMNVS tabidis noxius.

10. 3.

Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσι κακόν.

Autumnus
veri collatus
insalubrior
est, & Mor-
borum le-
thalium fe-
tax.

AUTUMNO, in vniuersum Morbi acutissimi & exitiosissimi fiunt; Ver autem saluberrimum, & minime exitiale.

9. 3.

9 Ἐν φθινοπώρῃ ὀξύτατα γίνονται καὶ

APH. DE CAUSIS. 9.

θανάτω δέσσει τὸ ἐπίπαι. Ἡρ' ὁ ὑγιαίνων, καὶ ἡκιστα θανάτω δέσσει.

HYEME pleuritides, peripneumoniae, lethargi, grauedines, raudines, tusses, pectoris, laterum, & lumborum dolores, cephalalgiae, vertigines, apoplexiae.

4.
MORBI
HYEMALES
propriè ac
familiares.

23. 3.

Τὰ δ' χειμῶν, πλῆειπδες, οἰστρομονίαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βρογχί, βήχες, πόνοι σπλάχνων, καὶ πλῆθει, ἰσχυρὸς κεφαλαλγία, ἱλιγγοί, σποπληξίαι.

INTER ANNI PARTES, si hyems frigida & aquilonia fuerit, ver autem pluuiosum & australe, necesse est febres acutas aestate fieri, & ophthalmias, & dysenterias, mulieribus praesertim & viris natura humidioribus.

MORBORVM
SPECIES TEM-
poribus in-
constantibus
& intempe-
ratis obortas
ac Primo, in
antithesi
hyemis &
veris, con-
tingentes.

II. 3.

Περὶ δ' αὖτ' ὥρεων, ὡς μὲν ὁ χειμῶν ἀνυχμῶς καὶ βόρειοι κρύηται, τὸ δ' ἔαρ ἐπομβρὸν καὶ νότον, ἀνὰ κη τὰ δέρεσσι πυρετὸς ὀξεία καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα δ' τῇσι γυναιξὶ, καὶ ἀνδράσι τοῖσιν ὑγροῖσι τὰς φύσεις.

2.
MORBI, in
cōtraria an-
rithesi veris
& hyemis,
excitati,

SI VERO AVSTRALIS HYEMS & pluuiosa clemēnsque fuerit, ver autem siccum & aquilonium: Mulieres quibus partus in ver incidit, quāvis occasione abortiunt: Quæ verò pepererint, imbecillos & morbosos fœtus edunt, ita vt vel statim intereant, vel tenues & valetudinarij viuant; Alijs autem Mortalibus, dysenterix, & ophthalmix sicca fiunt, & senibus catarri, breui interimentes.

12. 3.

Ἦν ὃ νόπθ' ὁ χειμὼν καὶ ἐπομβρεὶς
καὶ ἄριος ἡνιόχ, τὸ δ' ἐὰν αὐχμηρὸν καὶ
ἑσπεριον, αἱ μὲν γυναῖκες ἥσιν οἱ τόκοι
πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης περὶ αἰσίου ἐκπ-
τρώσκουσιν· αἱ δ' αὖ τέκουσιν, ἀκράτεια
καὶ νοσώδεια τὰ παῖδια πίκτουσιν, ὥστε ἢ
παρεντίχει ἀπολλυμένῃ, ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεια
ζῶν ἔόντα. Τοῖσι δ' ἀνδράσι δυσεντερίαι,
καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γίνονται. τοῖσι δὲ
πρεσβυτέροις κατάρροι σιωτόμως ἀ-
πολλόντες.

QVVM ÆSTAS fit similis veri,
sudores in febribus, multi, sunt ex-
pectandi.

6. 3.

Ὁ κόπας δὲρ Θ' ἁλῆται ἥει ὁμοιον, ἰδρω-
τας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς πρὸς δέ-
χας χή.

SI VERO ÆSTAS aquilonia &
ficca fuerit, Autumnus autem plu-
uiosus & australis, dolores capitis
hyeme fiunt & tussis & raucedines,
& grauedines, nonnullis verò tabes.

Tertio,
MORBI, in
antithesi æ-
statis & au-
tumni exor-
tari soliti.

13.3.

Ἡ δὲ τὸ δὲρ Θ' αὐχμηρὸν καὶ βόρειον ἁλῆται,
τὸ δ' ἐφ' ὅσον πρὸς ἐπομβρὸν καὶ νότον, κε-
ρδαίηται ἰσχυρὰ ἐς τὴν χειμῶνα γίνονται, καὶ
βήχες, καὶ βρογχίτις, καὶ κόρυζα, ἐνίοισι δ' καὶ
φθίσεις.

SI VERÒ AUTVMNVS aquilonius
& ficcus fuerit; natura humidis &
mulieribus cōfert. Aliis autem oph-
thalmiæ siccae & febres fiunt partim
acutæ, partim longæ, grauedines
diuturnæ, quibusdam melancholiæ.

Quarto,
MORBI, in
alia antithe-
si Æstatis &
Autumni
procreati.

14.3.

Ἦν δ' ὁ βόρειος ἢ καὶ αὐτὸν, τοῖσι μὲν
ὕδατος ἐξίτηται φύσις καὶ τῇσι γυναι-
ξὶ ξύμφορον. Τοῖσι δ' λοιποῖσιν ὀφθαλ-
μίαι ἐξίστανται ξηρὰι, καὶ πυρετοὶ ὀξείες καὶ
χρόνιοι, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι.

A P H O R I S M I N O N N V L L I

De causis quibusdam morbi-
ficis, externè quoque cor-
pori occurrentibus.

*Et præsertim Calore, & Frigore nimio-
alterantibus, velut Aqua corpori
perfusa, ac Medicamentis admotis.*

MORBI
NONNVLII,
AC SYMPTO-
MATA, A
Causis exter-
nis Calidio-
ribus inusta.

CALIDVM, frequentiore vsu,
hæc affert incommoda; car-
nium effcimationem, neruorum
incontinentiam, mentis torporem,
sanguinis profusiones, animi deli-
quia, ad quæ quidem mors. 16. 5.

Τὸ θερμὸν βλάπτει τὰ πάντα τοῖσι πλεον-
εξίαις χρεομενοῖσι· σαρκῶν ἐκδήλωσιν,
νέκρωσιν ἀκράτεια, γλώττης νάρκωσιν, αἱ-
μορραγίας, λεηπεδυμίας. τὰ πάντα οἷσι θανά-
τος.

E cōtra Ca-
lesfacientia
moderatè,
seu calori
nostro ana-
loga: Præ-

CALIDVM suppurationem fa-
ciens (non tamen in omni vlcere)
maximum securitatis est indicium,
cutem mollit, extenuat, dolorem

lenit rigores, conuulsiones, tetanos
mitigat, capitis grauitatem soluit,
ossibus fractis plurimum prodest,
maximè denudatis, & his multo
magis qui in capite vlcera habent,
hisque etiam que moriuntur aut
vulnerantur à frigore, herpetibus
denique exedentibus, sedi, puden-
do, vtero, vesicæ. His omnibus Ca-
lidum amicum & decretorium:
Frigidum inimicum & perimens.

Præsidia
sunt, Mor-
borum mul-
torum &
symptoma-
tum Curati-
ua.

22. 5.

Τὸ θερμὸν ἐκ πυητικὸν, ἐκ ἐπὶ παντὶ
ἐλκει, μέγιστον σημεῖον εἰς ἀσφαιδίαν,
δέρμα μαλάσσει, ἱσχυαίνει, ἀνώδυνον
ρίγαν, σπασμῶν, τετάνων παρηγορη-
τικόν. πλὴν ὅτι ἐν τῇ κεφαλῇ καρηθεαίαν λύφ-
πλείστον καὶ διαφύει ὁσέων κατὰ μαστ. μά-
λιστα ὅτι ποῖσιν ἐψιλομήνοισι. τετέων ὅτι
μάλιστα ποῖσιν ἐν κεφαλῇ ἐλκεα ἔχουσι.
καὶ ἰκόσα ὑπὸ ψύξι. ὁ δὴν ὁσέων ἔλκεα ὅτι καὶ
ἐρπυστιν ἐψιλομήνοισιν, ἔδρη, αἰδοίω, ὑστ-
ρη, κύττι, τετέων τὸ θερμὸν φίλον καὶ
κεῖνον, τὸ ὅτι ψυχρὸν πολέμιον καὶ κλεῖνον.

FRIGIDVM VERO conuulsiones,
tetanos, nigrores, & rigores feбри-
les efficit.

17. 15.

MORBI non-
nulli & sym-
ptomata:
Ab immo-
dicè Refri-
gerantibus
orta,

Τὸ δὲ ψυχρὸν ἀσπασμὸς, τετάνυσ, με-
λασμὸς, καὶ ῥίγη πύρετάδεα.

FRIGIDUM, vlceribus mor-
dax, cutem obdurat, dolorem in-
suppurabilem facit, nigrores, rigo-
res febriles, conuulsiones, & di-
stensiones. 20. 5.

Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δερ-
μα πεισκληρύνει, ὀδυῖν ἀνεκπύητον
ποιεῖ, μελασμὸς, ῥίγη πύρετάδεα,
ασπασμὸς, καὶ τετάνυσ.

Quæ partes
ab immo-
dè frigidis,
magis offen-
dantur.

FRIGIDA, velut nix & glacies,
pectori inimica, tussis mouent, san-
guinis fluxiones & destillationes.

24 5.

Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιῶν κρύσταλλος, τὰ
σηδεῖ πολεμια, βηχέων κινητικὰ, αἰμορ-
ροϊκὰ, κατὰ ῥοϊκὰ.

Quæ partes
Calore mo-
derato ma-
ximè recre-
entur.

FRIGIDUM inimicum ossibus,
dentibus, neruis, cerebro, spinali
medullæ: Calidum verò amicum.

18. 5.

18. Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ἐστίσιν, ἡ δὲ
σι, νδέρσι. ἔλκεδὼ, νοπείῳ μυελῷ τὸ
δὲ δερμὸν ὠφέλιμον.

APHORISMI

DE CÆTERIS

MORBORVM CAUSIS,

evidentibus, seu Rebus non natura-
libus immoderatis, scilicet
Cibo & Potu, &c.

Non satietas, non fames, nec
aliud quicquam, quod natu-
ræ modum excedit, bonum.

2. 4.

Primò,
Cibi ac po-
tus nimia
copia vel
paucitas,
MORBORVM
CAUSAE.

Ὅς πλησμονῇ, ἢ λιμὸς, ἢ δ' ὅς ἐδὲν
ἐξαδὸν, ὅπ' αὖ μᾶλλον τῆς φύσεως ἢ.

Vbi præter naturam ingestus est
copiosior cibus, hic morbum facit;
indicat autem sanatio.

17. 2.

Ὅς αὖ ἔσθ' ἢ παρὰ φύσιν πλείων ἐσέλ-
θῃ, τὴν νῆσον ποιεῖ· δηλοῖ δ' ἡ ἴησις.

Somnus & vigilia, vtraque mo-
dum excedentia, morbus.

71. 7.

2. Somnus
& vigilia
immodera-
ta, MORBO-
RVM CAU-
SAE.

Ἵπνός, ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω μᾶλλον
τὸ μετεῖν γινόμενα, νῆσοι.

3. In omni Motu corporis, cūm fa-
 MOTVS CORP. tigari cœperit, quies statim lassitu-
 PORIS IM. dinem leuat, (seu quiescendum).
 MODICVS.

Qui nempe
 defatigat. fit
 MORBI CAV-
 SA nisi quie-
 te leuetur.

48.2.

Εν πύση κινήσει τὸ σῶματος, ὁκόταν
 ἀρχῇται πονέειν, τὸ διαναπαύειν διδύς,
 ἀκοπὴν.

Intempesti-
 uus quoque,
 tempore fa-
 mis etiam
 MORBI CAV-
 SA.

Vbi fames, laborandum non est.

16.2.

Ὁκελιμὸς, ἔδει πονέειν.

4.
 EXCRETIO
 seu vacuatio
 excremento-
 rum, præfer-
 tim per al-
 ium in qui-
 bus bene fit.
 SAN. TATIS
 EST CAUSA.

E contra
 RETENTIO,
 paucæ vè ex-
 cretio, EST
 MORBI CAV-
 SA.

Quibus alius est humida, si qui-
 dem iuuenes sint, melius degunt,
 quam quibus est sicca: At in sene-
 ctute deterius degunt; senescenti-
 bus enim vt plurimum resicca-
 tur.

53.2.

Ὁ κόσι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι, νέοι
 μὲν ἔντες, βέλπον ἀπαλλάσσουσι τῶν
 τὰς ξηρὰς ἔχοντων. ἐς δὲ τὸ γῆ-
 ρας, χεῖρον ἀπαλλάσσει ξηραίνον-
 ται γὰρ ὡς ὅπῃ τὸ πολὺ τοῖσιν ἀπογῆ-
 ραίκεται.

Plurimum

Plurimum ac repente vacuare, replere, calfacere, refrigerare, aut alio modo corpus mouere, periculosum; Omne siquidem nimium, naturæ est inimicum; sed quod paulatim fit, tutum est, præsertim cum ab altero ad alterum fit transitus.

§1. 2.

Τὸ κατὰ πολὺ καὶ ξαπίνης κενουῶ, ἢ πληροῶ, ἢ θερμαίνω, ἢ ψύχω, ἢ ἄλλως ὁκωσοῦ τὸ σῶμα κινεῖν, σφοδρὸν. Καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. Τὸ δὲ κατ' ὀλίγον, ἀσφοδρὸν, καὶ ἄλλως ὡς τις ἐξ ἑτέρου ἐφ' ἑτέρου μεταβάλλῃ.

Si metus & tristitia longo tempore perseuerent, melancholiam progenerant.

23. 6.

Ἦν φόβος καὶ δυσθυμία πολὺν χρόνον διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ ποιεῖτον.

Porro de causis morborum internis, (nempe contentorum in corpore humorum vitiiis) nihil statutum in Aphorismis, nisi dumtaxat De præcipuis eorum generibus, scilicet repletione & inanitione generatim.

Aph. 21. 2.

B

Sic & VACUATIO horum copiosior & repentina, pariter MORBIFICA: Nec non & REPLETIO nimia alimentorum, itidemque ALTERATIO magna & subitanea, præsertimque caloris & frigoris naturæ grauis atque molesta.

§.
PASSIONES item ANIMAE immoderate, sūt MORBORUM CAUSAE, V. G. Metus & tristitia Causa Melancholiae

APHORISMI
DE ÆTATIBVS,
EARVMQVE MORBIS VA-
riis subiuncti.

IN censu Causarum morborum,
evidentium agitur de ÆTATI-
BVS seu vitæ variis temporibus, id-
eo quod, etsi, nec per se & imme-
diatæ sint MORBORVM CAUSÆ;
horum tamen OCCASIONES cen-
seantur, quod earum decursu, Cor-
poris partium & humorum Cra-
seus naturalis varia contingat mu-
tatio; Tam à Causa interna, nempe
Caloris natiui energia, quæ tempe-
riem viuentis calidam humidam
ab ortu ad senium continenter im-
mutat; Quàm ab externa, scilicet
Victus ratione ferè diuersa & pe-
culiari, per Ætates; quibus de cau-
sis inducta temperamenti alteratio,
Causa demùm est proxima; cur
certi morbi, in quavis ætate sobo-
lescant.

Secundum ætates verò, Hæc accidunt PARVIS ET NVPER NATIS, oris vlcera, vomitiones, cusses, vigilæ, pauores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates. 24.3.

MORBI &
SYMPTOMA-
TA infantia
tenellæ.

Εν ᾧ τῆσιν ἡλικίῃσι τοιάδε συμβαίνει τοῖσι μὲν μικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδιοῖσιν ἄφθαι, ἔμετοι, βήχες, ἀρρυθμίαι, φόβοι, ἐμφυγὲ φλεγμοναί, ὥτων ὑγρότητες.

DENTITIONIS TEMPVS ATTINGENTIBVS gingiuarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maximè, cùm caninos edunt dentes, & præsertim pueris crassissimis, & aluum durum habentibus. 25.3.

MORBI &
SYMPTOMA-
TA infantes
circa denti-
tionem infes-
tantis.

Πρὸς ᾧ τὸ ὀδοντοφυεῖν προσάγειται τῶν ἰδαξιμοῖ, πυρετοῖ, πνευμοῖ, διάρροια, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνάγῃ τὰς κυνόδοντας, καὶ τοῖσι παχυτάτοις καὶ παῖδων, καὶ τοῖσι σκληρὰς τὰς κοιλίας ἔχουσιν.

GRANDIVSCVLIS VERO TACTIS, tonsillarum inflammationes, vertebræ in occipitio introrsum luxationes, asthmata, calculi, lumbrici ro-

Pueritiæ
MORBI &
SYMPTOMA-
TA.

20. APHORISMI
tundi, ascarides, verrucæ penfiles,
satyriasmī, stranguriæ, strumæ, &
alia tubercula, præcipuè vero an-
tedicta. 26.3.

Πρεσβύτεροις ὃ ἡμορροίοις παύει-
μα, σπονδυλὸς τῆς χῆλιδος τὸ ἐνὶ ὀφθαλμῷ ὥστες,
ἄσκαριδες, λιθιάσεις, ἐκ μινδὲς σπογγύλαι,
ἀσκαρίδες, ἀκροχορδόνες, στυπιασμοί,
σπαραγγείαι, χοιράδες, καὶ τὰ διὰ φύματα,
μάλιστα ὃ τὰ περιεργημένα.

MORBI ET
SYMPTOMA-
TA Puber-
tum.

GRANDIORIBVS AVTEM AD-
HVC, ET AD PUBERTATEM ACCE-
DENTIBVS, plurimi ex his, vt febres
diuturnæ magis, & ex naribus san-
guinis fluxiones. 27.3.

Τοῖσι ὃ ἐπὶ πρεσβυτέροις, καὶ πρὸς
πᾶσι ἡ βίωσις ἀσθενέστατη, τῶν τε τὰ πολ-
λὰ καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μάλιστα, καὶ ἐκ ῥι-
νῶν αἵματι ὁ ῥύσας.

Prognosticū
Criticum,
termini &
olutionis
Morborum
u uirorum
ueris ob
ngentium
delict: A.

PVERIS AVTEM, plurimi Mor-
bi iudicantur: Alij in quadraginta
diebus, alij in septem mensibus,
quidam in annis septem: nonnul-
li vero ipsis ad pubertatem pro-
gressis. Qui vero pueris permanse-

runt, neque circa pubertatem soluti fuerint, aut foeminis circa mensium eruptionem, in uetera scire consueverunt.

liorum, die
quadragesi-
mo quorun-
dam anno
septimo,
Nonnullorū
pubertatis
tempore &
fenelis,
circa mensū
eruptionem.
Cetorum
autem ipso
senio.

28. 3.

Τὰ δ' ἵ πλεῖστα τοῖσι παιδίοις πάδεα
κρίνεθ', τὰ μὲν ἐν τεσσαρτάκοντα ἡμέρησι,
τὰ δ' ἐν ἐπὶ ἑκατομυρίοις, τὰ δὲ ἐν ἐπὶ ἑξακτομυρίοις,
τὰ δ' ἐν ἐπὶ ἑξακτομυρίοις ἡβλυ πρὸς αὐτοῖς. Ὅσα
δ' αὖ διαμεικη τοῖσι παιδίοις πάδεα, καὶ
μὴ ἀπολυθῇ πρὸς τὸ ἡβλᾶσθαι, ἢ τῇσι δὴ-
λεσι πρὸς τὰς ἡβλᾶσθαι, καὶ ταμνίων φηξίας,
χρονίζειν εἶωθεν.

ADOLESCENTIBVS, sanguinis
spuitiones, tabes, febres acutæ, epi-
lepsiæ, alique morbi; sed præcipuè
antedicti.

MORBI ET
SYMPTOMA.
TA adoles-
centium.

29. 3.

Τοῖσι δὲ νεφελώσεσιν, αἵματος πί-
σεις, φθίσεις, πυρετοὶ ἐξέες, ἐπιληψίαι,
καὶ τὰ ὅμοια νοσήματα, μάλιστα δὲ τὰ πνευ-
μονικά.

VLTRA HANC ÆTATEM, PROVE-
CTIS, asthmata, pleuritides, perip-
neumonię, lethargi, phrenitides, fe-
bres ardētes, diuturna alui profluvia.

LYVENVM
morbi & in-
commoda
præcipua.

B iii

cholera, dysenteria, lienteria, hæ-
morrhoides. 30.7.

Τοῖσι δὲ ὑπερὶ πύλιν καὶ ἡλικίαν ταύτην
ἀδύματα, πλερίπιδες, πεπιδμονίαι,
λήθαργι, φρενίπιδες, καὶ ὕσσι, διάρροιαι
χρόνιαι, χολαί, δυσεντερίαι, λειεντε-
ρίαι, αἱμορροΐδες.

MORBI AC
SYMPTOMA-
TA Senibus
magis fami-
liaria.

SENIBVS, spirandi difficultates,
& destillationes cum tussi, strangu-
ria, dysuria, articulorum dolores,
nephritides, vertigines, apoplexia,
cachexia, pruritus totius corporis,
vigilia, alui, oculorum & narium
humiditates, visus hebetudines,
glaucomata, auditus graues. 31.3.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι δύσπνοια, κα-
τάρροι βηχάδες, σπασμὸι, δυσκρίαι,
ἀφδρων πίνοι, νεφριπιδες, ἱλιγγοί, ἀποπλη-
ξίαι, κακίαι, ξυσμοὶ τοῦ σώματος ὅλης,
ἀρτυρίαι, κοιλίης καὶ ὀφθαλμῶν καὶ ῥι-
νῶν ὑγρότητες, ἀμβλυωπία, γλαυκασίες
βαρυηκοΐαι.

ALVVS HV-
MIDA in iu-
uentute, se-
nescentibus
in siccam
mutari soli-
ta, & è con-
tra.


Quibus in iuventute alvus est hu-
mida, his in senectute exsiccatur:
Quibus verò in iuventute alvus
est sicca, his senescentibus hume-
tatur. 20.2.

Ὁ κοσίοισιν νέοισιν ἔσσι, αἱ κοιλίαι ὑ- Ob mutatio-
 γραί εἰσι, τετέοισιν ἀπογηράσκουσιν ξη- nem tempe-
 ραίνονται. Ὁ κοσίοισι δὲ νέοισιν ἔσσι, ramenti per
 αἱ κοιλίαι ξηραί εἰσι, τετέοισι πε- atates.
 ρυτέροισι γηνομένοισι ὑγρῶνον.

Magnitudo corporis, iuventuti
 quidem, est liberalis ac speciosa, se- CORPUS
 nectuti vero inutilis & deterior FORMA iu-
 paruitate. uentuti de-
 cora, est Ma-
 gnitudo pe-
 nes Altitudi-
 nem.

§ 4. 2.

Μεγέθει δὲ σώματος, ἐννεάσαι μὲν ἐλδ- Quæ sene-
 δέειον καὶ ἐκ αἰδέας ἐγηράσαι δὲ δύσρη- cuti grauis
 σον, καὶ χεῖρον ἢ ἐλαττόνων. & molesta,
 Quia curui-
 tati est ob-
 noxia.



METHODI
APHORISMORVM
DIPSOSITIVÆ,
SECTIO SECVNDA.

Complectens Aphorismos, ad
Simioticen spectantes,

*Sive de signis insalubribus sententias,
tùm Diagnosticas, tùm Prognosticas.*

P R Æ F A T I O.



POLLINIS vatem Cal-
chantem, Homerus ea
rerum notitia insignem,
atque spectandum præ-
dicat, ὅς ἦδ' ἡ τὰ τ' εἶοντα, τί τ'
εἰσέμελλ' αὖτε τ' εἶοντα. Cuius pro-
pterea oraculis & consilio, Græci
tam in arcanis Deûm evoluendis,
quam in vrgentium malorum cau-
sis abditis exquirendis, plerumque
rege-

Iliados α.


regebantur. VERVM simili arte,
 haud minori iure præditum, diuæ
 Apollinis artis sacerdotem Medi-
 cum esse decet; cuius præsidio, in
 dispositione Mortalium incolumi,
 nec non ægra & imbecilli latentes
 & occultas Affectuum internorū
 ideas scrutari, dubios euentus va-
 ticio assequi, & prægressa, reduci
 memoria, menti subijcere valeat.
 Quæ diuinandi vis & solertia non
 modo Medenti valde honorifica,
 dum videtur, numinis instar, ea co-
 gnoscere, quæ à sensibus sunt re-
 mota, aut multo post futura, antea
 præuidere: sed & magnopere uti-
 lia ad morbos, vel diligenti cautio-
 ne auertendos, vel cura exquisita
 remouendos. Medendi etenim
 principium, est morbi cognitio.
 Hæc porrò Scrutatrix pars Me-
 dicinæ σημειωτική dicta, eo quod
 certis signis, notisque sensibilibus
 ad Affectuum intimorum perce-
 ptionem, artificiosa coniectura
 progrediatur, duas partes insignes
 est sortita, διαγνωστικὴν, & προγνω-
 στικὴν, (ἀνὰ μνηστικὴν enim, seu præteri-
 torum commemoratio, quia his

Galen. 2.
 Methodi
 cap. 7.

C

solummodo vsum præstat, com-
modè sub istis, sine vllò doctrinæ
dispendio, comprehenditur. DIA-
GNOSTICE, est perspicax medici
vis & facultas, qua dispositiones
præsentis corporis, imis recessibus
absconditas, certis indicijs, tanquã
perspicilijs, disquirat & intuetur.
PROGNOSTICE vero, subtilis ille
animi prospectus, & præuisio: Quæ
Mutationes in morbis obtingen-
tes dubiosque euentus, oraculo-
rum instar, prædiurinat, humanæ e-
quidem pars illa prudentiæ, quæ
cum in omnibus actionibus diri-
gendis, tanquam lumen naturale à
Deo concessum, soleat effulgere,
non in eligendis modo ad finem
conuenientibus medijs, sed in præ-
uidendis rerum euentibus insigni-
ter; In prognosi autem medica
velox elucescit. Qua instructus
Medicus, non secus ac Imperator
hostium insidias; nauta æquori se
committens futuras tempestates;
agricolæ varias aëris mutationes
cognitione student assequi, vt tan-
dem victoriam, portum, & frugum
vbertatem adipisci valeant: Sic

Medicus, ~~devoias~~ beneficio, futuros in morbis euentus praesentens, quæ deinde ab arte perfici queant salutis restituendæ gratia internoscatur, & Medendi τὸν κατὰ ἐν, in quo præcipua Medicinæ vis effulget, inde melius capeſſat. Quæ vero sperari ab arte non possint nusquam aggrediatur, & præsidia quæ multis fuere salutis, haud temerè infamanda, prospiciat. Ex quo maximum sibi decus & honorem apud omnes, confidentiam & obsequium apud ægros, ad omnia quæ imperat exequenda comparabit. Porro hanc partem plerisque Aphorismis satis fusè complexus est Hippocrates. Diagnostice vero perſtrictè.



APHORISMI

PRIMO DE DIAGNOSI,

SEV SIGNIS DIAGNOSTICIS

Affectuum præter naturam
generatim;

NUMERO PAUCI,

IIQVE DVNTAXAT;

*De signis Partis Affectæ, seu
Sedis Morbi, in genere.*SIGNA DIA-
GNOSTICA,
PARTIS AF-
FECTÆ.Depromuntur
à Sympto-
matis,Et primo à
Qualitatibus
corporis im-
mutatis, præ-
sertimque
primis, CA-
LORE ET FRI-
GORE.Secundo, ab
ACTIONIBVS
læsis.Et præcipue
A DOLORE,
eiusque spe-
cie, vel ma-
gnitudine.**Q**UA parte corporis inest Ca-
lor aut frigus, ibi morbus.

39. 4.

*Καὶ ὅτε ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, ἐν ταῦτα ἢ νεώτερον.*Dolores laterum & pectoris, cæ-
terarumque partium, an multum
differant perquirendum. 5. 6.*Τῶν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλάτῃσι, καὶ ἐν στή-
θεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις, ὡς μέγα διαφέ-
ρεται, καταμαθεῖν.*

APHOR. DE DIAGNOSI. 29

Sed & si quæ pars ante morbum
doluerit, hîc morbus firmatur.

A Dolore,
etiam præ-
gresso.

33. 4.

Α τὰς ἡν ἔχουσιν πονηκός τι ἢ πρὸ τοῦ νοσήειν, ἐνταῦθα σμεῖζεν ἢ νῦν.

Qua parte corporis sudor est, ibi
morbum esse significat.

Tertiò, Ab
Excretis, &
speciatim
A SUDORE.

38. 4.


Καὶ ἐκ ἐνὶ τῷ σώματι ἰσχυρῶς, ἐνταῦθα φερεται πρὸς νῦν.

Quartò, Ab
Egestionibus
& lotio.

Aphor. 79.
& 66. sec. 7.

Signa partium affectarum, in specie,
infra nonnulla traduntur, in Affectibus
partium.

Signa porro causarum Morbificarum
& specierum Morbi, vniuersalia, non at-
tigit Hippocrates in Aphorismis. Hac au-
tem ex iisdem fontibus, ac sedes morbi de-
promuntur.



APHORISMI
DE PROGNOSI,
SEV PROGNOSTICÆ SENTENTIÆ.

Prognosticum Morbi venturi.

L Assitudines spontaneæ, mor-
bos prænuntiant. §. 2.

Κόποι αὐτόματοι προῖζουσιν νέσσε.

DE SIGNIS PROGNOSTICIS
MORBORVM.

*Et primo de Signis Criticis, in Morbis
acutis; ac præsertim Febris.*

MORBI A-
CVTI, habiti
maximè, qui
Crisi sol-
vantur,

ET

Quo termi-
no, Acuti
simpliciter
dicti iudicē-
tur.

Tertianæ fe-
bris exquisi-
tæ, termi-
nus,

A Cuti morbi in quatuorde-
cim diebus iudicantur. 23.2.

*Τὰ ὀξέα τῆς νοσημάτων κρίνεται ἐν
τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραις.*

Tertiana exquisita, septenis ad
summum circuitibus iudicatur.

§9. 4.

§9. Τριταῖα ἄχρι βῆς κρίνεται ἐν ἑπτὰ
ἡμέραις, τὸ μακρότατον.

Septimanæ primæ, Quartus est index, Octauus sequentis hebdomadæ est principium: Undecimus quoque est contemplabilis, ipse enim secundæ septimanæ quartus est: Rursus vero Decimusseptimus spectandus est, is enim à quarto decimo, quartus est, & ab undecimo septimus.

DIES CRITICI in quibus contingit Crisis I T IND. CES, in quibus futura præuidetur, Præcipui statuuntur,

24. 2.

Τῶν ἐπὶ αὐτῇ τετάρτῃ ἐπίδηλ. ὅτι ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὁδὸν ἀρχί. Θεωρητὴ ὅτι ἢ ἐν δεκάτῃ. αὐτὴ γὰρ ὅτι τετάρτῃ τῆς ἐτέρης ἐβδομάδος. Θεωρητὴ ὅτι πάλιν ἢ ἐπὶ αὐτῇ δεκάτῃ. αὐτὴ γὰρ ὅτι τετάρτῃ μὲν ἀπὸ τῆς τετραεσκαδεκάτης, ἐβδομῇ δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

Quibus die septimo crisis futura est, his vrina quarto die, nubeculam habet rubram, & cætera pro ratione.

71. 4.

SIGNVM prognosticū, crisis futura septima die, est signum coctionis in vrina, nempe NYBECULA die quarto conspicua.

Ὁ κόσισιν ἐβδομαῖα κρίνει, τετάρτῃ σιν ὅτιν ἐφελον ἴχει τὸ εἶδος τῇ τετάρτῃ ἐρυπτόν, καὶ τ' αὖ καὶ λόγον.

Quibus crisis instat, nox quæ accessionem præcedit, grauis; Quæ vero subsequitur, leuior ferè solet existere.

SIGNVM Crisis instantis, est nox præcedens grauior.

13. 2.

C iij

Ὅσοισι κρίσις γίνεῃ, τετέοισιν ἢ
νύξ δύσφορος, ἢ πρὸς τὴν περὶ ξυσμῶν· ἢ
ὅτις αὖτε δύσφορτέρη ὥς ὅτι το πολὺ.

RIGOR, sitidē
critico die
ortus, crisis
in febre acu-
ta antesigna-
nus,

Si febre ardente laboranti, ri-
gor superueniat, solutio fit.

58. 4.

Ἐπεὶ καὶ σὺ ἐχομένην χρομένην κρίνεις,
λύσις γίνεῃ.

Eodem spectat 46. 4.

RIGOR PE-
R ODICVS, in
febris in-
termittenti-
bus quotidie
repetens, to-
ties est nun-
tius solutio-
nis paroxys-
mi.

Quibus in febribus, quotidie ri-
gores repetunt, eodem febres sol-
uuntur.

63. 4.

Ὅσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καὶ ἡ-
μέρῳ κρίσις γίνεται, καὶ ἡμέρῳ οἱ πυ-
ρετοὶ λύονται.

SIGNA dyf-
crisiz in ge-
nere.

Primò,
Sumptum à
Type καὶ
febris.

Quibus paroxysmi fiunt, qua-
cumque hora febris dimiserit, ea-
dem si postero die repetat, iudica-
tu difficilis est.

30. 4.

Ὅσοισι περὶ ξυσμοὶ γίνονται, ἢν αὖ-
τῶν ἀφ' ἧς οὗ πυρετός, ἐς τὴν αὖτις τὴν
αὐτὴν ὥρην ἢν λάβῃ, δύσκειται.

Secundò,
A Rigore
sexto die
contingente,

Quibus in febribus, sexto die ri-
gores fiunt, crisis est difficilis.

29. 4.

Ὁ κόσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκτα-
σιον εἶσι ῥίχα γίνεσθαι, δύσκειτα.

In constantibus temporibus, cum tem-
pestivè tempestiva redduntur, Morbi sta-
biles & boni iudicij accidunt: inconstanti-
bus autem instabiles, & mali iudicij.

8. 3.

Quæ relinquuntur in morbis à
Crisi, Recidivas facere consueve-
runt.

12. 2.

Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νέ-
σοισι μὲν κρίσιν, ὑποπροφασ ποιεῖν εἰώθεν.

Febricitantem, nisi diebus impa-
bus febris reliquerit, solet reuerti.

61. 4.

Πυρεῶσιν τι λῶ μὴ ἐν πλείωσιν ἡμέρη-
σιν ἀφ᾽ ἧς οὐ πυρετός, ὑποπροφασ ποιεῖν εἰώ-
θεν.

Cum Aestas sit similis Veri, sudores in
febribus, multi sunt expectandi. 6. 3.

Sudores febricitantibus boni,
qui manare cœperint die tertio,
quinto, septimo, nono, vndecimo,
decimoquarto, decimosextimo,

Tertiò,
A Temporū
constitutio-
ne statā ac
tempestiva,
vel instabili.

CRISIS IM-
PERFECTA,
ex qua relin-
quar, seu
materia su-
perstes signū
est & CAUSA
Recidivar.

Crisis quo-
que seu fe-
bris solutio
non contin-
gens die cri-
tica, est CAV-
SA recidivar.

CRISIS PER
SUDOREM: fit
ut plurimū
repenti æsta-
te.

SUDOR CRI-
TICVS ET
LAUDABILIS
est, Qui die-
bus decreto-

corijs con-
tingit, hęc
recensitis.

34

APHORISMI

vigesimalprimo, vigesimalsepti-
mo, trigesimalprimo & trigesimo-
quarto. Hi enim sudores morbos
iudicant; Qui secus euenerint, la-
borem, morbi longitudinem, &
recidivas significant. 36.4.

Ἰδρώτες περὶ πάντων ἢν ἀρξάνται,
ἀγχοὶ περὶ αἰσῶν, καὶ περὶ αἰσῶν, καὶ ἐβδο-
μαῖοι, καὶ ἐννατηῖοι, καὶ ἐνδεκατηῖοι, καὶ
τεσσαρεσκαιδεκατηῖοι. καὶ ἐπὶ αἰσῶν, καὶ
μὴ καὶ εἰκοσῇ, καὶ ἐβδόμῃ καὶ εἰκο-
σῇ, καὶ τεσσαρεσκαιδεκατηῇ, καὶ τεσσαρεσκαιδεκατηῇ.
Οὗτοι γὰρ οἱ ἰδρώτες νέους κρίνου-
σιν· οἱ δὲ μὴ ἔτι γινόμενοι, πόνον σημαί-
νουσι, καὶ μὴ ἔτι νέους, καὶ ὑποπροσασμένους.

Exceptio su-
perioris a-
phorismi.

Et SIGNA
dyscrisie per
sudorem.

Sudores in diebus criticis facti
vehementes & celeres periculosi,
& qui ex fronte, velut guttæ & a-
quæ scaturientes expulsi, & frigidi
valde atque multi; necesse est enim
hunc sudorem prodire cum vi, la-
boris excessu, & expressione diu-
turna. 4.8.

Ἰδρώτες ἐν τῇσι κρίσεσιν ἡμέρας γι-
νόμενοι σφοδροὶ καὶ ταχέες, ὅτε κινδύοι
οἱ ἀνθρώποι ἐκ τῆς μετώπης, ὡς ἀπὸ σα-
λαμῶν καὶ κρυνοῦ. καὶ ψυχροὶ σφοδρὰ καὶ

πολλοί. ἀνάγκη γὰρ τὸν ποῖτον ἰδρῶτα
περδεῖν μὲν βίης, καὶ πένε καὶ βαλῆς, καὶ
ἐκθλίψιθι πολυχρονίᾳ.

A sudore, horror, non bonum.

3. 7.

Ἐπὶ ἰδρῶτι φέκη, ἔχουσιν.

Febricitanti sudor superueniens, febre
non deficiente, malum, &c. 56. 4.

Quibus elata hypochondria
murmurant, lumborum dolore
superueniente, his alui humectan-
tur, nisi inferne flatus erumpant,
aut urinae copia profluat, atque
hæc in febribus. 73. 4.

Ὁ κόσισιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορ-
ροῦζοντα, ὅσφύθι δὲ στήματος ἐπιγρομέ-
ναι, αἱ κοιλίαι ταῖτοις καδυχαίνον. ὡς
μὴ φύσαι κατὰ ῥαχίωσιν, ἢ ἔρε πλὴν θο-
ἐπὶ λῶθι ἐν πυρετοῖσι τῶν ταῦτα.

In profluuiis alui, mutationes ex-
crementorum iuuant, nisi ad praua
mutatio fiat. 14. 2.

Ἐν τῇσι τῆς κοιλίης ῥύσεσιν, αἱ μετα-
βολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, ὡς
μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβάλλῃ.

Signū quoque
Crisis per
sudorem, il-
laudabilis.

Primò,
Est horror
consequens.

Secundò,
demonstrat
est febris non
deficiens.

SIGNUM
crisis futuræ
per alui
fluxum, est
hypochon-
driorū mur-
mur & lum-
borum dor-
lor.

Signum cri-
sis laudabi-
lis, per alui
fluxum, est
humorum
excrementorum
varietas.

CRISIS PER
VRINAE
FLVOREM
soluit mor-
bos abscef-
sum in arti-
culis, faustu-
ros.

Quibus spes est, ad articulos, ab-
scessum futurum, abscessu liberati
vrina multa, crassa & alba reddita,
qualis in febribus laboriosis, quar-
to die quibusdam exire incipit.
Quod si ex naribus etiam sanguis
profluxerit, breui admodum solu-
tio fit.

74. 4.

CRISIS PER
HAEMOR-
RHAGIAM
morbis quo-
que cito sol-
uendis ap-
tissima.

Οκόσοισιν ἐλπίς ἐς τὰ ἀφ' ὧν ἀφίστασθαι
ῥύεται τῆς ἀποστάσεως ἔσθ' ἐν πολὺ, καὶ πα-
χὺ, καὶ λεῖκον γινόμενον, οἷον ἐν τοῖσι κο-
πώδεσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἀρχεται
ἐνίοισι γίνεσθαι. Ἦν δ' καὶ ἐν τῇ ῥινῶν αἵ-
μορραγίῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

SIGNVM
COCTIONIS
materiæ
morbificæ
est Mutatio
vrinæ Cras-
sæ in tenuio-
rem.

Quibus febricitantibus vrinæ
sunt crassæ, grumosæ, paucæ, Mul-
titude tenuium, ab his superueniēs,
iuuat. Maximè vero tales reddun-
tur, quibus statim ab initio, aut
paulo post sedimentum inest.

69. 4.

Οκόσοισιν ἔρα παχέα, θρομβώδεια,
ελίγα, ἐκ ἀπυρέτοις, πλήθ' ἐπελθὲν
ἐν τετέων λεπτῶν, ὠφέλει· μάλιστα δ'
τὰ ποικίλα ἀρχεται οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ διὰ
παχέων ὑπόστασιν ἶχει.

Quibus diuulsæ sunt vrinæ, his fit vehemens in corpore turbatio.

33. 7.

Ὁ κόσσις ὅς διεσηκότα τὰ ἔργα γίνεται, τετέοισι παραχρὶς ἰατρὴ ἐν τῷ σώματι ὄσιν

SIGNVM
perturbatio-
nis Criti-
cæ, vel sym-
ptomaticæ
est vrinæ
diuulsæ.

Quibus in febribus vrinæ turbata, quales iumentorum, his dolores capitis adsunt, aut aderunt.

70. 4.

Ὁ κόσσις ὅς ἐν πυρετοῖσι τὰ ἔργα ἀνατεταραγμένα, οἷον ὑποζυγίων, τετέοισι καφθιγγίαι ἢ πάρεσιν, ἢ παρέσον.

SIGNVM
CRUDITA-
TIS humo-
ræ, ob co-
rum, tum
copiam, tum
crassitiem,
est Vrinæ
perturba-
ta & sub-
ingalis.

Quibus perspicuæ & albæ sunt vrinæ, malæ; præsertim si in phre-
neticis appareant.

72. 4.

Ὁ κόσσις ὅς ἐργα διαφανέα λευκά, πο-
νηρά. μάλιστα ὅς ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσι
ὀφθαίνε.

Signū Cru-
ditatis ob
caloris nati-
ui debilitatē
vel signum
Metastasis
humoris bi-
liosi ad ce-
rebrum.

Quibus in febribus Morbus re-
gius superuenerit ante septimum
diem, malum.

62. 4.

Ὁ κόσσις ὅς ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἰκτε-
ροι ὀφθίνονται πρὸ τῆς ἐπὶ αἱμερῶν, κα-
κόν.

SIGNVM
CRISIS PER-
ICTERVM
Malæ, si an-
te septimum
contingat.

Signū Ileri
salutaris, si
accidat die
critico quo-
dam, & hy-
pochondrio
dextro mi-
nimè dāro.

Quibus in febribus, Morbus re-
gius die septimo, nono, & vndeci-
mo, aut decimoquarto superuene-
rit, bonum: Nisi dextrum hypo-
chondrium durum sit, alioqui mi-
nime bonum.

64. 4.

Ὁ κόσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐξ-
δόμῃ, ἢ τῇ ἐνάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ ἢ τεσ-
σεραεκαδέκῃ ἐκτερεῖ ἐπὶ γίνον, ἀγα-
θόν, ὡς μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκλη-
ρὸν ᾖ· ἢν δὲ μὴ, ἐκ ἀγαθόν.

SIGNVM cri-
tis per ab-
cessum fu-
tura, est fe-
bris longitu-
do.

Quibus febres longæ, his tuber-
cula ad articulos, vel dolores fiunt.

44. 4.

Ὁ κόσισι πυρετοὶ μακροὶ, τὰ τέτοιαι
φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐγγίνον.

Signū quo-
que, ac Cau-
sa Abscessus
post febrem
contingentis
est Ciborum
opia.

Quibus tubercula ad articulos
vel dolores fiunt post febres, hi
pluribus vtuntur cibis.

45. 4.

Ὁ κόσισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι
ἐκ πυρετῶ [μακρῶν] γίνονται, ἐποισί-
οισι πλείοσι χέρονται.

SIGNVM
signās par-
tem, in qua
tumor ab-

Quibus per febres, lassitudinis
sensus, his ad articulos & iuxta ma-
xillas potissimū abscessus fiūt.

31. 4

Τοῖσι κοπώδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, scellus crāi-
 ἐς ἀφ' ὧν καὶ παρὰ τὰς γνάθους μάλιστα αἰ
 ἀποσάσεις γίνονται.

Quibus, ex morbo conualescen-
 tibus, pars aliqua laborat, eo loci
 abscessus fiunt.

32. 4.

1. Est senles
 lassitudinis
 in febribus.

2. Est dolor
 partis alicu-
 ius declina-
 te morbo.

Ὅμοιοις δ' ἀνισαμύουσι ἐν τῷ νύ-
 σων τι πονέει, ἐν ταῦτα αἱ ἀποσάσεις γίνον-
 ται.

Sed & si quæ pars ante morbum labo-
 rauerit, hic morbus firmatur.

33. 4.

3. Dolor
 partis alicu-
 ius, ante
 morbum.

Vbi fauces ægrotant, aut tuber-
 cula exoriuntur in corpore, excre-
 tiones spectare oportet; Nam si
 biliosæ fuerint, vnà corpus ægro-
 tat: si vero sanis similes extiterint,
 tutum est corpus nutrire.

15. 2.

5. GNVM cri-
 sis per ab-
 scessum, per-
 fectæ vel im-
 perfectæ, est
 Excretio bi-
 liosa per al-
 uum, aut sa-
 nis similis.

Ὅκε φαύλ' ἔχουσιν, ἢ φύματα ἐν τῷ
 σώματι ἐμφύει, καὶ τὰς ἐκκρίσεις σκώ-
 πησιν. Ἦν γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα
 ξυμνοσέει· ἢ δ' ὁμοίαι τοῖσιν ὑγαινέσι
 γίνονται, ἀσφαλές τὸ σῶμα πρέχειν.

Et subiunctū
 PRÆCEP-
 TVM DIA-
 TETICVM ad
 analepsim.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APHORISMI
DE SIGNIS PROGNOSTICIS
SALVTIS ET MORTIS,

In Morbis acutis, ac præfer-
tim Febribus.

*Primò, Cautiones quædam genera-
les in prædicendo.*

PROGNOSIOS

CAVTIO

PRIMA,

Dixta à

Morbi motu

celeris, in acu-

tis, quo in-

certa prædi-

ctio spesque

euentus vitæ

aut necis

subijcitur.

A Cutorum Morborum non
omnino certæ sunt Prædi-
ctiones, neque salutis, neque mor-
tis. 19. 2.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων ἐ πάντων ἀσ-
φαγέες αἱ προδιαρροὶ αὐτῶν ὅτε τὸ σωαίτε,
ἢ τὸ τῆς ὕλης.

SECUNDA

Ex Allevia-

tione subita

Morbi ac

Symptoma

tū sine Cau-

sa contin-

gente.

Et ex Muta-

tione subita

His, quæ sine ratione alleviantur
fidere non oportet, nec multum
formidare mala, quæ præter ratio-
nem eueniunt: Multa enim horum
sunt incerta, nec permanere diu,
aut persistere consueuerunt.

27. 2

Τοῖς

DE SIGNIS PRŒGNOSTICIS. 41

Τοῖσι μὴ χεῖρόν τι λόγον κεφίζουσιν, ὃ δὲ
πρὸς αὐτὸν ἐστὶ φοβεῖσθαι λίαν τὰ μοχθηρὰ
γινόμενα παραλόγως. Τὰ γὰρ πολλὰ τῶν
τοιούτων εἶναι ἀβέβαια, καὶ ὃ πάντες δια-
μύθην, ἐπεὶ χρονίζον εἶωθεν.

in deterius,
præter ratio-
nem appa-
rente.
Quibus do-
cetur nec cer-
to sperandū
esse Medico.
nec etiam te-
mere diffide-
dum ac des-
perandum de
salute,

PROGNOSTICA AB IPSA MORBI IDEA, PUTA AB IPSA FEBRE.

EX bubonibus, febres omnes
malæ, præter ephemeræ.

55. 4.

Οἱ ἐπὶ βυβῶσι πυρετοὶ, πάντες κα-
κοί, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

PROGNOSTI-
CUM febris.
Primò, Ab
eius Causa, ac
nominatim
ab Inflamma-
tione cuiusdā
emunctorii,
v. g. ingui-
num.

Febres non intermittentes; quæ
tertio quoque die vehementiores
fiunt, periculosiores: Quovis mo-
do autem intermiserint, periculo-
sas se non esse significant.

43. 4.

Secundò,
Ab eius mo-
tu die tertio,
Et continui-
tate, vel in-
termissione.

Οἱ πυρετοὶ ὁκοσοὶ μὴ διδύποντες διὰ
τέττης ἰσχυρότεροι γίνονται, μᾶλλον ἐπικίν-
δυνοι· ὅτε δ' αὖ τρίτῃ διδύπωσι, ση-
παίνει ὅτι ἐκινδύνουσι.

D

PROGNOSTICA EX SYMPTOMATIS DE PROMPTA.

*Et primo ex Actionibus laevis, atque
in primis; Animalibus.*

PROGNOSTI-
CA. TAM SA-
LUTARIA,
QUAM LE-
THALIA:
Et primo
quidem à
RATIOCINA-
TIONE, vel
integra, vel
laesa; Prae-
sertim in
Delirio.

IN quovis morbo Rationem va-
lere, & rectè se habere ad ea quæ
sumuntur, bonum: è contra vero,
malum. 33. 2.

Εν πάσῃ νόσῳ τὸ ἐρρῶδες τὴν διάνοιαν,
καὶ εὖ εἶχειν πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθόν·
τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

1. Speciatim
Mania:

Si quis sensum rabie efferatur, si
quis non cognoscit, non audit, non
intelligit, lethale est. 16. 8.

2. à SEN-
SVM exter-
orum & in-
teriorum fun-
ctione abo-
lita, seu
ἀναίσθησις.

Καὶ λυσίων ἀσθένεια, καὶ ἀγνοεῖν, καὶ
μὴ δὲ ἀκύν, μὴ δὲ ζῶντες, θάνατος.

Eodem spectat 49. 4.

3. A Sensus
Communis
actione laesa,
Nempe

In quo morbo somnus labor-
em facit, lethale: si vero iuvat, non
lethale. 1. 22.

DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 43

ΕΝ ᾧ νοσήματι ἔπνθ πόνον ποιέει, Somno la-
θανάσιμον. καὶ ὃ ἀφελείη, ἔθανάσι- borioso, seu
μον. sopore ac
lethargo.

Vbi somnus delirium sedat, bo- 4. A Somno
num. delirium se-
dante.

Ὅκε παραφροσύνην ἔπνθ παύει, 2. 2.

Somnus & vigilia, vtraque mo- 5. A vigilia
lum excedentia, malum. 3. 2. ac somno
immodera-
tis.

Ἐπνθ, ἄρην πνίη, ἀμφοτέρω τῷ με-
ρίν μᾶλλον γινόμενα, κακόν.

Tenebricosa vertigine laborans, 6. A Verti-
ucem auersans, & somno multo gine ac Vi-
detentus, desperatus est. 15. 8. sione depra-
uata, somno-
que graui
cum ardore.

Καὶ σκοποδινῶν, καὶ ὑποστροφόμενθ, καὶ
ἔπνθ καὶ καύματι πολλῷ κατεχόμενθ,
ἐνέλπιος.

In febris, ex somnis pauores 7. Ab In-
aut conuulsiones, malum. 67. 4. somnijs, in
somno ter-
rorem indu-
centibus, &
somno con-
uulsionibus
comitato.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῆς ἔπνων
ρόβοι ἢ ἀσπασμοί, κακόν.

In febris acutis conuulsiones, 8. A MCTV
& circa viscera dolores fortes, ma- DEPRAVATQ
lum. & prim9,
66. 4.

D ij

Conuulsione
in febribus
contingente.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξέσιν οἱ
σπασμοὶ καὶ οἱ πρὸς τὰ σπλάγχνα πόνοι
ἰσχυροὶ, κακόν.

Febrem, conuulsioni superueni-
re, melius est, quam feбри conuul-
sionem. 26. 2.

Πυρετὸν ἐπὶ σπασμῷ βέλπον γνέσθω,
ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῷ.

Nonò,
A Tremore,
& hunc con-
sequente de-
lirio.

Quibus in febribus ardentibus
tremores fiunt, hos delirium soluit.
26. 6.

Ὅσοισιν αὖ ἐν τοῖσι καύσινσι τρεῖς
μοῖ γίνοντο, παρακοπὴ λύει.

Decimò,
A Rigore,
viribus iam
fractis inci-
dente.

Si rigor, in febre non intermit-
tente, incidat, ægro iam debili, le-
thale est. 46. 4.

Ἦν ῥίγος ἐμπλήρη πυρετῷ μὴ διαλεί-
ποντι, ἤδη ἀδενεῖ εἶναι, θανάσιμον.

Vndecimò,
A voce lu-
tuosa, &
suspitijs.

In morbis acutis cum febre, lu-
tuosa suspiria, mala. 58. 4.

Εν τοῖσιν ὀξέσι πάδεσι τοῖσι μὲν πυ-
ρετῷ αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ, κακαί.

Duodecimò,
A Dyspnœa

In febribus spiritus subsistens,

DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 45
malum: conuulsionem enim signi-
ficat.

68. 4.

cum inter-
mittente res-
piratione.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι πνέμα περισκό-
πῳ, κακόν· αἰσινὸν ᾗ σημαίνει·

Quando in febre non intermit-
tente difficultas spirandi, & deli-
rium acciderit, lethale est. 50. 4.

XIII.
A Dyspnœa
cum delirio.

Ὅτε αὖ ἐν τῷ πυρετῷ μὴ διαλείποντι
δύσπνοια γίνηται καὶ παραφροσύνη, θανά-
σιμον.

Si febricitanti, nullo in faucibus
existente tumore, suffocatio dere-
pente accidat, lethale. 34. 4.

XIV.
A Suffoca-
tione repen-
tina, absque
faucium tu-
more con-
spicuo,

Ἢν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ, οἱ δὲ ματοὶ
μὴ ἔοντος ἐν τῇ φάρυγγι, πνίξις ἐξ αἰφνης
ἐπιγίνηται, θανάσιμον.

Si febricitanti collum subito in-
torqueatur, & vix deglutire queat,
nullo existente tumore, lethale est.

XV.
Deglutione
laxa & collum
interfione
absque tu-
more.

35. 4.

Ἢν ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχομένῳ ὁ πρᾶξις
καὶ ἐξ αἰφνης ἐπιστραφῇ, καὶ μόλις καταπί-
νεν δύνῃται, οἱ δὲ ματὶ μὴ ἔοντι, θά-
νασιμον.

D. iij

6. PROGNO

TICVM ab

Actione Vi

ali laesa,

Nempe

Animi deli-

quio aut syn-

cope vehe-

mentis & cre-

bra.

Qui frequenter atque fortiter,
sine manifesta causa, animo defi-
ciunt, derepentè moriuntur. 41.2.

Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις ἢ ἰσχυρῶς
αὐτὰ φανερῶς παθράσι θ', ἐξ ἀπίνης τε-
λαίπῃσι.

7. PROGNO-

TICVM ab

Actione Na-

turali laesa.

In morbo diuturno Cibi fasti-
dium & dejectiones syncerae, ma-
lum. 6.7.

Ac praesertim

ab Inappete-

tia in Mor-

bis diuturnis.

maximè per-

niciosa.

Ἐπὶ νύσῳ πολυχρονίῃ ἀποσιτὴν καὶ
ἀκρητοὶ ἀποχωρήσεις, κακόν.

Eodem spectat 33.2.

8. Et ex Ap-

petentia bo-

na, cibique

ingestione

post morbum,

& nihil omni-

us imper-

fecta Nutri-

tione Cor-

poris robur

& molè nō

augente.

Si à morbo, cibum benè capienti-
Corpus nihil proficiat, malum.

31.2.

Τῷ ἐξ ἀρρώστιας δισιτέντι, μὴ δὲν ὄντι-
διδόναι τὰ σώματι, μοχθηρόν.

9. Ab appe-

tentia statim

equidem à

morbo vigē-

te, nec reficiē-

te, Postmodū

vero, Dieta.

Omnes ferè malè habentes, qui
per initia belle cibum capiunt, nec
proficiunt, circa finem tandem ci-
bum fastidiunt: Qui vero per ini-
tia, cibum valdè fastidiunt, postea

DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 47

autem bellè assumunt, ij melius euadunt.

32. 2.

Vel ex inap-
petentia pri-
mo, & po-
steà valente
Appetitu.

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχον-
τες, κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες, καὶ μηδὲν
ὀπιδιδόντες, πρὸς τὴν τέλει πάλιν ἀσιτέ-
ουσιν. Οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες
ἰσχυρῶς, ὑπερὸν ἐνσιτέοντες, βέλτιον
ἀπαλλάσσουσιν.

Designantur
qui ci. iis aut
tardius à
morbo con-
ualescant.

PROGNOSTICA

AB AMETRIA

IN EXCRETIS.

FRigidi sudores, cum febre qui-
dem acuta, mortem: cū mitiori
vero morbi longitudinem signifi-
cant.

37. 4.

PROGNOS-
TICA SALUTA-
RIA ET LE-
THALIA, ET
Primo ex fe-
dore.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ξυὼ μὲν ὀξείᾳ πυ-
ρετῇ γινόμενοι, θάνατον. ξυὼ ὀρμητέρεσσιν
δὲ, μῆκος νέου σημαίνουσι.

Ac primo ex
sudore frigi-
do.

Sudor multus, frigidus vel cali-
dus semper fluens; frigidus maio-
rem, calidus minorem significat
morbum.

Secundò,
A sudore
et piofo et
continuo.

42. 4.

Ἰδρῶς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς ἀεὶ
ρεῖων, ὁ ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσων
τὸ νέον σημαίνει.

D iij

Tertiò,
Et Sudore
febrim non
soluente.

Febricitanti sudor superveniens, febre
non deficiente, malum, &c. 56.4.

Quibus Su-
dor in interi-
tu superue-
niat, nec ne,
cognoscitur
ex Habitu
corporis Ra-
ro, vel den-
so.

Quibus cutis arida & dura, ob-
tenditur, sine sudore intereunt.
Quibus vero rara & laxa, cum su-
dore moriuntur. 71.5.

Ὁ κόσσισι δέρματα δείκνεται καρ-
φώεα καὶ σκληρὰ, ἀνὰ ἰδρῶτι τελευτῶ-
σιν· ὁ κόσσισι δὲ χαλαρὰ καὶ ἀραιὰ, σὺν
ἰδρῶτι τελευτῶσιν.

Eodem spectat 36. 4.

PROGNOST.
à Sanguinis
eruptione,
supra vel in-
fra.

Sanguis supernè quidem excre-
tus, qualiscumque sit, malum: Infer-
nè autem si niger excernatur, bo-
num. 25.4.

Αἷμα ἀνω μὲν ὁκοῖον ἀν' ἡ, κακόν· κα-
τω δὲ, ἀγαθόν μέλαν ὑποχρῶρον.

Secundò,
A Sanguine
excreto per
os cum ad-
iuncta febre.

Qui sanguinem vomunt, si sine
febre, salutare est: si cum febre, ma-
lum. Curare vero oportet refrige-
rantibus & astringentibus. 37.7.

Ὁ κόσσι αἷμα ἐμέουσιν, ὡς μὲν ἀνὰ πνι-
γεῖν, σωπείον· εἰ δὲ ξὺν πυρετῶ, κακόν.
Θερραπείαν δὲ τοῖσι ψυχρῶσι, καὶ τοῖσι
εὐπυρετικοῖσι.

Quibus

Quibus in febribus Quartanis sanguis fluxerit è naribus, malum.

3. A Sanguinis è naribus fluxu in quartana febric.

3. 8.

Ὁ κόσσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τετρα-
ταίοισιν ἐστὶν αἷμα ἐκ τῆς ρινῶν ῥυῆς, πο-
νηρόν.

Morbis quibusvis incipientibus si atra bilis, supra vel infra exierit, lethale.

22. 4.

4. PROGN. MALVM Ab Atræ bilis Excretionē supra, vel infra, tam in Morborum omnium principio :

Νοσημάτων ὁκόσων ἀρχομένων ἢ χο-
λὴ μέλαινα ἢ αἷω, ἢ κίτω ἐπέλθῃ, θανά-
σιμον.

Quibus Ex morbis acutis, aut diuturnis, aut vulneribus, aut alio modo extenuatis, atra bilis, aut velut sanguis niger exierit, postridie moriuntur.

23. 4.

tum etiam in morborū progressu.

Ὁκόσσιον ἐκ νοσημάτων ὁξέων, ἢ ἐκ πολυχρονίων, ἢ ἐκ τραμάτων, ἢ ἄλλως πως λεπυωομένων χολὴ μέλαινα, ἢ ὁκοῖον αἷμα μέλαν ὑπέλθῃ, τῇ ὑστερίᾳ ἀποθνήσκει.

Deiectiones nigræ, qualis est sanguis niger, sponte prodeuntes, siue cum febre, siue sine febre, pes-

5. A Deiectionū Colore atro, aut aliis diuersi colo-

E

ris, etiam
pravi, ut vi-
ridis liuidi
cineritij, &c.

simæ, & quanto ipsarum colores
peiores plures fuerint, eo peius est.
A medicamento autem melius, id-
que quanto plures fuerint colo-
res, minime pravi. 21. 4.

ὑποχρώματα μέλανα, ὀκλίον αἷμα
μέλαν, αὐτομάτε ἰόντα καὶ ξυὺ πυρετῶ
καὶ ἀνὰ πυρετῶ, χάκιστα. Καὶ ὅκιστα ἀνὰ τὰ
χρώματα ὑποχρωμάτων πλείω πονη-
ρότερα ἢ, μᾶλλον χάκιστον ξυὺ φαρμάκῳ
ᾧ, ἀμεινον καὶ ὀκίστω ἀνὰ πλείω χρώματα
καὶ πονηρότα.

6. PROGNO-
STICVM Ab
Excretionū
tūm per spu-
tum, tūm
per deiectiones
& urinas
Colore liui-
do & cruen-
to, Olore
fœtido, Ex-
cernēdi mo-
do, & tem-
pore conue-
nienti, nec
ne, Humorū
que excun-
tium, vel
noxiorum,
vel utilium,
specie diuer-
sa.

Excreationes in febribus, non
intermittentibus, liuidæ, cruentæ,
fœtidæ, biliosæ, omnes malæ, com-
modè tamen si prodeant bonæ;
Sic etiam quæ per alui deiectiones
& urinas: Si quid vero horum
quæ non confert (excerni) per hæc
loca excernatur, malum. 47. 4.

Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσι τοῖσι μὴ διδχέσασιν αἱ πελίδναι
καὶ αἱματώδεις, καὶ χολώδεις καὶ δυσώδε-
ες, πάσαι κακαὶ ἀποχρέεσθαι ᾧ καλῶς,
ἀγαθαί. καὶ κατὰ κοιλίῳ, καὶ κύστιν, καὶ ὅκω
ἀντι ἀποχρέον σὴ μὴ κακαθαρμύον,
κακόν.

DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 51

In morbo diuturno cibi fastidium & deiectiones syncerae, malum.

6. 7.

7. A Deiectionibus synceris & Meracis, in morbis praesertim longis.

Qualia, quae per vesicam, aut aluum decernuntur, & quae per carnes abeunt, & sicubi corpus a natura recedat, spectare oportet. Nam si parum, levis est morbus, si multum, magnus; si valde multum, lethale est.

79. 7.

8. A B E X CRETIONVM sine per aluū urinas aut sudores, Re- cessu ac Dis- similitudine maiori vel minori, a naturali earum & sana constitutione.

Ὅκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν φύσιν, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίαν ἐποχρήματα, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ὡς πρὸς τὴν φύσιν ἐκβαίνει τὸ σῶμα, ὡς ὀλίγον, ὀλίγη νόσος γίνεται ὡς δὲ πολὺ, πολλή· ὡς πάνυ πολλή, θανάσιμον τὸ τοῦτον.

Tum etiam ab universo corporis habitu, a naturali aegri statu, vel multum diffidete vel si nili:

Quae per vesicam excernuntur spectare oportet, an talia sint qualia sanis exeunt. Nam quae his, minimè sunt similia, ea morbosiora: Quae vero sanis sunt similia haec minus sunt morbosa.

66. 4.

E ij

PROGNO- TICVM Ab urinae similitudine aut dissimilitudine, cum sanorum urinis
AXIOMA PROGNOSTICVM,

hic notandū
quæ sanis
similia bona
sunt, quæ
dissimilia
mala.

Τὰ διὰ τῆς κύστη διαχωρέοντα ὁρᾶν
δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέεται.
τὰ ἥκιστα οὐὲ ὅμοια τετέοισι, ταῦτα νο-
σωδέστερα· τὰ δὲ ὅμοια τοῖσιν ὑγιαίνουσιν,
ἥκιστα νοσερά.

9. Ab Urinæ
colore albo
& perspicui-
tate.

Quibus urina sunt perspicua & al-
ba, mala; præsertim vero si in phreneticis
apparent.

72. 4.

10. A LA-
CHRYMIS
sponte aut
inuolunta-
riè prodeun-
tibus.

Quibus in febribus, aut aliis
morbis voluntariè illachrymant
oculi, absurdum non est. Quibus
vero præter voluntatem, absur-
dus.

52. 4.

Ὁ κόσσις ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἢ ἐν
τῇσιν ἀγῆσιν ἀρρώσῃσιν καὶ περὶ αἵρεσιν
ὀφθαλμοὶ δακρύουσιν, ἐδὲν ἀτοπον· ὁ κό-
σσις ὅ μὴ καὶ περὶ αἵρεσιν, ἀτοπότερον.

Quibus in morbis oculi sponte
illachrymant, bonum. Quibus ve-
ro inuoluntariè, malum. 2. 8.

Ὁ κόσσις ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσιν οἱ
ὀφθαλμοὶ καὶ περὶ αἵρεσιν δακρύουσιν, ἀ-
γαθόν. ὁ κόσσις ὅ ἀνὰ περὶ αἵρεσιν, κα-
κόν.

PROGNOSTICA
A QUALITATIBVS
CORPORIS IMMVTATIS.

Et partium quarundam corporis statu vitioso.

IN morbis acutis, frigus extremarum partium, malum. 1. 7.

Εν τοῖσιν ὀξέσι νεσθήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

A dolore vehementi circa ventrem extremorum refrigeratio, malum.

26. 7.

Επὶ ὀδυῇ ἰσχυρῇ καὶ περὶ τὴν κοιλίαν ἀκρωτηρίων ψύξις, κακόν.

In febribus non intermittentibus si exteriora frigeant, interiora vrantur, sitimque habeant, lethale est.

48. 4.

Εν τοῖσι μὴ διδυμασιν πυρετοῖσιν, μὴ τὰ μὲν ἔξω ψυχρά, τὰ δὲ ἐνδον καίνονται, καὶ δίψῃ ἔχον, θανάσιμον.

E iij

PROGNOSTICA TVM SALVTARIA, TVM LETHALIA deprompta, à Qualitatibus primis mutatis : Et primo à Frigore extremarum partium.

2. A Frigore extremo, eum ardore interno & siti.

3. A Calore
deurenti, &
inde orto
Cardiogmo.

In febribus, circa ventriculum,
æstus vehemens, & cordis morsus,
malum.

26. 7.

Εν τοῖσι πυρεποῖσι πρὸ τοῦ κοιλίου
καῦμα ἰσχυρὸν, καὶ καρδιωδὲς, κακόν.

PROGNOSTICA
A CONSTITVTIONE
*Quarundam corporis partium
depranata.*

Pregnost. I
A FACIE I
partium per-
uersa consti-
tutione,
& Organorū
sensuum, in
ea positorū
FUNCTIONI-
bus læsis, &
pro festina
Vīu & au-
diu aboli-
tio.

IN febre non intermittente, si la-
brum aut supercilium, aut
nasus peruertatur; Si non videat,
si non audiat, iam debili existente
corpore: quicquid horum euene-
rit mors proxima.

49. 4.

Εν μὴ διδυείποντι πυρετῷ τὸ χεῖ-
λος, ἢ ὄφρυς, ἢ ὄφθαλμὸς, ἢ ῥίς, δια-
στραφῇ, τὸ μὴ βλέπειν, τὸ μὴ ἀκούειν, ἢ δὴ οὐ-
δενέειν εἶναι τὸ τοῦ σώματος, ὃ, πᾶσι τὰς
τέων χύεται, ἐξ ἧς ὁ θάνατος.

DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 55

In somnis vero, spectare etiam oportet, quæ in oculis subapparent; Nam si quid commissis palpebris de albo appareat, nec ex alui profluuium, aut medicamenti potione hoc accadat, malum est signum & valde lethale.

2. Ab Oculorum albo, commissis palpebris, conspieuo.

52. 6.

Σκοπεῖν ὃ χεῖ καὶ τὰς ὑποφάσας τῆς ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὑπονοῖσιν. ὡς γὰρ πῦρ ὑποφαίνεται ἐν συμβαλλομένων τῶν βλεφάρων τῷ λακῷ, μὴ ἐκ διαρροῆς εἶναι ἢ ἐκ φαρμακοποιήσεως, φλαῦρον τὸ σημεῖον, καὶ θανατώδες σφόδρα.

Lingua nigra atque cruenta, cum quid horum signorum abest, non valde malum, morbum enim minorem significat.

3. A Linguae colore nigro & cruento.

9. 8.

Γλῶσσα μέλαινα καὶ αἱματώδης, εἴ τι τῶν τοιούτων σημείων ἀπεστ, μὴ σφόδρα κακόν. διηλοῖ γὰρ νῦσον μικροτέραν.

Labra liuida, aut resoluta, & inuersa & frigida, mortifera.

4. A Labiorum constitutione praua.

13. 8.

E iijj

Τὰ χεῖλη πελιδνά, ἢ καὶ ἀπολελυ-
μένα, καὶ ἐξεσραμμένα, καὶ ψυχρά, θανα-
τώδεα.

5. Ab Auri-
bus.

Aures frigidæ, pellucidæ, con-
tractæ, lethales. 14. 8.

Τὰ ὦτα ψυχρά. διαφανέα, συνεσπλ-
κμένα, θανατώδεά εἰσι.

6. A Digi-
tis.

Digitorum etiam extrema frigi-
da, præ se ferunt mortem.

Ab Ungui-
bus.

Ungues nigri, digiti manuum &
pedum contracti vel demissi, mor-
tem proximam significant. 12. 8.

Ὄνυχες μέλανες, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν
χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ, σινεσπλκμένοι
ἢ καθεμμένοι, ἐγγὺς τὸν θάνατον δηλῶ-
σιν.

7. Ab Ab-
dominis &
Hypocho-
ndriorū Mo-
le, nempe co-
rum Crassi-
tie, vel exte-
natione.

In omnibus morbis, partes ad
umbilicum & imum ventrem atti-
nentes, crassitiem obtinere melius
est, multum vero extenuari, &
contabescere malum : Sed hoc
quoque ad infernas purgationes,
periculosum. 35. 2.

Ἐν πάσῃσι τύσιν νέσσει τὰ περὶ τὸν
ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥττον πάχυνται, βέλπουν

DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 57

ἔτι τὸ ὅ σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐκτετηκὸς,
κοχληρόν. Ἐπισφραγὲς ὃ τὸ τοῖτον καὶ
πρὸς τὰς κατώ κατάρσιδας.

Post longum morbum, ventris
depressio, mala. 5. 8.

Ἐπὶ χρονίῳ νεσθήματι κοιλίης κατα-
στροφὴ κακόν.

Testis dexter frigidus convul- 9. A Testi-
susque, lethale est. bus.
11. 8.

Ὅρχες δ' ἄξιός ψυχρὸς καὶ ἀσπασμώδης,
θανάτωδες.

Hæc igitur in febris acutis
præsertim obseruare oportet, vt
noscamus, quando quis moritu-
rus, & quando euasurus. 10. 8.

Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν
ὁξέσι σημεῖός τις ἐστίν, ὅποτε μέλλει ἀπο-
θνήσκειν, καὶ ὅποτε σωθήσεσθαι.

Moribundis, signa hæc multo 17. 8. Mortis pro-
funt manifestiora. Et venter at- xime immi-
tollitur atque inflatur. nentis signa
sunt, prædi-
cta omnia,
sed grauiora.

Terminus vero mortis est, cum
animæ calor supra vmbilicum, ad
locum diaphragmate superiorem
ascendit, & omnis humor exuri-

tur, Cum autem pulmo & cor humorem amiserint, calore in locum mortiferis collecto; spiritus caloris confertim exhalat, cuius opus totum cum toto compactum erat. Præterea partim per carnes, partim per cutis spiracula, unde vivere dicimus, relinquit anima corporis domicilium frigidum, & mortale simulachrum, & unâ cum bile, sanguine, pituita & carne, dedicatione reddit.

Μέλλουσιν ἀποθνήσκειν ταῦτα σαφέστερα γίγνεται, καὶ αἱ κοιλίαι ἐπαίρονται, καὶ φουσώνται.

Ὅς θ' δὲ τὰ θανάτῳ, ἐὰν τὸ τῆς ψυχῆς θερμὸν ἐπαέλθῃ ὑπὸ τῆς ὁμοιοῦς, εἰς τὸν αἶνα τῆς φρενὸς ἄν τὸ πον, καὶ συγκαυθῇ τὸ ὑγρὸν ἄπαν. ἐπειδὴ δὲ ὁ πνέμων καὶ ἡ καρδία πλεονέκτηται ἀποβάλλουσιν τὰ θερμὰ ἀποροῦντα θ' ἐν τοῖς θανάτωδεσιν τοποῖς, ἀποπνέει ἄνθρωπος τὸ πνεῦμα τῆς θερμῆς, ὅθεν ὡς σιωπῇ τὸ ὅλον εἰς τὸ ὅλον. πάλιν τὸ μὲν διὰ τῆς σαρκῶν, τὸ δὲ διὰ τῆς ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν, ὅθεν τὸ ζῆν χαλεμὸν, ἀπολείπεται ἡ ψυχὴ τὸ τῆς σώματος σκῆν θ', καὶ τὸ ψυχρὸν, καὶ τὸ θνήσκον εἶδω-

λον αμα κ' χολη, κ' αιματι, κ' φλέγμα-
τι κ' ουρική. παρ' εδωκεν.

PROGNOSTICA

*A rebus naturalibus, & non
naturalibus nonnullis
deprompta.*

MVlierem vtero gerentem,
corripi aliquo morbo acu-
to, lethale est.

30. 5.

Γυναικί εν γαστρί έχέση, υπό πνι-
θής οξέων νουσημάτων ληφθῆναι, θανά-
σιμον.

Qui natura valde crassi sunt ci-
tius moriuntur, quam qui graci-
les.

44. 2.

Οι παχέες σφόδρα κ' φύσιν, ταχυ-
θάνατοι γίνονται μάλλον η' ιχνών.

Senes iuuenibus, vt plurimum
minus ægrotant, qui vero morbi
ipsis accidunt diuturni, plerum-
que commoriuntur.

39. 2.

PROGNOST.

1. A Sexu
muliebri, e-
iusque gesta-
tionis tem-
pore, morbo
gravi, & acu-
to laceffio.

2. A Corpo-
ris habitu,
crasso vel
gracili, Qui
breuiori vel
diuturniori
vita fruatur.

3. Ab Æta-
te iuuenili
aut senili.

Οἱ παρ' ἐξέχουσιν τῶν νέων τὰ μὲν πολλὰ
 καὶ ἐξέχουσιν ἥσων. ἴσα δ' αὖ αὐτέοισι χέ-
 ρια νοσήματα χύηται, τὰ πολλὰ ξυμπα-
 ρήσκει.

4. A Cognat-
 tione & si-
 militudine
 Morbi, cum
 natura æ-
 gri, vel æta-
 te, consuetu-
 dine, vel tē-
 pore.

In morbis minus periclitantur,
 quorum nature & ætati, & habitui
 & tempori morbus magis cognat-
 us fuerit, quam quibus, in nullo
 horum cognatus extiterit. 34. 2.

Ἐν τῇσι νέστοισιν ἥσων κινδυνώουσιν,
 οἷσιν αὖ οἰκείη τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίας,
 καὶ τῆς ἐξιότητος, καὶ τῆς ὥρης, ἢ νέου ἢ
 πρεσβύτου, ἢ οἷσιν αὖ μὴ οἰκείη κατὰ πτε-
 ρέων.

5. Ab Anni
 constitutio-
 ne humida,
 vel sicca.

Ex anni tempestatibus, in vniuersum
 ficitates sunt imbris salubriores, &
 minus mortifera. 12. 3.

6. Ab Anni
 tempore ver-
 no vel au-
 tumnali.

Autumno in vniuersum Morbi acu-
 tissimi & exitiosissimi sunt, ver autem
 saluberrimum, & minime exitiale.

APHORISMI PROGNOSTICI,

Longitudinis & Breuitatis Morbi.

QVando toto corpore Mutationes accidunt, vt si corpus refrigeretur, & vicissim calefiat, vel color alius ex alio oriatur, Morbi significatur longitudo.

40. 4.

PROGNOST.
LONGITVD.

1. A qualita-
tum prima-
rum Muta-
tione crebra,
& Colorum,

Καὶ ὅτε ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ ὡς τὸ σῶμα καταψύχεται, ἢ αὖθις θερμαίνεται, ἢ χρώμα ἑτέρον ἐξ ἑτέρου γίνηται, μὴ καὶ νόσος σημαίνει.

Corpus eorum, qui non omnino leuiter febricitant, sibi constare nec minui, aut etiam plus æquo contabescere, malum: Illud enim morbi longitudinem, hoc vero virium imbecillitatem significat.

28. 2.

2. A Muta-
tione quanti-
tatis seu Mo-
lis corporis
Extenuatio-
ne & Mar-
core.

Aut Consti-
tutione æ-
quabili &
naturali in
mole, figura
& colore.

Τῶν πυρεσόντων μὴ πάντα πασιν ἐπι-
πολαίως, τὸ διαμύειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι
τὸ σῶμα, ἢ καὶ σωτήκεως μᾶλλον τῷ κατὰ

λόγον, μοχθηρόν· τὸ μὲν γὰρ μήκῃ νῆσθαι σημαίνει, τὸ δὲ ἀδένειαν.

4. SIGNA

DIAGNOSTICA ET PRO

GNOSTICA,

Morborum

Constitutio

nis seu dura

tionis, tum

etiam tem-

porum, 4.

Universalium,

tum parti-

cularium scili-

cet. paroxys-

morum,

A multis de

prompta,

puta,

A Morborum

ipsa idea.

Ab anni te-

pore.

A periodorum

proportione.

Denique à

signis Epi-

phenomenis

quæ in Ex-

cretis appa-

rent, seu vri-

nis, deiectioni-

bis, sputis,

& sudori-

bus.

Accessiones autem & constitutiones Morborum, indicabunt, Morbi ipsi & anni tempora, & periodorum inter se incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue maiori interuallo fiant: Quinetiam ex mox apparentibus indicia sumuntur, velut in pleuritide, Sputum, si statim initio appareat breuem fore denuntiat, si vero posterius conspiciatur, longum: Sed & urinae, deiectiones, & sudores quales apparuerint, iudicatu faciles aut difficiles, breues aut longos morbos fore prænuntiant. 12 I.

Τὰς δὲ παροξυσμῶν καὶ τὰς καταστάσεις
δηλώσκειν αἰνῶσι καὶ αἰσῶναι τὰς ἐν τῷ
καὶ αἰτῶν αἰσῶναι τὰς ἐν τῷ
δόσεις, ὡς τε καὶ ἡμέρῳ, ὡς τε
παρ' ἡμέρῳ, ὡς τε καὶ διὰ πλεί-
ονος χρόνου γίνωνται. Ἀπὸ καὶ τοῦ-
σιν ὁπφαινομένοις οἷον ἐν πλεί-
κοῖσι πύελον, ὡς αὐτὴ καὶ ὁπφαινται
ἀρχομένη, βραχυῶς. ὡς δὲ ἴσμεν ἐπ-
φαίνῃ, μηκυῖαι. καὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρή-
ματα, καὶ ἰδρώτες, καὶ δ' κριτα, καὶ δύσκει-

καὶ βραχέα καὶ μακρά τὰ νοσήματα,
ἐπιφαινόμενα δηλοῦν.

Quibus per febres, in urinis, se-
dimenta, crassiorem farinam refe-
runt, longum morbum significant.

31. 7.

4 SPECIA-
TIM ab uri-
næ hyposta-
si crassa lon-
gitudō mor-
bi prænun-
tiatur.

Ὁ κόσισι πυρέσουσιν ἐν τοῖσιν ὕρι-
σι κριμνώδεις αἱ ὑποστάσεις γίνονται,
μακρὴν πλὴν ἀρρώστῳ σημαίνει.

Quibus in urinis biliosa sedi-
menta, supra vero tenuis apparue-
rint, acutum morbum significant.

32. 7.

5. Ab Hypo-
stasi vero
biliosa,
Acuties mor-
bi prospici-
tur.

Ὁ κόσισι ὃ χολώδεις αἱ ὑποστάσεις,
ἀνωθεν ὃ λεπταί, ὀξείῳ ἀρρώστῳ ση-
μαίνει.

Febricitanti sudor superueniens
febre non deficiente, malum, pro-
rogatur enim morbus, & multam
humiditatem inesse significatur.

6.. Deinde cū
sudore non,
critico,

56. 4.

Πυρέσων πῖ ἰδρῶς ἐπιγρόμεθ, μὴ
ἐκλείπονθ τῷ πυρετῷ, κακὸν μὴ-
κύνει γὰρ ἡ νόσος, καὶ ὑγρὰσίῳ πλείῳ ση-
μαίνει.

8. Ab Abs-
cessu imper-
fecte Crisi-
co.

In febribus Abscessus, qui pri-
mis iudicationibus non soluun-
tur, longitudinem morbi signifi-
cant.

51. 4.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήματα, μὴ
λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις, μὴ-
κῶν ἐστὶν σημαίνει.

9. Ab Appe-
ritu & cibi
ingestione
per initia,
vires ægri
non reficien-
t.

Omnes fere malè habentes, qui per ini-
tia bellè cibum capiunt, nec proficiunt, cir-
ca finem tandem cibum fastidiunt. Qui
vero per initia cibum valdè fastidiunt,
postea autem bellè assumunt, in melius
evadunt.

32. 2.

10. Ab Anni
constitutione
humida.

Per assiduos imbres, morbi ferè fiunt
febres longæ, &c.

initio 16. 3.

A Constitu-
tione sicca.

Per siccitates, febres acutæ fiunt, &c.


initio 7. 3.

11. Ab Anni
tempore po-
tissimum Au-
tumnali,
morbi præ-
nuntiatur
longitudo,
Quartanæ e-
xemplo.

Aestivæ quartanæ plerumque
breves, autumnales vero longæ, &
maximè quæ ad hyemem perue-
niunt.

25. 2.

Οἰδεῖνοι τεταρταῖοι τὰ πολλὰ γίνον-
ται βραχέες. Οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροί,
καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα σωά-
προντες.



APHORISMI

DE SIGNIS

MAGNITVDINIS,
aut leuitatis, Morbi.

SIGNA MA-
GNITVDINIS
MORBI.

Qualia, qua per vesicam, aut aliu excernuntur, & qua per carnes abeunt, aut sicubi corpus à natura recedat, spectare oportet. Nam si parum, leuis est Morbus; si multum, magnus; si valdè multum, lethale est.

79. 7.

Sudor multus, frigidus, calidusve semper fluens, frigidus maiorem, calidus minorem significat morbum.

42. 4.

Quibus per febres, circa dentes lentor quidam obnascitur, his vehementiores fiunt febres.

53. 4.

Ὁ κόσισι ὅ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πείγλιθρα γίνεῃ, ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

Et quibus Deiectiones si resi-

4. A Deiectionibus

F

strigmento
sis & reten-
tis.

dere permiseris, nec moueris, ve-
luti strigmenta subsistunt, si pauca
fuerint, leuis est morbus, si multa,
magnus: His confert alui purga-
tio, Quod si aluo non purgata,
sorbitiones dederis, quanto plu-
res dederis, eo magis nocebis.

67. 7.

Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς εἰσὶν
ἐλῶαι, καὶ μὴ κινήσῃς οἷον ὑφίσταται ἔξυ-
σματα καὶ ὡς ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νῆσθ
γίνεται; ὡς ὅτι πολλὰ, πολλὴν τετέοισι
ξυμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίαν. ὡς ὅτι
μὴ καθαρὴν ποιήσας διδῶς τὰ ροφήμα-
τα, ἐκόσῳ αὖ πλείω διδῶς, μᾶλλον βλά-
ψεις.

γ A Crudo-
rum deiectione
ne pauca vel
copiosa.

Quæ cruda deorsum subeunt,
ab atra bile sunt, & si plura, maior;
si pauciora minor est morbus.

68. 7.

Ὅμοια αὖ καὶ τὸ ὡμα διαχωρῆν, ἐπὶ
χολῆς μελαίνης ἐνεστίν, ὡς πλείω, πλείων
ὡς ἐλάσσον ἐλάσσων ἢ νῆσθ.

Eodem spectant 66. 7. 79. 4.



METHODI APHORISMORVM

DISPOSITIVÆ,

SECTIO TERTIA.

*Complectens Aphorismos Spe-
ctantes ad particularem*

*Affectuum præter naturam,
in specie singulas corporis
partes obsidentium.*

*Vel Aetiologiam, Diagnosim, Progno-
sim, & Therapiam.*

PRÆFATIO.



ALENI decretū est, ^{Novo Me-}
ingenuarum artium ^{thodicep.}
studiosis præstitutū,
non licere artis vl-
lius notitiam adipif-
ci, nisi Cognitionem Vniuersalem
seu Methodum, per generalia

F ij.

« quædam theoremata quisque
 « ante capessat, ac deinde in par-
 « ticularibus exēplis se exerceat.
 « Quod scilicet, neque fieri possit,
 « vt sine multiplici in singulari-
 « bus Exercitatione, quod ex usu
 « sit, faciamus: neque sine vniuer-
 « salium cognitione exercitatio
 « procedat. Adeo vt non secus ac
 « quicumque iter aliquod ingre-
 « diuntur, vtroque crure inniti
 « student, & qui altero claudus,
 « vno duntaxat subnixus progre-
 « ditur, longo ille spatio, & sæpe
 « via errando iter conficit: Con-
 « similiter sane qui finem cuiuski-
 « bet artis consequi parat, duo-
 « bus his veluti cruribus aut in-
 « strumentis vtatur, necessum est,
 « Cognitione nempe rerum in
 « disciplina vniuersalium, Metho-
 « do dicta, & in singularibus E-
 « xercitatione, Καὶ γὰρ ὡς αὐτὸς, ἐν
 « λόγοις πείσωντες, ὁμῶς εἰδέναι,
 « ἔργον τὸ ἐκ μαθήσει, κατὰ τὸ κρυ-
 « πτὸς φαῦλ' ἐν πυρὶ κριθεῖς, τοῖς τοῖς
 « αὐτὸς ἀπέδειξε. Nam qui sermo-
 « num vniuersalium notitia freti,
 « sibi ipsis persuadent, sese ipsum

Hipp. lib.
 de decenti
 ornatu.

quoque artis opus singulare no-
uisse, non secus ac Aurum adul-
terinum ab igne examinatur, sic
certè illi absurditatis arguun-
tur. QVARE Hippocratis Gale-
nique consilio Medicus, in arte
sua futurus egregius, obtempe-
rabit, & vtramque in percipien-
da Medicina, Cognitionem vni-
uersalem, & particularem per-
sequetur: Quandoquidem enim
Medicus non aggreditur Mor-
bum in genere expugnandum,
sed hanc vel illam particularem
morbi speciem ac differentiam
singulam quamque corporis
partem obsidentem: Morbi re-
uera COGNITIO ad Curationem
prærequisita, non modo in vni-
uersali, sed etiam in particulari
asssequenda, (itidémve CVRA-
TIO.) Quocirca Affectus præ-
ter naturam singularum partiũ,
Morbos nempe & Symptoma-
ta speciatim noscere operæpre-
tium, ex cuiusque ÆTIOLOGIA,
DIAGNOSI & PROGNOSI, in-
stituta, absque quo videlicet o-
mnis exercendi conatus prorsus

inutilis & futurus. ITAQVE huic
 præscripto legislatorum artis in-
 signiorum stando; post præmissam
 antehac affectuum præter natu-
 ram COGNITIONEM VNIVERSA-
 LEM, quantum ex Aphorismorum
 libris deprehensam consequi po-
 tui, tam in Ætiologia, quam Me-
 thodo Diagnostica & Prognosti-
 ca iam Affectuum præternaturā,
 IN SPECIE NOTITIAM, Quæ ex
 eorum tum causis, tum differen-
 tiis, atque signis dependet, nec
 non & interdum THERAPIAM,
 ubi hanc Hippocrates in Apho-
 rismis attigit, libuit subiungere.





APHORISMI

DE AFFECTIBVS

PRÆTERNATURAM

Partium internarum.

Primò, De Cerebri Pathematis;

*Præsertim vero de Actio-
num Animalium Nexis.*

*Ac in primis, De Læsione Ratio-
nis, eaque insigni in Delirio.*

*Et 1. De Phrenitide, ac simplici
dicto Delirio.*



VI dolentes aliqua
parte corporis, dolo-
rem ferè non sentiunt,
his mens ægrotat.

6. 2.

SIGNVM
DIAGNOSTI-
CVM DELI-
RII præ aliis
est: Sensus
tactus pri-
uatio vel
imminutio
dolore ali-
cubi infe-
stante,

Ὅ κοῖτοι πονέοντες π. τὸ σῶματος, τὰ
ὁλὰ τῆς πόνων ἐκ αἰσάνον, τὰ τέτοι-
ν ἢ γνώμη νοσεί.

PROGNOST.
DELIRII
tum saluta-
ria, tum le-
thalia. ET
PRIMO ab
Assumptis,
ut vino mul-
to.

2. Ab Ictu,
seu vulnere
capitis.

Ex multa vini potatione, ri-
gor, & delirium, malum. 7. 7.

Ἐκ πολυποσίας ῥίγος καὶ παραφρο-
σύνης, κακόν.

Propter plagam in capite ac-
ceptam stupor & desipientia,
malum. 14. 7.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς τὸ κεφάλαιον ἔκ πλη-
ξης, ἢ παραφροσύνης, κακόν.

3. A Morbo
precedente,
nempe peri-
pneumonia.

A peripneumonia phrenitis,
malum. 12. 7.

Ἐπὶ περιπνευμονίᾳ φρενίτις, κα-
κόν.

4. A Vigilia
immodica
pregressa.

Propter vigiliam, conuulsio,
aut desipientia, malum. 18. 7.

Ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ ἀσασμὶς, ἢ παραφρο-
σύνη, κακόν.

5. A Somno
consequente.

Vbi somnus delirium sedat, bonum.
2. 2.

6. Ab Hæ-
morrhagia.

A sanguinis profluuiio desi-
pientia, aut etiam conuulsio,
malum. 9. 7.

Ἐπὶ

Ἐπὶ αἵματι & ῥύσφι παραφροσύνῃ,
καὶ σπασμῶς, κακόν.

Desipientiæ, quæ cum risu fiunt
securiores, quæ verò seridò, pericu-
losiores.

Ab adiuncto
Risu, vel se-
ueritate, ar-
que feroci-
tate.

53.6.

Αἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μὴ γέλωτι
γινόμεναι, ἀσφαλέστεραι. αἱ δὲ μὴ σπεν-
δῆς, ὀπιοσφαλέστεραι.

Quibus urina perspicua & alba,
mala: maximè verò si in Phreneticis ap-
pareant.

Ab urina
alba & per-
spicua,

72.4.

Qui supra quadraginta annos
phrenetici fiunt, non omnino sa-
nantur, minùs enim periclitan-
tur, quorum naturæ & ætati mor-
bus est familiaris.

Ab ætate
declinante
& senili.

85.7.

Ὅκοσοι ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα
φρενιτικοὶ γίνονται, καὶ πάντες ὑγιάζονται.
ἦσαν γὰρ κινδυνέουσι οἷσιν ἂν οἰκείῃ
τῇς φύσεως, καὶ τῇς ἡλικίᾳς ἢ νε-
ότεροι.

APHORISMI DE MANIA.

PROGNOS-
TICVM BONVM
EST
Solutio eius
per humoris
descensum.
Vel ad ven-
trem ad a-
num & ar-
tus.

Ab insania, dysenteria, vel hy-
drops aut, mentis alienatio, bo-
num.

5.7.

Ἐπὶ μανίῃ δυσεντεῖν ἢ ὑδρωτὶ, ἢ
ἐκσασί, ἀγαθόν.

Insanis, si varices, vel hæmor-
rhoides superuenerint, insanix so-
lutio.

21.6

Τοῖσι μανιομένοισι κισσῶν ἢ αἰμορ-
ροΐδων ἐπιγνομένων, τῆς μανίης λύ-
σις.

DE MELANCHOLIA.

DIAGNOS-
TICA MELAN-
CHOLIAE,
sunt

Metus &
tristitia præ-
gressæ.

Si Metus, & tristitia longo tem-
pore perseuerent, melancholiam
significant.

23. 6.

Ἦν φόβος ἢ δυσθυμία πολὺν χρόνον
ἔχουσα διατελεῖ, μελαγχολικὸν τὸ τοῖς.

PROGNO-
STICVM
Morborum
melancho-
licorum so-
lutionis cri-
tica per hæ-
morrhoides

τον.

Melancholicis & nephriticis, hæ-
morrhoides superuenientes, bo-
num.

11.6.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι καὶ τοῖσι νε-
φριτικοῖσιν αἱ μορροῖδες ἐπιγνώμεναι,
ἀγαθόν.

In morbis melancholicis, ad Malæ autem
hæc, Decubitus humorum peri- per Decubi-
culosi sunt, eo quod vel apople- tum seu me-
xiam corporis, vel conuulsionem, tastasin hu-
vel maniam, vel cæcitatem signifi- morum me-
cant. lancholico-
rum in cer-
tas corporis
partes.

§6.6.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νεσθήμασιν ἐς
τάδε ὀπκίνδωσι αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀπο-
πληξίῳ τῷ σώματι, ἢ ἀσπασμόν, ἢ τύ-
φλωσιν σημαίνε.

Eodem spectat. 40.7.

Melancholicos autem vehemen- Curationis
tius infra purgabis, eadem ratio- Est Cathar-
ne, contraria apponens. sis vehemē-
tior per in-
feriora,

9.4.

Τὸς ὃ μελαγχολικὸς ἀσροτέρος τὰς
κέτω, τῶν αὐτῶ λογισμῶ τ' ἐναντία
προσθίς.

G ij

DE MOTVS LÆSIONIBVS,

Primò de Apoplexia.

Qua ætate
contingit
maximè, quo
tempore ve-
ro fieri so-
leat, vide
aph. 23. &
16. sect. 3.

Apoplexiæ fiunt maximè à qua-
dragesimo anno ad sexagesimum
vsque.

57.6.

Ἀπὲ πληκτοὶ ὅ μάλιστα γίνονται ἡλι-
κίη τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων, ἄρχις
ἐξήκοντα.

PROGNOST.
A magnitu-
dine aut le-
uitate Apo-
plexiæ.

Soluere apoplexiam fortem,
quidem impossibile, leuem verò
difficile.

42.2.

Λύειν ἀποπληξίαν ἰσχυρὰν ἀδύνα-
τον, ἀδυνέα δὲ ἢ ῥηδίον.

Prognosti-
cum eius
termini, seu
solutionis
ad salutem
vel mortem,
Stertore
aphoniæ co-
mitæ.

Quibus bene valentibus, capitis
dolores de repente accidunt, sta-
timque muti fiunt & stertunt, intra
septimum diem intereunt, nisi fe-
bris apprehenderit.

51.6.

Ὅσοι σποινὴν ὑγιαίνουσιν ὁδῶναι γίνον-
ται ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ πρὸς
ῥῆμα ἄφωνοι γίνονται, καὶ ῥέχουσιν,
ἀπὸ λυγρῆς ἐπιπλῆξιν ἡμέρησιν, ὡς μὴ πυ-
ρετὸς ἐπιλάβῃ.

Si ebrius quispiam, derepentè mutus fiat, conuulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ad horam perueniens qua crapulæ soluuntur, vocem recuperet.

Prognost. Solutionis αφωνίας, Apoplexiæ aut Caro similis affectus, ab ebrietate excitati tribus modis, vel.

5.5.

Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνος τις γίνηται, ἀπαθείς ἀποδηήσκει, ἢν μὴ πυρελὶς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθὼν καθ' ἣν αἱ κραπαλαὶ λύονται, φθέρῃ.

Solutione crapulæ, Febre superueniente, Vel denique conuulsione lethali.

DE EPILEPSIA.

Pueri epilepsia laborantes, mutatione potissimum ætatis & locorum & victuum, liberantur.

PROGNOST. Solutionis spontaneæ epilepsiæ, tum progressu ætatis, tum mutatione victus & loci.

45.2.

Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴ αἱ μεταβολαὶ μάλιστα τῆς ἡλικίας, καὶ τῶν τόπων, καὶ τῶν βίων ποιέουσιν.

Quibus epilepsia ante pubertatem accidit, mutationem recipit quibus verò post vigesimum quintum annum, his fere commoritur.

Qua ætate fiat epilepsia solutio, & quæ non amplius fieri possit.

7.5.

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόσοις περὶ τὸν ἥβης γίνεται, μετέστανιν ἔχει, ὁκόσοις δὲ

πέντε καὶ ἑκοσιν ἐτέων γίνεθ', τὰ τέσσαρτα

Quo tempo-

re eius Ge-

neratio fiat

vide aph.

23.3.

CAUSAE

INTERNAE

Convulsio-

nis duae, sci-

licet, Reple-

tio vel Ina-

nitio,

Causae ex-

ternae quae-

dā. i. Frigus

externum

immodi-

cum.

2. Calor;

tam exter-

nus, v.g. aë-

ris calidi, vel

caustici quā

internus, sci-

licet, ardor

febrilis,

DE CONVULSIONE.

Convulsio fit vel à repletionem,
vel inanitionem; ita & singultus.

39.6

Σπασμὸς γίνεθ' ἢ ὑπὸ πληροσίν, ἢ κενόσιν, ἔτω δ' καὶ λυσμὸς.

Frigidum vero convulsiones, tetanos nigrores & rigores febriles efficit.

17.5.

Propter ardores vehementes,
Convulsio aut tetanus malum.

13.7.

Ἐπὶ καύμασιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς ἢ τέτανος, κακόν.

In febribus acutis convulsiones & circa viscera dolores fortes, malum.

66.4.

A sanguinis copioso fluxu, convulsio, aut singultus, malum.

3.5.

PROGNOSTICA, à

Causa inaniente.

i. Ab hæmorrhagia.

Αἷμα δὲ πολλὰ ρυένθ', σπασμὸς ἢ λυσμὸς ὅτι γρόμφος, κακόν.

Convulsio, vulnere superueniens, letalis.

2. 5.

A Purgatione immodica, convulsio, aut singulus superueniens, malum.

4. 5.

2. Ab excretionem immodica humorum à Medicamento,

Propter vigiliam, convulsio, aut delirium, malum.

18. 7.

3. à Vigilia immoderata prægressa.

Si ebrius quispiam de repente mutus fiat, convulsus moritur, &c. vide aph.

5. 5.

4. Prognost. à Causa repleta scilicet Ebrietate.

Febrem convulsioni superuenire melius quam febrì convulsionem.

26. 2.

5. Prognost. eius Solutionis spontanea, à febre epigenomena, cum convulsio fit à Repletionem.

Spasmo & tetano vexato, febris superueniens morbum soluit.

57. 4.

Ἡ πὸ σπασμῶν ἢ τελευτῶν ἐσοχλημύση πνεύματος ὁπρὸς μὲν λύει τὸ νόσημα.

Quartanis correpti non omnino convulsionibus capiuntur, si vero prius tentati fuerint, superueniente quartana liberantur.

70. 5.

6. SOLVTIO. Convulsionis, speciatim, à febre quartana epigenema, tica.

G iiij

Οἱ ὑπὸ τετάρτων ἀλυσκόμενοι,
ὑπὸ πᾶσι καὶ πάνυτι ἀλίσκονται, ἢν
ὅ ἀλίσκωνται πρῶτον, εἴτα ἐπιήθη-
ται τετάρτῳ, παύσεται.

Eodem spectat. 63. 5.

7. Prognos-
ticum solu-
tionis ter-
mini, inte-
tano seu ad
salutem siue
mortem.

Qui tetano corripuntur, intra
quatuor dies intereunt, si vero hos
effugerint, sani fiunt.

6. 3.

Ὅσοι ὑπὸ τετάνῳ ἀλίσκονται, ἐν
τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλωνται. ὡς ὅταν
διαφύγῃ, ὑγιέει γίνονται.

CURATIO
Convulsio-
nis, per frigi-
dam ex ac-
cidenti, per
se tamen
Caloris be-
neficio anti-
peristasi in-
tus coacto.

MITIGATIO
Convulsio-
nis, fit etiam
caloris præ-
sidio (Vide
aphor. 21. 5.

Nonnumquam in tetano, sine
ulcere, iuvene bene carnosio, æsta-
te media frigidæ largæ persusio,
caloris reuocationem facit. Calor
autem hæc soluit.

21. 5.

Ἐστὶ ὅς ἐστι ἐπὶ τετάνῳ ἀνὰ ἑλκεθ,
νέω δὲ σάρκι, δέρεθ μέσῳ, ψυχρῷ
πολλῷ καὶ ἀχρῶς ἐπανάκλινσιν δερμῆς
ποιέεται. δερμὴ ὅταν ταῦτα ῥύεθ.

DE SENSUS TACTVS IN

Capite insigniori noxa,
scilicet Dolore capitis.

Quibus in febribus, urinae tur-

Prognosti-
cum.

DE AFFECTIBVS. 79

data velut lumentorum, his capi-
tis dolores adsunt vel aderunt.

Cephalalgia
futura in
febri.

70.4.

Ab vrina
turbata &
subiugali
petitum.

Ὅκοσις, ὃ ἐν πυρετοῖσι τὰ ἔρα ἀναίε-
τα παραμύδα, οἷον ὑποζυγίων, τῶ ἐοισ-
κεφαλαιαί ἢ παίρεισιν, ἢ παρέσονται.

Caput dolenti, & vndique la-
boranti, pus velaqua, vel sanguis
per nares, os, vel aures affluens
morbum soluit.

Prognost.
solutionis
spontaneæ
Cephalalgia
ab excretio-
ne puris,
aquæ, vel
sanguinis.

10.6.

Κεφαλῶν πονέοντι καὶ ἀποδυνέοντι,
πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυέν καὶ τὰς ῥί-
νας, ἢ καὶ τὸ στόμα, ἢ καὶ τὰ ὦτα, λύει τὸ
νόσημα.

Dolenti partem posteriorem
capitis, in fronte recta excurrens
vena secta prodest.

CURATIO
Cephalalgia
partis postie-
cæ.
Per venæ
sectionem in
fronte re-
uulsiva m.

68.5,

Τὰ ὅπουθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνομέ-
νω, ἢ ἐν μετώπῳ ὀδυνοφλέψι τμηθεῖσα,
ὠφελέει.

DE OCULORVM AFFECTIBVS
præter naturam.

Ophthalmia laborantem, alui pro-
luuio corripere bonum.

SOLVTIO
Ophthalmia
spontanea.
Per diar-
rhœam su-
peruenien-
tem.

177.

Ὁφθαλμῶντα ὑπὸ διαρροΐης λυφ-
θῆναι, ἀγαθόν.

CURATIO.
Dolorisocu-
lorum.
Remediis
multis mo-
lienda,

Dolores oculorum meri potio,
aut balneum, aut fomentum, aut
venæ sectio aut medicatio soluit.

31. 6.

Ὁδυνὰς ὀφθαλμῶν ἀκρητοπόση, ἢ
λεπρόν, ἢ πυεΐν, ἢ φλεβοτομήν, ἢ φαρ-
μακείην λυεῖ.

Dolores oculorum, post mer
potionem, & aquæ calentis copio-
sæ balneum, venæ sectione curato.

46. 7.

Ὁδυνὰς ὀφθαλμῶν ἀκρητον ποτί-
σας, καὶ λέσας πολλῶν θερμῶν, φλεβο-
τόμει.

DE AFFECTIBVS

Aurium.

SURDITATIS
Causa est
nonnum-
quam.
Suppressio
biliosæ de-
iectionis.

Quibus biliosæ deiectiones, su-
perueniente surditate cessant, &
quibus surditas adest, biliosis de-
iectionibus superuenientibus ces-
sat.

28. 4.

Ὁκόσοισι χολώδεα τὰ διαχωρήματα,
κωφώσι θ' ἡνομήνης παύει. καὶ ὁκόσοισι

ώφωσις, χαλωδέων γινομένων παύε-
ται.

Quibus in febribus aures ob-
surduerunt, his sanguis è naribus
fluens, aut alius turbata morbum
solvit.

SOLVTIO
Surditatis
in febribus
contingen-
tis, per deie-
ctiones bi-
liefas, & he-
morrhagiam
narium.

60.4.

Όκόσισι αν εν τοις πυρετοις τα
ωτα κωφωδη, αιμα εκ ρινων ρυεν, η
κοιλίη εκπαρχθεισα, λυει το νε-
σημα.

DE NARIVM, AFFECTIBVS
præter naturam.

Quibus nares, naturâ humidio-
res & genitura liquidior, ii vale-
tudinarij viuunt: Quibus vero
contraria, salubrius degunt.

Humor ex-
crementitius
ex cerebro
per nares
stillans &
semen liqui-
dus.

2.6.

Οιςι ρινες υγρότεραι φύσι, η η
γνη υγρότερη, υγαινεσι νοσηέτερον.
Οιςι δ ταπανλία, υμεινότερον.

SIGNA SVNT
Intemperiei
frigida hu-
midæ
Quæ sanita-
tis infirmæ
morbisque
obnoxia, est
causa.

Rauedines & Grauedines, in
valdè senibus, coitionem non re-
cipiunt.

Humor ex-
crementitius,
per nares &
fauces stil-
lans, Coctio-
nem in se-
nioribus non
recipit, ideo-
que nec sa-
nationem.

40.2.

Βεγγχι η κόρυζαι τοιςι σφίδρα
προσβύτησιν ε πεπαίνον.

STERNUTATIONIS
Causa,

Sternutamentum fit ex capite, cerebro calefacto, aut præhumectato spatio in capite inani; Aër enim intus contentus foras erumpit, strepit autem, quia perangustum exit.

§1. 7.

Παραμῶς γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, δια-
δερμαιομῶς τῷ ἐγκεφάλῳ, ἢ διουραιο-
μομῶς τῷ ἐν τῇ κεφαλῇ κανῶν, ὑπερχεῖ-
ται γὰρ ὁ αἷς ὁ ἐνὲων ἔξω. φρεῖ δ', ὅτι
διὰ σπινῆς ἢ δι' ἐξοδῶν αὐτῶν ἐστίν.

Sternutatio
nis effectus
salutares,
sunt.

Singultienti, sternutatio superueniens
singultum soluit.

13. 6.

1. Solutio
singultus.
2. Iuuamen
in partu, ac
suffocatione
uteri.

Mulieri hysterica, aut difficulter pa-
rienti, sternutatio superueniens, bonum.

35. 5.

DE ORIS, LINGVÆ, DENTIVM
Affectibus.

Linguae pa-
ralysis subi-
tanea
Causa.

Si lingua derepente inconti-
nens fiat, aut pars aliqua corpo-
ris resoluitur, tale est melancho-
licum.

40. 7.

Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρετὴς γί-
νεται, ἢ ἀποπληκτόν τι τῷ σώματι, με-
λαγχολικὸν τὸ ποιεῖται γινεῖ.

Balbilongo alui profluvio, maximè ca
viuntur.

32. 6.

Linguae Mo-
tu Vitioso,
seu balbutie
affecti, diar-
rhœa sunt
obnoxij.

Frigidum inimicum ossibus, dentibus,
&c.

18. 5.

DE GUTTURIS ET FAUCIUM

Affectibus præter naturam, &
præsertim de Angina.

Angina correpto, tumor in col-
lo superueniens bonum, foras
enim vertitur morbus.

37. 6.

PROGNOS T.
bonum in
angina.
1. à Tumore
foras erum-
pente in
collo.

Ἐπὶ κυανῆς ἐχρημύω οἰδημα γενέ-
σθαι ἐν τῇ τραχείᾳ, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ πρέ-
πει τὸ νόσημα.

Angina correpto, tumor & ru-
bor in pectore superueniens, bo-
num, foras enim vertitur morbus.

49. 7.

2. à Tumore
erumpen-
te in pecto-
re.

Ἐπὶ κυανῆς ἐχρημύω οἰδημα καὶ ἐρύ-
θημα ἐν τῇ στήθει ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν.
ἔξω γὰρ πρέπει τὸ νόσημα.

Si febricitanti repentè collum
intorqueatur, ac vix deglutire
queat, nullo apparente tumore,
lethale est.

35. 4.

PROGNOST.
MALVM.
1. à Tumore
nullo appa-
rente, & à
Deglutione
læta,

84 APHORISMI

Ἡν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ ὁ πρῶτος
αὐτοῦ ἐξ αίφνης ἐπιγραφῇ, καὶ μόλις κατα-
πίνει δύνει, οἰδήμαί τε μὴ εὐρίθ
θανάσιμον.

2. A Respi-
ratione ferè
abolita, Si febricitanti strangulatio de
repente accidat, nullo in faucibus
apparente tumore, lethale est.

34. 4.

Ἡν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ οἰδήμαί τε
μὴ εὐρίθ ἐν τῇ φάρυγγι πίξις ἐξ αίφ-
νης ἐπιγίνεται, θανάσιμον.

3. Prognos-
ticum, strā-
gulationis
seu suffoca-
tionis.
Ab Excreta
per os spu-
ma.

Strangulati & suffocati nondum
tamen mortui, non redeunt ad
vitam, quibus spuma circa os fue-
rit.

43. 2.

Τῶν ἀπὸ χολῆς καὶ καταυρομένων,
μυδέπω ὅ τε δυνάτω, ἐκ ἀναφύεσιν
οἱ τοὶ ἀνὰ πρὸς ἡ πρὸς τὸ σῶμα.

Prognost.
Cruditatis
in raucedine
& grauedi-
ne.

Rauedines & grauedines, in valde
senibus, coctionem non admittunt.

40. 2.

Vbi fauces agrotant, &c.

Vide. 15. 5.

Ango et angor
schizomane
 DE AFFECTIBVS. 85
et huiusmodi
 DE PECTORIS AFFECTIBVS
prater naturam.

I. De Peripneumonia.

Quibus ab angina liberatis, ad pulmonem, mali fit conuersio, intra septem dies moriuntur, si vero hos effugerint, empyici fiunt.

PROGNOST.
 Peripneumonia ex angina orta vel solaciam empyemate aut morte.

10. 5.

Ὅσοι οἱ κινάσχω διαφύγουσιν ἐς τὸν πνέμονα πρέπει, ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀποθνήσκουσιν. Ἦν δὲ ταύτας διαφύγουσιν, ἐμπυοὶ γίνονται.

infantibus

A pleuritide, peripneumonia, malum.

Prognost.
 Peripneumonia ex pleuritide orta, ob metastasim à pleura ad pulmonem.

11. 7.

Ἐπὶ πλειρίτιδι περιπνευμονία κακόν.

A peripneumonia, phrenitis, malum.

12. 7.

Pleuritide aut peripneumonia laboranti diarrhœa superueniens, malum.

Prognost.
 ex epigenesi phrenitidis tum ex epigenesi diarrhœæ,

16. 6.

Ἦν περὶ πλειρίτιδι ἢ ἐπὶ περιπνευμονίᾳ ἐχόμενα, διάρροϊα ἐπιγνομένη, κακόν.

DE PLEVRITIDE.

DIAGNO-
STICVM,
pleuritidis
aut alius
doloris late-
ralis, dicitur
A doloris
differentia,
vel magni-
tudine.
Qui pleuri-
tidi non ob-
noxij.

PROGNO-
STICVM.
Coctionis, &
ideo breui-
tatis morbi,
à sputo cito
apparente.

Prognosti-
cum Criti-
cum, vel
Purgationis
per sputa, vel
Suppuratio-
nis seu em-
pyematis.

Prognost.
Solutionis
Empyematis
ex pleuritide
orti, vel per
anacathar-
sim intra
40. dies.
Sin minus,
per Phthisis
epigenesim.

Dolores laterum & pectoris, aliarum-
que partium, an multum differant, per-
quirendum.

Qui acidum eructant, rarò pleu-
ritici fiunt.

Οἱ ὀξύρογμοὶ δὲς ἔ πάνυτι πλε-
ετικοὶ γίνονται.

In pleuritide, si sputum initio statim
appareat, morbum breuem fore nuntiat, si
verò postea, longam, &c.

Qui pleuritide laborantes, intra
quatuordecim dies, supernè non
repurgantur, hi ad empyema con-
uertuntur.

Ὅσοι πλεετικοὶ γενόμενοι, ἐκ
ἀνακαθαίρονται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέ-
ρησι, τῷ ἐόσειν ἐς ἐμπύημα μετέστανται.

Qui ex pleuritide empyici fiunt,
si intra quadraginta dies, supernè
repurgentur, à ruptione empye-
matis liberantur, sin minus, in ta-
bem conuertuntur.

15. 5.
Ὅσοι

Ὅσοι ἐκ πλεῖπιδος ἔμπυοι γίνον-
ται, ὡς ἀναγκαζομένη ἐν τεσσαράκοντα
μέρησιν ἀφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις γένηται, πα-
ύονται, ὡς ὅ μὴ, εἰς φθίσιν μεδίσαν.

DE EMPYEMATE.

Quicumque empyici aut hy-
dropici vruntur aut secantur, si
pus aut aqua confertim effluxe-
rit, omnes moriuntur.

CURATIO
NISEMPYE-
MATIS
CURATIO, in
Vacuationis
puris quan-
titate & va-
cuandi mo-
do.

27.6.

Ὅσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ καίονται
ἢ τέμνοντο, ἐκ γυνήτος τὰ πύεϊ ἢ τὰ ὑδα-
τι ἀδρόα, πάντες ἀπόλλυνται.

Quicumque empyici vruntur,
aut secantur, si purum pus effluat
evadunt, si vero subcruentum, fæ-
culentum & fætidum, moriuntur.

PROGNOST.
Salutis &
moris em-
pyicorum
petitum à
vacuati pu-
ris qualitate
laudabili aut
viciosa.

44.7.

Ὅσοι ἔμπυοι καίονται ἢ τέμνονται,
ὡς μὴ τὸ πύον καθαρὸν ῥυῖν καὶ λεκόν,
πειγνύνονται. ὡς ὅ ὑφαιμον καὶ βορβοροῦ-
δες, καὶ δυσώδες, ἀπόλλυνται.

DE ASTHMA TE, ET GIBBO.

Qui gibbi ex asthmate, aut tussi
sunt, ante pubertatem, moriun-
tur.

PROGNOST.
Gibbi, à cau-
sa duplici,
nempe Asth-
mate vel
tussi.

46.6.

H

Quo tem-
pore fiat vi-
de aph. 22. 3.
Qua ætate
fiat vide 26.
& 30. 3.

CAUSA, Ca-
tharri &
Tussis fre-
quens, est
frigus exter-
num.

Prognost.
Cognitionis &
temporis
suppuratio-
nis,

Ὅσοι υἱοὶ ἐξ ἀδμαῖο ἢ βηχὸς
γίνοντο περὶ τῆς ἡέτης, ἀπόλλυνται.

DE DESTILLATIONE in pectus.

*Frigida, velut nix & glacies inimica
pectori, tusses mouent sanguinis fluxiones
& destillationes.* 24. 5.

Destillationes in ventrem supe-
riorem intra dies viginti suppu-
rantur. 38. 7.

Καὶ ἄρροι ἐς τὴν ἀνω κοιλίαν ἐκ πυ-
ρῆται ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

TySSIS SiccA
& modica
in febribus
ardentibus,
sitim lenit,
alioquin in
his vehemen-
tem.

CAUSAE
Tussis exter-
nae, Res frigi-
dæ præsertim
statuuntur.
Vt aer aph.
5. 3. & alia
sumpta, vel
admotæ, aph.
24. 5.

DE TVSSI.

*Quibus siccae tusses, modicè ir-
ritantes in febribus ardentibus, ij
non admodum siticulosi sunt.* 54. 4.

Ὅσοις ἐπὶ πολὺ βῆχες ξηραὶ, βρα-
χέα ὑπερίσκει ἐν πυρετοῖσι καυσί-
ασι, & πάνυ τοὶ διψώδες εἰσιν.

DE SPVTO SANGVINIS & puris.

Qui sputo
sanguinis
magis obno-
xij.

*Adolescentibus sanguinis effusiones ta-
bes.* 29. 3.

Qui sanguinem spumofum ex-
pouunt hic è pulmone educitur.

13. 5.

DIAGNOSTICVM, partis à qua fluit sanguis, Pulmonis, nempe, si sanguis est spumofus.

Ὅκοσοι αἷμα ἀφρώδες ἀναπύουσι, τελέουσι ἐκ τῆς πύκνωσης ἢ τοιαύτης ἀναγωγῆς γίνεσθαι.

Sanguis, supernè quidem excretus qualiscumque sit, malum, infernè autem si niger excernatur, bonum.

25. 4.

PROGNOST. malum.

1. A sanguinis excretionem per loca incommoda.
2. A puris sputo consequente sanguinis sputum.

A sanguinis sputo puris sputum malum.

15. 7.

Ἐπὶ αἷματι πύκνωση, πύκνωσις, κακόν.

A puris sputo phthisis, & fluxio, cum vero sputum retentum fuerit moriuntur.

16. 7.

3. A Phthisi consequente, Puris sputum.

Ἐπὶ πύκνωσιν φθίσις καὶ ρύσις. ἐπὶ δὲ τὸ πύκνον ἴσχυς, ἀποθνήσκουσιν.

A sanguinis vomitu, tabes, & puris supernè purgatio.

78 7

A tabe autem fluxio ex capite, à fluxione alui fluor, ab alui fluore, retentio supernæ purgationis, à retentione mors. (quod additum in exemplaribus quibusdam.)

4. A Fluxione ex capite superueniente & Alui fluore.

H ij

Ἐπὶ αἵματι ἑμέτω φθόνη καὶ τὰ πύ-
κα δαρσιν ἄνω, καὶ ἐπὶ τῇ φθόνη ῥάμα
ἐκ τῆς κεφαλῆς, ἐπὶ τῷ ῥάματι διαρ-
ροία, ἐπὶ τῇ διαρροίᾳ χέσις τῆς ἄνω
καθάρσεως, ἐπὶ τῇ χέσει θάνατος.

DE PHTHISI.

CAUSA
Dispositiva
Phthisis, est
tunc ætas iu-
uenilis.

Phthisis, his præsertim fit ætati-
bus, quæ sunt ab anno decimo-
octavo, usque ad trigessimum-
quintum. 9.5.

Φθίσις γίνεθ' μάλιστα ἡλικίῃσι τῇ-
σιν ἀπὸ ὀκτωκαιδέκα ἑτέων, μέχρι πέν-
τε καὶ τριήκοντα.

Tum etiam
tempus au-
tumni.

Autumnus Tabidis noxius.

10.5.

PROGNOSIS
Phthisis.

1. ex Sputo
fætido.

2. ex Capil-
lorum de-
fluio.

Qui tabe vexantur si sputum,
quod extussiunt, carbonibus inie-
ctum graueolet, & capilli ex capite
defluunt, lethale. 11.5.

Τοῖςιν ἀπὸ τῆς φθίσεως ἐνοχλε-
μένοιςιν, ὡς τὸ πύσμα ὃ πρὸς ἄνδρα
ἐκείνῳ βαρὺ ὅσον ἐπὶ τὰς ἀνδράκας
ὀπιχρόμνον, καὶ αἱ τεῖχες ἀπὸ τῆς κεφα-
λῆς ῥέεισι, θανάσιμον.

3. ex Alui
fluore su-
perueniente.

Quibus talis laborantibus, ca-

DE AFFECTIBVS. 91

illi ex capite defluunt, hi diarrhoea superueniente moriuntur.

12. 5.

Ὅκοσοιζιν ἂν φθισιῶσιν αἱ πείχες
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔτοι διαρροίης
ἐπιγνομένης ἀποθνήσκουσιν.

Si phthisi detento, diarrhoea superueniat, lethale.

14. 5.

Ἦπερ φθισιῶν ἐχομένων διαρροία ἐπι-
γνομένη, θανάσιμος.

CURATIO.

Vitu idoneo.

Nempe lacte & Purgatione per inferiora.

Tabidis, lac dare conuenit, qui non multum febricitant. in fine 64. 5.

Tabidos vero, per inferiora purgabis, cauendo supernas purgationes. 8. 4.

DE VENTRICVLI AFFECTIBVS præter naturam,

Et I. Vomitu.

Qui sanguinem vomunt, si sine febre, salutare est, si cum febre malum: Curare vero oportet refrigerantibus & astringentibus.

37. 7.

PROGNOST.

Salutis & mortis.

1. A Vomitu sanguinis & febre adiuncta, necne.

2. A Vomitu atræ bilis.

Morbis quibusuis incipientibus, si atra bilis supra aut infra exierit lethale.

22. 7.

H ij

3. A Vomitu
puris, ex tu-
berculi in-
terni rup-
tione.

A tuberculi introrsum ruptione
exolutio, vomitio, & animi defe-
ctio fit. 8. 7.

Ἐπὶ φύματι & εἰσωρήξεως, ἐκλυσίς,
ἐμελί & λειποψυχία γίνεσθαι.

4 Prognost.
Malum à
singultu &
oculorum
rubore, vo-
mitum con-
sequente.

A vomitu, singultus & oculo-
rum rubor, malum.

3. 7.

5 Prognost.
Malum à
præcedente,
affectu, Vo-
mitus causa
ut ab Ileo, &
Vulnere ca-
pitis cum
fractura.

Ἐπὶ ἐμέτῳ αὐγξὴ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυ-
θοὶ, κακόν.

Ab ileo vomitus, aut singultus, con-
uulsio aut desipientia, malum.

10. 7.

6. SANATIO
Spontanea
diarrhoea,
per vomitum
ut Reuul-
sivum præ-
sidium.
Sanatio vo-
mitus san-
guinis spon-
tanea, in
muliere per
Mensium
fluorem, ut
reuulsivum
auxilium.

Quibus præscinditur cerebrum, ne-
cesse est febrem & bilis vomitum super-
uenire.

50. 7.

Diarrhoea longa laboranti, sponte vo-
mitus superueniens, morbum soluit.

15. 6.

Mulieris sanguinem euimenti men-
struis erumpentibus, solutio fit.

32. 5.

De vomitu vero ut remedio, ar-
te instituto; vide infra, ubi de Pur-
gatione.

CURATIO de
mum astring-
entibus & re-
frigerantibus
aph. 7. 7.

II. DE SINGULTV.

Convulsio fit ab inanitione & repletione; Ita & singultus.

Ab hypercatbarfi, convulsio & singultus, malum.

A sanguinis copioso fluxu, convulsio aut singultus, malum.

A vomitu singultus & oculorum rubor, malum.

Ab inflammatione iecoris, singultus, malum.

Singultienti sternutatio superueniens soluit singultum.

Ἦπερ λυγμὲ ἐχομένῳ πνεύματι ἐπι-
γενόμενοι, λύουσι τὸν λυγμὸν.

DE CAPACITATIS

Abdominis affectibus præter naturam.

Et I. Hydrope.

HYdropicis si tussis superueniat malum.

CAUSAE
singultus in-
ternæ duæ,
Repletio,
inanitio.

PROGNOST.
malum à cau-
sa inaniente.
Eti Hyper-
catbarfi.

2. A Sanguinis proflu-
uio copioso.

3. A Vomitu prægressio.

4 Prognost.
malum à
causa replé-

te, vt In-
flammatio-
ne iecoris.

CYRATIO,
siue solutio
singultus,
per sternu-
tationem vl-
tro exortam.

Causæ hy-
dropis non-
nullæ hûc
referendæ,
nempe Hæ-
morrhoidû
suppressio ex
aph 12 sect.
6. & longa
dysenteria
ex aph 41.6.

35. 6.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βῆξ ἐπιγνομένη
κακόν.

Proe malū.
1. A Tussi
superuenien-
te, ob meta-
stasim aqua-
rum ad pul-
monem.

Hydropicum, si tussis habeat
desperatum est.

47.7.

Υδρωπῶντα ὡς βῆξ ἔχη, ἀνέλπι-
στὸς ἐστίν.

2. A Meta-
stasi aqua-
rum ab he-
pate ad omē
tum.

Quibus iecur aqua plenum, in
omentum eruperit, his venter
aqua repletur & moriuntur.

55.7.

Ὅ κίσεισι ἂν τὸ ἥπαρ ὑδαῖο πληθύν-
εις τὸ ἐπίπλεον ῥαγῇ, τετάρτοισιν ἢ κοι-
λὴν ὑδαῖο ἐμπιπλάται, καὶ σποδινή-
σκουσιν.

3. Progno-
sticum epi-
genesis, hy-
dropis Asci-
tis in anasar-
ca.

Albæ pituitæ, hydrops superue-
nit.

71.7.

Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὑδρωΐ ἐπιγί-
νεται.

4. Prog. ma-
lum ulcerū
hydropi su-
peruenientiū.

Hydropicis, exorta in corpore ulcera
difficulter sanantur.

SOLVITIO
spontanea
hydropis
Ascitis per
urinas.

Quibus inter ventriculum &
diaphragma, pituita concluditur,
& dolorem affert, in alterutrum
ventrem

DE AFFECTIBVS. 95

ventrem exitum non habens, his
per venas ad vesicam conuersa
pituita, morbi fit solutio.

Ὅκοσοι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς
πλευρᾶς φλέγμα ἀποκλείεται, καὶ ὁ δὲ ὄντω
παρέχει ἑκ ἑξ ὁδῶν εἰς ἐξέλκω
τῶν κοιλιῶν, ταῦτοι καὶ τὰς φλέβας
εἰς τὴν κύστιν τραπέν[θ], τὸ φλέγμα[θ]
λύσις γίνεται τῆς νόσου.

Hydrope detento, si aqua è ve-
nis in ventrem effluxerit, solutio
fit.

Solutio, hy-
dropis Af-
citis per
Diarrhœam.

14. 6.

Τὸ πρὸ ὕδρω[θ] ἐχρησάτω τὸ καὶ τὰς
φλέβας εἰς τὴν κοιλίαν ὑδαί[θ] ῥυέν-
[θ] λύσις.

Leucophlegmatia detento, si
fortis diarrhœa superuenerit,
morbum soluit.

Solutio leu-
cophlegma-
tiæ, per diag-
rœam.

29. 7.

Ἢν ὑπὸ λευκῆ φλέγμα[θ] ἐχρησάτω
διάρροια ἐπιλήπται ἰσχυρὴ, λύσις τῆς
νόσου.

Quicumque empyici, aut hydropici
vruntur, aut secantur, si pus aut aqua
vniuersim effluxerit, omnes moriuntur.

CVRATIO-
NIS hyderi
ascitis.
Cautio in
vacuationis
aquæ copia
& modo; ac
prognosticâ,

27. 6.

I

DE ABSCESSU VENTRIS.

PROGNOST.

Abscessus
ventris futu-
ri,

1. A Dolore
diuturno.

A diuturno partium circa ven-
trem dolore, suppuratio fit.

22. 6.

Ἐπὶ ἐδυνή πολυχρονίᾳ ὅς τις πύ-
κοιλίῳ ἐκπύησις.

2. A Sangui-
nis in ven-
trem effu-
sione.

Si in ventrem sanguis præter
naturam effundatur, is suppuretur
necesse est.

20. 6.

Ἦν ἐς πύκοιλίῳ αἷμα χυθῆ παρὰ
φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

DE DOLORE IN
abdomine.

PROGNOST.

1. A Situ do-
loris sublimi
vel profun-
dæ.

Dolores ventris sublimes, leuio-
res, non sublimes vero, vehemen-
tiores.

7. 6.

Τὰ ἀλγύματα τὰ ἥπι-πύκοιλίῳ
γενόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, καρότερα,
τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

2. Ab adiu-
cta refrige-
ratione ex-
tremorum.

A vehementi dolore circa ventrem ex-
tremorum refrigeratio, malum.

26. 7.

DE OMENTI PROLAPSV
per vulnus.

Si omentum exciderit, necesse Prognost.
est vt putrescat.

§8.6.

Ἡν ἐπίπλοον ἐκπέσῃ, ἀνάγκη ἀπο-
πλῶαι.

DE INTESTINORVM AF-
fectibus præter naturam.

I. De Phlegmone.

Recti intestini & vteri inflam-
mationi, renibusque purulentis,
accidit stranguria: Iecori vero in-
flammatione laboranti accidit sin-
gultus.

STRANGV-
RIA, est
Signum
Phlegmo-
nes, intestini
recti, utta-
men cum
vteri ac re-
num phleg-
mone com-
mune.

§8.6.

Ἐπὶ ἀρχῇ φλεγμαίνοντι, καὶ ὅτε ὑπέ-
ρ φλεγμαίνῃ, καὶ ὅτε νεφροῖσιν ἐμ-
πόισι στραγγεῖν ὀπρῖνεθ'. ἐπὶ δ' ἡπα-
τι φλεγμαίνοντι λυγρὸν ὀπρῖνεται.

De vulnere intestinorum, vide
§8. & 24. sect. 6.

DE ILEO.

PROGNOST.
in Ileo, a
stranguria
orto vel eius
solutionis,
a festo
perueniente
vel mortuo.

Quibus a stranguria ileus super-
venit, intra septem dies moriuntur,

I ij

nisi febre superueniente, satis vrina fluxerit. 44.6.

Ὅκοσισιν ἐκ τετρακείης εἰλεὸς, ἐν
ἐπὶ αὐτῇ ἡμέρῃσιν ἀπόλλυται, ὡς μὴ πυρετῶ
ὀπιγενομένης ἄλλως τὸ ἔργον ῥυή.

Prognost. le-
thale à per-
nicioso sym-
ptomatis
ileum con-
sequentibus.

Ab ileo, vomitus, vel singultus
conuulsio, vel desipientia, ma-
lum.

10.7.

Ἐπὶ εἰλεῶ ἑμεῖς, ἢ λυγξ, ἢ πασ-
μὸς, ἢ πῶρα φερασμὴ, κακόν.

DE COLICO DOLORE.

PROGNOST.
Metaptosecos
doloris co-
lici à flatu,
in hydro-
pem tympa-
niam.

Quibus tormina adsunt, & cir-
ca umbilicum labores, & lumbo-
rum dolor, qui nec medicamento,
nec aliter soluitur, in hydropem
siccum firmatur.

II. 4.

Ὅκοσισι σφόροι καὶ πλεὶ τὸν ὀμφαλὸν
πόντοι, καὶ ὀσφύς αἰγνημα μὴ λυόμενον
μήτε ὑπὸ φαρμακείης, μήτ' ἄλλως, εἰς
ὕδρω πα ξηρὸν ἰδρύνει.

CURATIO
Colici do-
loris tam
flatulenti
quam hu-
moralis,

Febris expertibus, si tormina accide-
rint, & genium grauitas & lumborum
dolor, inferna purgatione opus esse signifi-
cant.

20. 4.

DE ALVI FLVORE.

I. Diarrhœa.

Balbi, longo alui profluuiio, maxime corripuntur.

32. 6.

Τραυλοὶ ὑπὸ διάρροίης μάλιστα ἀλίσκονται μακρῆς.

Diarrhœæ obnoxij sūt,
1. Natura sua humidiores cerebro, quales Balbi.

Quibus per febres sanguinis copia alicunde fluxerit, his cum reficiuntur, alui humectantur.

27. 4.

2. Conualescentes ex febre, qui largam hæmorrhagiam passi.

Ὅσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἱμορραγίαι πλῆθος ἐκθερουῶν, ἐν τῇσιν ἀναλήψεσι, τελέουσιν αἱ κοιλίαι καθαυγαινόν.

Quibus in alui profluuiis, spumosa sunt excrementa, his à capite defluxio fit.

30. 7.

SIGN. DIAGNOST. diarrhœæ, quæ à Catharro à capite fit.

Ὅσοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇσι διάρροίησι, τελέουσιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα καταρρέει.

In fluxibus alui, mutationes excrementorum inuant, nisi ad praua mutatio fiat.

14. 2.

I iij

PROGNOST. bonum, in diarrhœa. ex colore excrementorum.

SOLVATIO
diarrhœæ
spontanea,
per Vomi-
tum super-
uenientem
reuellatum.

Diarrhœa longa laboranti, spon-
te vomitus superueniens, morbum
soluit.

29.7.

Ὑπὸ διάρροιας ἐχρόνως μακρῆς, ἀπὸ
ταυτομάτης ἐμεῖς ὁππότε μὲν οὐ
πῶς διάρροια.

Diarrhœa, morbis multis est saluta-
ris & veluti critica, Nempe Ophtal-
miæ aph. 17. 6. Surditati in febri-
bus aphor. 28. 4. Hydropi asciti.
14. 6. Leucophlegmatia, 29. 7. &c.

Diarrhœa morbis multis est pernicio-
sa & symptomatica, Nempe pleuri-
tidi & peripneumoniæ, aph. 16. 6.
& Phthisi, 14. 5. Ac mulieri præ-
gnanti aph. 34 5. &c.

DE DYSENTERIA.

PROGNOST.
malum.

1. A Causa
scilicet Atra-
bile.

Dysenteria, si ab atrabile inci-
piat, lethalis est.

24. 4.

Δυσεντερία ἢν ἀπὸ χολῆς μελαίνης
ἀρξῇται, θανάσιμον.

2. A Præce-
dente deie-
ctione syncæ.

A deiectione syncera, dysenteria
malum.

23. 7.

Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει δυσεντεῖν,
κακόν.

Diarrhœæ superuenit dysente- 3. A prae-
ria. dente Diar-
75. 7. rhœa.

Ἐπὶ διαρροίῃ, δυσεντεῖν.

Dysenteria superuenit lenteria. 4. A conse-
quente Lienteria.
76. 7

Ἐπὶ δυσεντεῖν λαιεντεῖν ἐπιγί-
νεται.

Dysenteria laboranti, si veluti
carunculæ deiciantur, lethale. 5. Ab ecre-
tis Caruncu-
lis.
26. 7.

Ἦν ὑπὸ δυσεντεῖν ἐχρημάτω ὁκοῖται
ἐν σέρκεσιν ὑποχωρήσῃσι, θανάσιμον.

In longis dysenteriis, cibi fasti- 6. Ab Appe-
dium, malum, & cum febre peius. tentia læsa,
3. 6. febreque ad-
iuncta.

Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντεῖνσιν αἱ
ὑποσιτίαι, κακόν. καὶ σὺν πυρετῷ, κάκιον.

Lienosis, Dysenteria superue- 7 Prognost.
niens, bonum. 48. 6. bonum si
velut criticæ
succedat lie-
nosis.

Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντεῖν ὅπῃ
γενόμενῃ, ἀγαθόν.

3. Prognost.
malum im-
modicæ Dy-
senteriae lie-
nosis con-
tingentis.

Qui lienosi, dysenteria capiun-
tur his superueniente longa dy-
senteria hydrops superuenit, aut
lienteria, & moriuntur.

43. 6.

Ὅτι οἱ πολλοὶ ὁδεῖς ἐπὶ δυσεντερίῃς
ἀλίσκοντο, τῆλε οἰσιν ἐπιχνομήνης μα-
κρῆς τῆς δυσεντερίης, ὕδρω δ' ἐπιγί-
νεται, ἢ λευκῇ, καὶ ἀπόλλυντο.

DE LIENTERIA.

PROGNOST.
BONUM in
lienteria est
ructus aci-
dus superue-
niens,

In longis lienteriiis, ructus aci-
dus superueniens, qui prius non
fuerat, signum bonum.

i. 6.

Ἐν τῇσι χρονίῃσι λευκῇσιν ὅξυ-
ρεϊσμῇ ἐπιχνομήνη, μὴ χυομήνη ποτε-
ρον, σημεῖον ἀγαθόν.

CURATIO-
NIS quæ
purgatione
fit, cautio.

Quorum alui lienteria laborant, hos
hyeme supra purgare, malum.

12. 4.

DE STRICTA ET SICCA
aluo atque humida.

Alui siccae
SIGNUM ET
CAUSA quæ-
dam est, v-
rina plurima
noctu red-
dita.

Mictio noctu plurima facta, pau-
cam significat alui deiectionem.

83. 4.

Ὀυρησις νύκτωρ πολλὴ γινώμενη, συμ-
κρῶν πρὸς τὴν χόρην σιμαίνε.

*Causa alui sicca, externa, in aëris
constitutione, statuitur, (aph. 5. & 17.
sect. 3.)*

*Quibus in iuuentute aluus est humida,
his in senectute reficcatur: quibus verò in
iuuentute aluus sicca, his senescentibus hu-
meccatur.* 20. 2.

Alui humi-
da in siccam
metaptosis
per ætates
& è contra.

*Quibus aluus est humida, si quidem
iuvenes sint, melius degunt, quàm quibus
est sicca. In senectute verò deterius de-
gunt, senescenti: us enim ut plurimum
reficcatur.*

Aluus hu-
mida & sic-
ca, qua ætate
sint causæ
salubres vel
insalubres.

53. 2.

DE HEPATIS AFFECTI- bus præter naturam.

Et 1. Inflammatione & abscessu.

Iecoris inflammationi accidit singultus.
in fine 58. 5.

SYMPTOMA
consequens
magnam he-
patis phleg-
monem.

*Ab inflammatione iecoris, sin-
gultus, malum.*

Et PROGN.
malum, est
singultus.

17. 7.

Ἐπὶ φλεγμονῇ τῇ ἡπατὶ λυγρὸν κακόν.

Prognost.
salutis aut
mortis in
Abscessu ie-
coris, ab Ex-
creto pure
post apertio-
nem Iuda-
bili v. lillau-
dabili.

Quibus suppuratum iecur adu-
ritur, si purum pus & album fluxe-
rit, euadunt, in tunica enim ipsis
pus continetur: Si vero qualis
amurca fluxerit, intereunt. 45. 7.

Ὅσοι τὸ ἥπαρ διάπνον καίον, ὡς
μὲν τὸ πύον καθαρὸν ῥυή, καὶ λευκόν, πει-
ρίνον, ἐν χιτῶνι καὶ τὸ πύον τριλέοισιν
ὄζειν, ὡς δὲ οἶον ἀμύρην ῥυή, ἀπόλλυται.

DE HYDATIDIBVS iecoris.

Prognost.
de vesiculis
iecoris aqua
refertis & in
omentum
erumpenti-
bus, unde
mors.

Quibus iecur aqua plenum, in omen-
tum eruperit, his venter aqua repletur, &
moriuntur. 55. 7.

DE DOLORE A FLATV.

Prognost.
solutionis.
Doloris fla-
tulenti hepa-
tis, per febris
epigenesim.

Quibus hepar vehementer do-
let, his febris superueniens dolo-
rem soluit. 52. 7.

Ὅσοις τὸ ἥπαρ πειροδυνάται, τρι-
λέοισι πυρετὸς ἐπιγνομένη, λύει τὸν
ὀδυνῶν.

Quibus ad hypochondrium, do-
lores sunt sine inflammatione, his
febris superueniens dolorem sol-
uit. 40. 9.

Ο κόσιοι πει το εσυχόνδειον πόνε
γίνονται ατερ φλεμονής, τείτοι πι-
ρελός επγενόμεν & λύει τον πόνον.

DE ICTERO.

Auruginosi, non valde sunt fla- Observatio.
tuosi.

72.5.

Οι ικτερόδες ε πάρι π πνευματώ-
δεές εισιν.

Ictero laborantibus, hepar du- Pognosti-
rum fieri, malum. cum malum,
in ictero, a

42. 6.

Scirrho co-
mitante,

Εν τοίτιν ικτεικοίτιν το ή παρ
σκληρόν γενέσθ, πονηρόν.

(De ictero critico vide aph. 62. &
64. sect. 4. supra in signis criticis.)

DE SPLENIS AFFECTIBVS.

Lienosis dysenteria superueniens, bo-
num.

48. 6.

PROGNOST.
BON M in
lienosis, a
Dysenteria
tempestiua
suborta &
moderata.
Malum au-
tem ab im-
moderata.

Qui lienosi, dysenteria capiuntur, his
superueniente longa dysenteria hydrops
superuenit, aut lienteria, & moriun-
tur.

43. 6.

DE HÆMORRHOIDIBVS.

Sponne natæ
Hæmorrhoi-
des morbis
quibusdam
salutares.

*Melancholicis & nephriticis, hæmor-
rhoides innata, bonum.*

11. 6.

CVRATIONIS
Cautio.

Diuturnas curanti hæmorrhoi-
das si vna non feruetur, periculum
est, ne hydrops aut phtihisis super-
ueniat.

12. 6.

*Αἱμορροΐδας ἰνδέν π χρονίας, ὡς μὴ
μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπι-
χρῆστος, ἢ φθίσις.*

DE RENVM AFFECTI-
bus præter naturam.

I. De Exulceratione & venarum
in ijs ruptione.

VRINA
CRVENTA
sponte mi-
cta signifi-
cat
1. Renum ve-
nula ruptio-
nem.

Qui sponte sanguinem min-
gunt, his à renibus venula rupta
significatur.

78. 4.

*Ὅκοσοι ἀπὸ τρωλομάτε αἷμα ἐρέουσι
τελέρισιν ἀπὸ τῆς νεφρῶν φλεβίε ρῆ-
ξιν σημαίνε.*

2. Designat
aut renum
& vesicæ
exulceratio-
nem si sit
aut sangui-
nea vel pu-
rulenta.

Si quis sanguinem aut pus meiat,
renum, aut vesicæ exulcerationem
significat.

75. 4.

Ἡν αἷμα ἢ πύον ἔρεν, τῆς νεφροῦ ἢ
τῆς κύστις ἐλκωσιν σημαίνει.

Quibus in vrina crassa, paruae
carunculæ, aut veluti capilli, vnà
exeunt, his à renibus excernuntur.

Vrina crassa
cum carun-
culis, aut
velut capil-
lis, Signum
est Renum
exulceratio-
ne affecto-
rum,

76. 4.

Ὅκοσιζιν ἐν τῇ ἔρω παχὺ εἶναι,
σαρκία μικρὰ ἢ ἄσπερ τρίχες ξυωξέρ-
χονται, τῆς κύστις ἀπὸ τῆς νεφροῦ ἐκ-
κείνεται.

DE AFFECTV, RENVM
Diuturno, & acuto, ac de Abscessu.

Quibus in vrinis bullæ superna-
tant, renalem morbum, eumque
longum fore significant.

DIAGNOSTI-
CVM ET PRO-
GNOSTICVM
Renum mor-
bi acuti aut
longi & i.
quidem ab
vrinæ su-
perficie bul-
losa.

34. 7.

Ὅκοσιζιν ἐν τῇ ἔρω ἔρι-
σσαι πομφόλυγες, νεφριτικὰ σημαί-
νει, καὶ μακρὸν πρὸ ἀρρώστου ἔσεσθαι.

Quibus in vrina pinguedo su-
pernatat & confertim exit, his re-
num morbum & acutum adesse
significat.

2. 1 Ab vrinæ
superficie
adiposa,

35. 7.

Ὅκοσιζιν λιπαρὴ ἢ ἐπίσσις καὶ ἀδρόνη,
τῆς κύστις νεφριτικὰ, καὶ ὀξεία σημαίνει.

Diagnostica
Signa Ab-
scessus re-
num interni
vel exteri.

Quibus nephriticis prædicta
signa accidunt, & præterea etiam
dolores circa spinæ musculos fiunt,
si quidem ad exteriora loca sen-
tiantur abscessum exterius futu-
rum expecta: Si vero dolores, ad
interiora loca magis vergant, ab-
scessus intus futurus, expectandus.

36.7.

Ὅκοσιζι ὃ νεφριτικοῖζιν ἐξζι τὰ
περιηρημένα συμβαίνει σημεῖα, πόνοι τε
πρὸς τὰς μύας τὰς ἐξωτερικὰς γίνονται,
ὡς καὶ πρὸς τὰς ἐξω τὰς πόδας γίνονται,
ὑπόστημα πρὸςδέχεται ἐσώμυον ἐξω. ὡς ὃ
μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς εἰσω τὰς πόδας
γίνονται, καὶ τὸ ὑπόστημα πρὸςδέχεται ἐσώ-
μυον μᾶλλον εἰσω.

STRANGU-
RIA signum
est quoque
& sympto-
ma superue-
niens Ab-
scessui re-
num.

Recti intestini & uteri inflammatio-
ni, renibusque purulentis accidit strangu-
ria, &c.

58.5.

DE STRANGURIA & Dysuria.

CURATIO
Vrinæ illi-
cidij & Me-
dicinæ diffi-
cultatis, venæ
sectione &
meri potio,
nc.

Stranguriam & dysuriam meri
potio & venæ sectio soluit, secandæ
verò interiores.

48.7.

Στραγγεῖλω καὶ δυσχεῖλω διάρρηξις
καὶ φλεβοτομὴ λύει. τέμνεται ὅτι τὰς εἴσας
φλέβας.

Dysuriam venæ sectio soluit, se-
cundæ autem interiores.

36.6.

Δυσχεῖλω φλεβοτομὴ λύει. τέμνεται
ὅτι τὰς εἴσας.

Renum & vesicæ vitia, in
valde senibus, difficulter sanan-
tur.

PROGNOST.
malum in
omnibus re-
num & ve-
sicæ morbis,
Ab ætate se-
nili desum-
ptum.

6.6.

Τὰ νεφελήκα καὶ ὁκόσα καὶ πλεονάζουσιν
ἀλγύματα, ἐργαδῶς ὑγιάζει ποῖσι
παρεσβύτησι.

DE VESICÆ AFFECTIBVS
præternaturam.

Si quis sanguinem & grumos
emittat, & stranguriam habeat, do-
lore ad perinæum & hypoga-
strium & pectinem pertingen-
te, circa vesicam loca labo-
rant.

SIGNA DIA-
GNOSTICA
vesicæ affe-
ctus.
Vrina vel
cruenta vel
purulenta,
Stranguria,
& dolor ad
pectinem aut
perinæum
vergens.

80.4.

Ἦν ἔρην αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ σπυγ-
εῖλα ἔχει, καὶ ὀδυνή, ἐμπύην ἐς τὸ πεί-
ραιον, καὶ τὸ ὑπογάσκειον, καὶ τὸν κλέινον
τὰ αὐτὰ πρὸς κύστιν νεσέειν σημαίνει.

SIGNA
Exulceratio-
nis vesicæ,
Urina scili-
cet cruenta,
aut purulen-
sa, cum quā-
mulis &
gravi odore.

Si quis sanguinem, & pus, &
squammulas mingat, & grauis
odor adsit, vesicæ exulceratio si-
gnificatur.

81. 4.

Ἦν αἷμα καὶ πύον ἔρην, καὶ λεπίδας,
καὶ ἰσχυρὴν βαρεὶν ἢ, τῆς κύστις ἑλκώσιν
σημαίνει.

Signum Sca-
biei vesicæ,
est urina
crassa & fur-
furacea.

Quibus cum urina crassa, furfu-
rea quædam simul exeunt, his ve-
sica scabie laborat.

77. 4.

Ὅσοις ἔστιν ἐν τῷ ὕδατι παχὺ ἐόντι πι-
τυρόδες σωεξέρεται, τετέοισιν ἢ κύ-
στις φωεῖται.

Signum
calculi ve-
sicæ est uri-
na arenosa.

Quibus in urinis arenosa sub-
sident, his vesica calculo labo-
rat.

97. 4.

De vulnere
vesicæ vide
Prognost.
aph. 18. 6.

Ὅσοις ἔστιν ἐν τῷ ὕδατι φαινωδὴ
ὑπὲρ τῆς, τετέοισιν ἢ κύστις λιδοῖται.

DE

DE AFFECTIBVS. III

DE MEATV VRINARIO

tumore affecto.

Quibus in meatu vrinario tu-
berculum nascitur, suppuratione
minius & ruptione facta, solutio
fit.

SOLVTIO
tumoris in
vethra nati
per suppu-
rationem.

57.7.

Ὅσοιζιν ἐν τῇ ἐρήδρῃ φῦμα φέ-
ται, τῶν τοῖσι, διαπυήσαν] & κενε-
γώτ & λύσις.

DE ARTVVM AFFECTIBVS

præter naturam.

I. de Podagra.

Mulier podagra non laborat nisi
menstrua defecerint.

QVI NON
SVNT PO-
DAGRÆ
OB NOXII,
1. Mulieres

27.6.

Γυνὴ ἐ ποδαγρίῳ, ἢν μὴ τὰ κατα-
μήνια αὐτῇ ἐκλείπῃ.

menstrua
patientes,
quorum si
retentio fiat,
podagræ
causa esse
potest

Eunuchi podagra non laborant,
nec calui fiunt.

2. Eunuchi.

28.6.

Ἐυνῆχοι ἐ ποδαγρίῳσιν, ἐδὲ φαλα-
κροὶ γίνοντ.

Pueri podagra non laborant,
ante veneris vsum.

3. Pueri ma-
sculi vene-
rem non ex-
perti vt so-
lemnem po-
dagræ cau-
sam.

30.6.

K

Πᾶς ἡ ποδαγρὶα πρὸς τὴν ἀρθροδιασμῶν.

PROGNOST.
Podagræ
Accessionis,
quo scilicet
tempore
fiat.

Dolores podagrici vere & autumnno plerumque commouentur.

55. 6.

Τὰ ποδαγρικά τὰ ἡρῶ καὶ τὰ φθινοπώρῃ κινεῖται, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

Prognost.
solutionis,
quanto tempore
finiatur.

Qui podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammatione, intra dies quadraginta conquiescunt.

49. 6.

Ὅσα ποδαγρικά νοσήματα γίνονται, πάντα ἀποφλεγμώματα ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν, ἀπακρίθονται.

CURATIO ET
S E D A T O
Podagrici
doloris orti
à fluxione
calida,
Per frigida
largam affu-
sionem, stu-
porem indu-
centem,

Articulorum tumores, & dolores sine ulcere, atque etiam podagricos & conuulsiones, plerumque frigida largè effusa leuat, & extenuat lenitque dolorem: Nam mediocris stupor dolorem soluit.

25. 5.

Τὰ ὅσα ἐν ἀρθροῖσιν οἰδήματα καὶ ἀλγύματα ἄτερ ἑλκεῶν, καὶ ποδαγρικά, καὶ ἀσπίσματα, τρέψων τὰ πλείστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχέοντος ῥηίζει τε καὶ ἱχναίνει, καὶ ὁδυνῶν λύει. γάρκη γὰρ μετρίῃ ὁδυνῆς λυτική.

DE ISCHIADE.

Quibus diuturno dolore Ischiadico vexatis, femoris caput excidit, rursusque recidit, his mucos colliguntur.

CAUSA ischiadis interna, & ab ea exorta Luxationis femoris, est succus mucidus.

59. 6.

Ὅκοισιν ὑπὸ ἰσχάδου ἐνοχλεῖται
χοινίης ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν
ἐμπήσῃ, τῆς τοῖσι μῦξαι ὀπίσθον.

Quibus, diuturno dolore ischiadico vexatis, femoris caput coxa excidit: his crus contabescit & claudicant, nisi vrantur.

PROGNOST. noxarum ab Ischiade longa imminetium.

&

60. 6.

REMEDIVM ad Vacuationem causae coniunctae, luxationem committentis.

Ὅκοισιν ὑπὸ ἰσχάδου ἐνοχλεῖται
χοινίης, τὸ ἰσχίον ἐξίσταται, τῆς
τοῖσι τὰ κεφάλαια τὸ σκέλος, καὶ χωλεῖται,
ὥστε μὴ χωρῶσιν.

DE MULIERVM AFFECTIBVS *præter naturam.*

Et I. Non prægnantium verbi gratia, vteri Phlegmone & Abscessu, &c.

SIGNVM
vteri Phleg-
mones,
1. Est Stran-
guria.

Recti intestini & vteri inflamma-
tioni renibusque purulentis accidit
stranguria, &c.

58.5.

2. Clausura
oris vteri
cum duritie.

Quibus os vteri durum est, his
coarctetur, necesse est.

54.5.

Ὁ κόσησι τὸ σῶμα τῆς ὑπερέων σκλη-
ρὸν ὄντι, ταύτησιν ἀνέλκη τὸ σῶμα τῆς
ὑπερέων ξυμμένειν.

CVRATIO
vteri absces-
sus externi.

Si qua parte vterus coxæ adia-
cet, suppurauerit, linamentis con-
cerptis curetur, necesse est.

47.5.

Ἦν ὑτέρη ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγκειμένη
διαπύησι, ἀνάγκη ἐμμυτον γίνεσθαι.

DE MENSIVM FLVORE
nimio & suppressione.

Menstruis largiùs fluentibus morbi eueniunt, deficientibus vero ab utero morbi fiunt.

Menstrui
floris tūm
suppresso
nimia ex-
cretio.

57.5.

CAVSÆ
sunt morbo-
rum mulie-
brium.

Καταμύσιων γνομύων πλειόνων νῦ-
σοι ξυμβαίνουσι, καὶ μὴ γνομύων ἀπὸ τῆς
ὑσέρης ξυμβαίνουσι νῦσοι.

Si mulier, quæ nec grauida est,
nec puerpera lac habet, ei men-
strua defecerunt.

SIGNUM
quoddam
retenti men-
strui, est lac
in muliere
viram non
experta cō-
spicuum.

39.5.

Ἦν γυνὴ μὴ κύουσα, μηδὲ τετοκῖα
γάλα ἔχη, ταύτῃ τὰ καταμύσια ἐκλέ-
λοιπε.

In fluxu muliebri, si conuulsio
aut animi deliquium superueniat,
malum.

PROGNOST.
malum in
fluxu men-
sium, est ani-
mi deliquiū.

56.5.

Ἐπὶ ῥῶ γυναικείῳ παασμὸς καὶ λειπο-
δυμία ὡς ἐπιγνήϊ, κακόν.

Mulieri sanguinem euomentī,
menstruis erumpentibus solutio
fit.

SANATIO
spontanea,
vomitus
sanguinis in
muliere, fit
fluore men-
sium ut re-
uulsiuo au-
xilio.

32.5.

Γυναικὶ αἷμα ἐμείσθῃ, τῇ καταμηνίων ῥαγήτων λύσις γίνεσθαι.

SOLUTIO
menstrui re-
tenti, inter-
dum sit hæ-
morrhagia
narium su-
borta.

Mulieri menstruis deficienti-
bus sanguis è naribus profluens,
bonum.

33. 5.

Γυναικὶ τῇ καταμηνίων ἐκλιπόντων,
αἷμα ἐκ τῇ ῥινῶν ῥυλῶναι, ἀγαθόν.

CURATIO
menstrui
Et 1. COHI-
BITIO lar-
gius fluen-
tium cucur-
bitularum
sub mam-
mis apposi-
tione,

Si menstrua sistere volueris, cu-
curbitulam quam maximam, ad
mammas appone.

50. 5.

Γυναικὶ τὰ καταμηνία ὡς βέλῃ ὀπι-
θεῖν, σικύῳ ὡς μέλισσῳ πρὸς τὴν πύλιν
προσβαλλεῖ.

tūm

PROVOCA-
TIO Re-
tentorum
lōchiorum
que à partu
remorantiū.
Aromatum
suffit.

Suffitus aromatum muliebria
ducit, sæpius verò & ad alia vti-
lis esset nisi capitis induceret gra-
uitatem.

28. 5.

Γυναικείων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀρώμα-
σι πνεῖν. πολλαχῇ δὲ καὶ εἰς ἄλλα
χρησίμη ἀνὴρ ὢν, εἰ μὴ καρτερίας
ἐνέποιε.

Mulieri menses decolores, nec
eodem semper modo & tempore
prodeuntes, purgationem indi-
cant esse necessariam.

CURATIO
Menstruum
decolorum, à
Purgatione.

35.5.

Γυναικὶ τὰ κατὰ μιλίαι ἀχρεα, καὶ μὴ
κατὰ αὐτὰ αἰεὶ γήνομα, κατὰρσι
δείδει σημαίνει.

Rigores incipiunt mulieribus
ex lumbis magis & per dorsum
ad caput perueniunt, sed & viris
parte potius posteriore corporis
quàm anteriore, veluti ex femori-
bus & cubitis; Indicio est cutis ra-
ritas, quam pilus ostendit.

Rigores &
refrigeratio-
nes, quomo-
do hant in
mulieribus
atque viris.

69.5.

Γίγκα ἀρχεται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὀσφύ-
μαλλον, καὶ διὰ νῶτα εἰς κεφαλὴν.
ἀνδράσι δὲ μᾶλλον ὅπουθεν ἢ ἐμπαρῶθεν
τὸ σῶμα, οἷον ἀπὸ τε πυχέων καὶ μη-
ρῶν. ἅταρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν, δηλοῖ δὲ
τὸ πρὸς τὴν ἀρίστην.

Mulier ambidextera, non fit.

Observatio

43.7.

Γυνὴ ἀμφιδέξις ἐστὶ γένεσις.

DE MAMMARVM

Phlegmone.

Prognost.
Maniꝯ euen-
turꝯ, in mā-
marum in-
flammati-
one.

Quibus mulieribus, in mammis
sanguis colligitur, furorem signi-
ficat.

40. 5.

Γυναιξὶν ὁ κ' ὀσθισὶν ἐς τὰς π' ὁρᾷ αἷμα
συσπρέφει, μανίῳ σημαίνει.

DE MULIERVM PRÆGNAN-

tium pathematis, ac primo de cognati-
tis atque propriis.

Conceptionis signa.

Signa CON-
CEPTIONIS.
1. Tormina
ventris, ab
exhibita
mulsam mu-
lieri ante
somnia.

Si nosse velis an mulier conce-
perit, dormituræ aquam mulsam
potui dato, & si ventris tormina
patiat, concepit, sin minus, non
concepit.

41. 5.

Γυναιξὶ καὶ ὡς δέληε εἰδέναι ἢ κύει,
ἐπὶ τὴν καθεύδειν μέλλῃ μελίχρητον δι-
δόναι πείν, καὶ ὡς μὲν σφόδρον ἔχη πᾶσι
τὴν γαστέρα, κύει, καὶ ὅτι μὴ, ὅτι κύει.

2. est Clausu-
ra oris vteri.

Quæ utero gerunt, ijs vteri os
coarctatum est.

51. 5.

Οκίσμα

Ὁ κόσμος ἐν γαστρὶ ἔχει, τετὶων τὸ
ῥμα τῆς ὑστερῶν συμμέμυκεν.

Si mulieri purgationes menstrue
essent, nec horror, nec febris su-
perueniat, & cibi fastidium acci-
dat, pragnantem esse putato.

3. Mensium
retentio
cibique fa-
stidium ab-
que horrore
& febre.

61. 5.

Ἦν γυναικὶ καθάρσεις μὴ πορδῶνται,
μήτε φέικης, μήτε πυρετὸς ὀπιγχομένη,
ἴσαι ὅ αὐτῇ παρὰ πῶσιν, λογίζεταί-
τω ἐν γαστρὶ ἔχειν.

Mulier grauida, si marem gerit
bene colorata est: si fœminam, de-
color.

SIGNVM
DIAGNOSTI-
CVM, vel ma-
ris aut femel-
læ conceptæ.

42. 5.

Γυνὴ ἔγκυος, ὡς μὲν ἀρρεν κῆται, δῖ-
χες ὄσιν. ὡς δὲ θήλυ, δὲ ὕχες.

1. A Colore
mulieris pre-
gnantis.

Fœtus mares dextra vteri par-
te, fœminæ sinistra magis gestan-
tur.

2. A positu
vario fœtus
in ventre
materno.

48. 5.

Ἐμβρυὰ τὰ μὲν ἀρσενὰ, ἐν τοῖσι δεξι-
οῖσι τὰ δὲ θήλεα, ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι
μᾶλλον.

L

*De Fœcunditatis & Sterilitatis,
causis & signis.*

SIGNVM
DIAGNOST.
fœcunditatis
Mulieris,
ab Odorato-
rum infra
suppositorũ
olfactu.

SI mulier non concipit, & sci-
re velis, an sit conceptura, ve-
stibus circumtectam subter suffi-
to, & si odor peruadere corpus
ad nares & os vsque videatur, non
sua culpa sterilem esse scito.

59.5

Τὴν δὲ λὺν μὴ λαμβάνει ἐν γαστρὶ, βέ-
λη δ' εἰδέναι εἰ λήψεται, περιχαλύψας
ἱματίοισι θυμὴν κάτω· καὶ λὺν μὲν πορδίε-
σαι σοι δοκέη ἢ οὐ μὴ διὰ τὸ σῶματος ἐς
τὰς ρίνας καὶ ἐς τὸ σῶμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴ
ἐστὶ ἐαυτῷ ἄγονός ἐστιν.

CAUSAE
sterilitatis
mulierum,

I. Intempe-
ries uteri,

Quæ frigidos & densos habent
vteros non concipiunt, & Quæ
præhumidos habent, grauidari
nequeunt, extinguatur enim in
ipsis genitura; & Quæ sicciores &
præcalidos, nam alimenti defectu

femen corrumpitur: Quæ vero
ex vtrisque moderatam naetæ
sunt temperiem, fœcundæ eua-
dunt.

E contra tē-
peries vteri,
est Causa
fœcundita-
tis.

62. 5

Ὁ κόσμος ψυχῆς καὶ πυκνῆς τὰς μήτρας
ἔχουσιν, ὁ κωϊσκέσι καὶ ὁ κόσμος κενῆς
ἔχουσιν τὰς μήτρας, ὁ κωϊσκέσιν. Ἀποσβέν-
νυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ ὁ κόσμος ξυρᾶς
μᾶλλον καὶ περικλείει. ἐοδεῖ γὰρ τῆς ἑσφῆς
φείρεται τὸ σπέρμα. Ὁ κόσμος δὲ ἐξ ἀμ-
φοτέρων πλὴν κρᾶσιν ἔχουσιν σύμμετρον, αἱ
τοιαῦται ἐπιτεκνοῖ γόνον.

Par est de maribus ratio. Aut
enim propter corporis raritatem, Causa steril.
similis in
viris.
spiritus foras dissipatur, ita vt se-
men eiaculari nequeat; Aut pro-
pter densitatem humor foras non
excernitur; Aut propter frigidita-
tem non incenditur, vt eo loci co-
aceruari possit: Aut propter cali-
ditatem idipsum euenit.

63. 5.

Παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων. ἡ

L ij

ὅτι αἰσχύνη τῶ σώματος τὸ πινυμῆ
 ἔξω φέρεται. πρὸς τὸ μὴ ἀπαπέμειν
 τὸ σπέρμα· ἢ διὰ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν
 ἢ διαχωρῆσαι ἔξω ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα ἢ
 ἐκ πλείονος, ὥστε ἀπορίζεσθαι πρὸς τὸν τό-
 πον τῶτον· ἢ διὰ τὴν δερμασίαν τὸ αὐτὸ
 τῶτο γίνεσθαι.

2. CAUSA
 ALIA sterili-
 tatis mulie-
 rum est Cor-
 poris Crassi-
 ties præter
 naturam.

Quæ præter naturam crassæ, non
 concipiunt, iis os vteri ab omento
 comprimitur, & priusquam exte-
 nuentur non concipiunt. 46.5.

Ὁ κόσμος παρὰ φύσιν παχὺ εἶσαι μὴ
 συλλαμβάνουσιν ἐν τῇ γαστρὶ, ταύτησι τὸ
 ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῆς ὑστερέων ἀποπνέζει,
 καὶ πρὶν ἢ λεπταίνεσθαι, ἐκύβιν.

DE ABORTVS CAU- sis & signis.

CAUSAE
 abortus nō-
 nullæ.

1. Gracilitas
 corporis ni-
 mia.

Quæ præter naturam tenues,
 vtero gerunt, abortiunt, do-
 nec crassiores euaserint. 44.5.

Ὁ κόσμος παρὰ φύσιν λεπταὶ εἶσαι ἐν
 γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκ πρῶτον πρὶν ἢ πα-
 χυνθῆναι.

2. Vteri Co-
 tyledorium

Quæ vero mediocriter corpora

pulentæ secundo aut tertio mense, sine manifesta causa abortiunt: his vteri acetabula mucoris sunt plena, nec præ pondere foetum continere possunt, sed rumpuntur.

Mucores?
seu lenti humores.

45.5.

Ὁ κόσμος μετέως τὸ σῶμα ἔχουσιν ἐκ-
πρώσκει διμῶνα καὶ τεμῶνα ἀτερ-
περάσι θ φανερῆς, πύτησιν αἰκοτυ-
ληδόνες μύξης μυσταῖ εἰσὶ καὶ ἐδωάνται
κρατεῖν ὑπο τῆ βαρὺς τὸ ἐμβρυον, ἀλλ'
ἀπερρήνω.

Mulieri prægnanti si alius mul-
tum profluat, periculum est ne
abortiat.

3. Alui pro-
fluvium,

4.5.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἢ κοιλίῃ
πολλὰ ῥύη, κίνδυνος ἐκτεῶσαι.

Mulieri prægnanti, si tenesmus
superueniat, abortum facit.

4. Tenes-
mus.

27.7.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα πινεσιμὸς
ἐπιγυρόμενος, ἐκτεῶσαι ποιεῖ.

Mulier vtero gerens, secta vena
abortit, & magis si foetus sit gran-

5. Remedia
Vacuantia
male usur-
pata,

L iij

scilicet venæ
sectio
& Purgatio.

124
dior.

APHORISMI

31. 5.

Aph. 1. 4.
6. Morbi a-
cuti, & fe-
bres maxi-
mæ.

Γυνή ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομήν τε
καὶ πύρετον, καὶ μᾶλλον, εἰ μῆζον εἴη
τὸ ἔμβρυον.

Aph 31. 5.
55. 5.

CAUSAE
fœtus imbe-
cillitatis, &
ex ea abor-
tus futuri.

Si prægnañti purgationes men-
struæ cursum suum teneant, bene
valere fœtum est impossibile.

60. 5.

1. Mensium
fluor in præg-
nante ordi-
natus.

Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχῃ αἱ κατὰ
στῆθος ὁρῶνται, ἀδυνάτον τὸ ἔμβρυον
ὑγιαίνειν.

2. Lactis flu-
xus è mam-
mis copio-
sus.

Mulieri grauidæ si lac è mam-
mis copiose fluat, fœtum imbecil-
lem significat; Si vero firmæ soli-
dæque mammæ fuerint, fœtum
valentiozem significant.

52. 5.

Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχῃ γάλα πῶ-
τε καὶ πῶτε ῥυή, ἀδυνάτον τὸ ἔμβρυον
σημαίνει. ὡς δὲ σπέρμα οἱ μακροὶ ἔωσιν,
ὕγιονό τε εἶναι τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

SIGNVM
PROGNOST.
abortus fu-
turi, est mā-

Quæ fœtus sunt perdituræ, his
mammæ extenuantur; Contra ve-
ro si duræ fiant, dolor aut mam-

mas, aut coxas, aut oculos, aut
enua fatigabit, nec abortiunt.

53.5.

Ὅκείσαι διαφθεῖρειν μέλλουσι τὰ ἐμ-
βρυα, ταύτησιν οἱ πῖδοι ἰσχυροὶ γίνονται.
Ἢν δὲ πάλιν σκληροὶ γένωνται, ἰδυή-
σαι ἢ ἐν τοῖσι πῖδοις, ἢ ἐν τοῖσιν ἰσ-
χυοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖ-
σι γένεσι, καὶ δὲ διαφθεῖρουν.

Si mulieri gravidæ mammæ su-
bito extenuentur, abortit. 37.5

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ὡς οἱ μαιδοὶ
ἐξ αἵφνης ἰσχυροὶ γίνονται, ἐκπτερώσκει.

Mulieri geminos ferenti, si alte-
ra mamma extenuetur, alterum
abortū edit, & siquidem dextra
mamma gracilis fiat, marem: si ve-
ro sinistra, foeminam excludit.

38.5.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ὡς ὁ ἑπερ-
μαδὸς ἰσχυρὸς γίνεται διδύμα ἐχέσθῃ, θα-
τερον ἐκπτερώσκει. καὶ ὡς ὁ δεξιὸς
ἰσχυρὸς γίνεται, τὸ ἀρσεν. ὡς δὲ ὁ ἀριστερὸς,
τὸ θῆλυ.

L iij

marum ex-
tenuatio.Durities co-
tium por-
tendit, &partium va-
riarum no-
xas innuit,Signum ab-
ortus fu-
ri
vel maris,
vel femellæ,
Est mammæ
alterius dex-
træ, aut fini-
stræ Extenuatio.

DE PARTU DIFFICILI

& secunda mora.

PROGNOST.
BONVM in
partu diffi-
cili & suffo-
catione vie-
ri, est Ster-
nutatio ob-
orta.

Mulier hystericæ aut diffi-
cultus parienti, sternutatio
superueniens bonum. 35.5.

Γυναικὶ ὑπὸ ὑπερικῶν ἐνοχλημάτων ἢ
δυσκοίᾳ, πικρὸς ἐπιγαστρικός & ἀγα-
θός.

REMEDIVM
secundinæ
moranti de-
turbādē ido-
neum, est
Sternutato-
rium.

Ad secundas deturbandas, im-
misso sternutatorio nares & os
comprime. 49.5.

Ἐς ὑπερέων ἐκπύσεως πικρὸν ἐπιπ-
δεῖς, ἐπιλαμβάνειν τὰς μυκτῆρας καὶ τὸ
σῶμα.

DE MVLIERV M PR AE-
gnantium nonnullis affectibus, cum
viris communibus. Aph. pauci.

PROGNOST.
LETHALE.
1. A Morbis
acutis in ge-
nere, præ-
gnantes in-
festantibus.

Mulierem grauidam corripi
aliquo morbo acuto, lethala-
le est. 30.5.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσῃ ὑπὸ τινὸς τοῦ
ἐξέων νοσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

Quæ mulieres grauidæ febris
aus capiuntur, & vehementer sine
manifesta causa extenuantur; hæ
difficiliter, & cum periculo pa-
iunt, aut abortientes periclitan-
tur.

2. Speciatim
à Febribus
& extenua-
tione adiu-
cta.

55. 5.

Ὁ κόσμος ἐν γαστρὶ ἔχειται ὑπὸ πυρετῶν
καμβάνοντι, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνοντι
καὶ ἀπερρώσθησαν, τίκτεσι χαλε-
πῶς καὶ ὀπικινδυνῶς· ἢ ἐκπύρῳσκειται
κινδυνεύουσιν.

Si prægnanti, fiat in vtero ery-
sipelas, lethale.

3. Ab Erysi-
pelate vteri.

43. 5.

Ἦν γυναικὶ κυέσῃ ἐρυσίπελας ἐν τῇ
ὑτέρῃ γίνηται, θανατῶδες.

DE REMEDIIS MAIORIBVS, scilicet Catharsi & Phlebotomia.

*In Curatione Morborum prægnantium
magna cautione usurpandis.*

PRægnantes purgandæ, si ma-
teria turgeat, à quarto mense
ad septimum, sed has minus, iu-

PURGATIO
quando sit
ineunda in
gravidis.

nioire autem & grauidiore foetu
abstinendum.

I. 4.

Τὰς κυήσας φαρμακδεῖν ὡς ὀργῶν
πεπλάμωα καὶ αἵχει ἐπὶ αὐτῶν, ἥσων
ὅτι πάντας τὰ ὅτι νήπια καὶ πρεσβύτερα
δὲ λαβέειν χεῖρ.

VENAE SE-
CTIO, quādo
præsertim
gravidis no-
xia.

Mulier vtero gerens, secta vena abor-
tit, præsertim si fœtus sit grandior. 30. 5.

APHORISMI
DE PARTIVM EX-
TERNARVM AFFECTIBVS
præter naturam;

Nempe solutionis continui generibus,
extra conspicuis.

ET PRIMO DE TVMORIBVS.

PROGNOST.
in Erysipela-
te,

1. A Metasta-
si humoris
foris ad in-
tra vel intus
foras.

ERysipelas foris intrò conuer-
ti, malum: intus vero foras,
bonum. 25. 6.

Ἐρυσίπelas ἐξωθεν εἰσὼ πρέπει, καὶ
ἀγαθόν. εἰσὼθεν ὅτι ἐξω, ἀγαθόν.

2. A Præce-
dente ossis
nudatione.

Ab ossis nudatione, erysipelas
malum. 19. 7.

Ἐπὶ ὅσῃ ψιλώσῃ ἐρυσίπελας, κακόν.

Ab erysipellate putredo, aut sup- 3. A Confe-
puratio, malum. 20. 7. quente no-
cha, scilicet,
Putredine
aut suppura-
tione.

Ἐπὶ ἐρυσίπελας πεδῶν, ἢ ἐν πύ-
σιν, κακόν.

Pustulæ latæ non valdè prurigi- Pustulæ, seu
nose. 9. 6. exanthema-
ta lata.

Τὰ πλατέα ἐξανθήματα ἔ πάνυ τι
κνησιώδεα.

Si in ventrem sanguis præter naturam
effusus fuerit, suppurari necesse est. 20. 6.

CAUSA, AB-
SCISSVS, est
Effusio san-
guinis extra
vasa in caui-
tates part.

Dum pus fit dolores & febres
magis accidunt, quam confecto. 47. 2.

SIGNVM
DIAGNOST.
suppuratio-
nis, seu Pu-
ris genera-
tionis.

Περὶ τὰς ἡμέρας τὸ πύς οἱ πόνοι
καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνει μᾶλλον, ἢ γενο-
μένης.

Quibus suppuratio aliqua in
corpore delitescens, nullum dat
sui signum, his ob crassitudinem
puris, aut loci delitescit. 41. 6.

CAUSA ab-
scessus oc-
culti, nec ap-
parentis, est
partis Cras-
sities aut pu-
ris.

Ὅ κοῖσοι διὰ πύον π' ἐν τῷ σώματι
π' μὴ ἀποσημαίνει, τετέοισι διὰ παχύτη-
τα τῶ πύου, ἢ τῶ τόπῳ ἐκ ἀποσημαίνει.

PROGNOST.
tumorum,
ET BONVM
quidem à
mollitie, in-
dicio coctio-
nis seu sup-
purationis.

Molles tumores boni, crudi ve-
ro mali.

67. 5.

Τὰ χαῖνα χησα, τὰ ὅ' ἐνωμα, κα-
χά.

MALVM ve-
ro à duritie,
Cruditatis
argumento.

Cancros occultos habentes,
melius est non curare : Curati
enim citius intereunt, non curati
vero longiori tempore vitam tra-
hunt.

38. 6.

CANCRI in-
terni & apo-
stemosi, Pro-
gnosticum
& Curatio-
nis cautio.

Ὅ κοῖσοι κρυπτοὶ καρχῖνοι γίνονται,
μὴ δευραπιδεῖν βέλπον. τευραπιδόμενος
ὃ ἀπόλλυται τὰ χέως μὴ δευραπιδόμενος
ὃ πλείω χρόνον διατελεῖσι.

VARICIBVS
minime sunt
obnoxij,
Calui, & ex
morbo de-
pilati.

Qui calui sunt, his varices ma-
gni non fiunt : quibus vero caluis
existentibus varices superuene-
rint, hi rursus capillati fiunt.

34. 6

Ὅ κοῖσοι φθακροὶ, τετέοισι κηροὶ με-
γάλοι ἐ γίνονται· ὁ κοῖσοι ὅ' αὖ φθακ-

οἷσιν ἔῃσι χερσὶ ἐπιγύων, πάλιν
τοὶ γίνον, δασέες.

In his frigida vtendum est, vn-
de sanguis fluit, aut fluxurus est,
non quidem super ipsa, sed circa
illa loca, vnde profluit, adhibita:
Quinetiam si quæ inflammationes
aut ardores ad rubrum & sub-
truentum colorem tendentes ex
recenti sanguine fiunt, iisdem ipsis
ad mouenda: Nam inueteratas ni-
grefacit, erysipelas etiam non vl-
ceratum iuuat, vlceratum vero
lædit.

23. 5.

Ἐν τετέοισι δὲ δεῖ πρὸ ψυχρῶ χεῖρας,
ὅκοθεν αἰμορραγέει, ἢ μέλλει, μὴ ἐπὶ
αὐτὰ. ἀλλὰ περὶ αὐτὰ ὅκοθεν ἐπιρρεῖ. καὶ
ὅκοσιν φλεγμαίνει, ἢ ὀπιρλογίσματα ἐς
τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὑφαιμὸν ῥέποντα, νεαρῶ
αἵματι, ἐπὶ ταῦτα ἐπεὶ τά γε παλαιὰ
μελαίνει. Καὶ ἐρύσιπελας τὸ μὴ ἐλκε-
ρμον ὠφελεῖ. ἐπεὶ τὸ γε ἐλκερμον
βλάπτει.

CVRATN
tumorum, à
sanguinis
fluxione, .
scilicet in-
flammatio-
nis & erysi-
pelatis, per
refrigerantia
admota, circa
originē flu-
xionis.

Tumores articulorum & dolores sine
vulcere, etiam podagricos & conuulsiones,
magna ex parte frigida large effusale-

QVIBVS spe-
ciatim tu-
moribus, &
morbis:

Remedia
Frigida &
Narcotica
profunt.

uat, & extenuat, lenitque dolorem. Nam
mediocris stupor dolorem soluit.

25. 5.

De abscessibus decretoriis: vide
supra in signis criticis.

APHORISMI DE VLCERIBVS.

PROGNOST.
in Vlceribus,
Cariem ossis
subiecti ac-
cedere,
A Diuturni-
tate vlcerū.

VLcera quaecumque annua
sunt, aut diuturniora fiunt,
in his os abscedere necesse est &
cicatrices cauas fieri. 45. 6.

Ἐλκεα ὁκόσα ἐνιαύσια γίνεται, ἢ μα-
κρότερον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάγκη ὅσέον
ἀφίστασθαι, καὶ ταῖς ἐλαῖς κοίλας γίνεσθαι.

PROGNOST.
MALVM.
1. A Glabri-
tie vicinarū
partium,
malignitatis
nota.

Vlcera circumglabra, maligna.

4. 6

Τὰ περιμάδμενα ἔλκεα, κακοήδεα.

2. Ab Hæ-
morrhagia,
ex forti pul-
su oborta.

A forti in vlceribus pulsu, hæ-
morrhagia, malum. 21. 7.

Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυσμῷ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν
αἱμορραγία, κακόν.

Hydropicis exorta in corpore
vulnera difficulter sanantur. 8.6.

3. A Corpore
habitu
vicioso hy-
dropicorum.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἑλ-
κεα ἐν τῷ σώματι, ἐρηϊδίως ὑγιαίνει.

Quibus tumores in vlceribus
apparent, ij raro conualluntur,
nec insaniunt; Quibus vero re-
pentè euanescent, si quidem po-
stica parte fuerint, conuulsiones
& tetani accidunt; si vero antica
parte mania, aut lateris dolor acu-
tus, aut empyema, aut dysenteria,
si rubri fuerint tumores.

4. A Tumo-
ribus vlceri
adiunctis, ap-
parentibus
vel euanes-
centibus,
Quæ nōxæ
prænuntien-
tur.

65.5

Ὅ κότεσι τιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαί-
νεται, ἐ μάλ' αὖ πῶνται, ἔδ' ἐ μαινόνται·
τετέων δ' ἀφανιδέντων ἐξ αίφνης, τοῖσι
μὲν ὅπιδεν πασμοὶ, ἢ τέτανοι· τοῖσι δ'
ἐμπερθεὶν μανίαι, ἢ ὀδυροὶ πλὴρ' ὀ-
ξείαι, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσεντερία, ἢ ἑρ-
πὺς δὲ τὰ οἰδήματα.

A syderatione, abscessus ossis.

77.7.

Ἐπὶ σφακελισμῷ, ἀπόστασις ὀστέου.

SYDERATIO,
seu carnis
corruptio.
Causa est os-
sis abscessus.

PROGNOST.

Malum in
carie ossis.1. A liuidi-
tate carnis.In osse ægrotante, caro liuida
malum.

2. 7.

Ἐπὶ ὅσῳ νοσίωντι σὰρξ πελιδνὴ,
κακόν.2. Ab erysi-
pelate ad-
iuncto.

Ab ossis nudatione, erysipelas malum.

2. 7.

FRIGIDVM
vlceribus
est noxium
ideoque ca-
uendum.Frigidum vlceribus mordax, cutem
obdurat, dolorem insuppurabilem facit,
nigrores, rigores febriles, conuulsiones
& distensiones efficit.

20. 5.

CALIDVM
moderatum
cuiusmodi
est suppu-
ratorum, his
Remedio est
quia dolorē
lenit, & pus
laudabile in
iis conficit.
Est tamen
noxium Vl-
ceribus pu-
tridis, v. g.
Can ris &
Phagedæni-
cis, quia Ca-
lido suppu-
ratorio, ho-
rum augere-
tur putredo,Calidum suppurationem faciens, (non
tamen in omni vlcere) maximum securi-
tatis indicium est, cutem mollit, extenuat
dolorem, sedat rigores, conuulsiones, tet-
anos mitigat, capitis grauitatem soluit, os-
sum fracturis plurimum prodest, sed præ-
cipuè denudatis, & his maximè qui in
capite vlcera habent, & iis etiam qui
moriuntur aut vlcerantur à frigore, her-
petibus denique exedentibus, sedi, pu-
dendo, vtero, vesicæ; his omnibus Calidum
amicum & decretorium, frigidum vero
inimicum & perimens.

22. 5.

Quaecumque medicamentis non sanantur, ferrum sanat: Quae ferro non sanantur, ignis sanat: Quae vero igne non sanantur, ea censere oportet immedicabilia.

CVRATIO
Vlcerum, ac praesertim Putridorum & malignorum, Quibus Remediis, ineunda.

6. 8.

Ὅσα φάρμακα ἐκ ἰῆς, σίδηρος ἰῆται· ὅσα σίδηρος ἐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται· ὅσα δὲ πῦρ ἐκ ἰῆται, ταῦτα χεὶν νομίζεν ἀνίατα.

APHORISMI DE VVLNERIBVS.

C Vi perfecta est vesica, aut cerebrum, cor, diaphragma, aut tenue quoddam intestinum, aut ventriculus, aut iecur, lethale est.

PROGNOST.
LETHALE in vulneribus, à parte Nobili vulnerata.

18. 6.

Κύστιν διακοπὴν π, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίαν, ἢ φρένας, ἢ τῆς ἐντέρον π τῆς λεπτῶν, ἢ κοιλίαν, ἢ ἥπαρ, θανάτωδες.

Si quod gracile intestinum praecisum sit, non coalescit.

24. 6.

M

Ἐντέρον ὡς διακοπή τῆς λεπτῆς ἐ-
ξυμφύεται.

2. A Parte
spermatice
præcisæ.

Præcisum os vel cartilago, vel
neruus, vel genæ particula tenuis,
aut præputium, nec augetur, nec
coalescit. 19. 6.

Ἐπὶ τῇ διακοπῇ ἐσέον, ἢ χρόνῳ, ἢ
νέκρῳ, ἢ γνάθῳ τὸ λεπτὸν, ἢ ἀκροποδίῳ,
ὅτε αὐξήσει, ὅτε ἐξυμφύεται.

3. A Tumo-
ribus adiu-
ctis, aut non
apparenti-
bus.

Quodcumque os vel cartilago,
vel neruus præcisus in corpore
fuerit nec augetur, nec coalescit. 28. 7.

Si in magnis vulneribus, & pra-
uis tumores non appareant, ingens
malum. 66. 5.

Ἢν τραυμάτων ἰσχυρῶν ἐόντων καὶ πο-
νηρῶν οἰδήματα μὴ φαίνηται, μέγα κα-
κόρ.

4. A Con-
uulsione suc-
cedente.

Conuulsio vulnere superueniens
lethalis. 2. 5.

Ἐπὶ τραύματι ἀσπασμὸς ἐπιγνώμενος,
θανάσιμος.

Quibus ex morbis acutis, aut diuturnis, aut vulneribus, aut alio modo extenuatis, atra bilis, aut velut sanguis niger subter exierit, postridie moriuntur.

5. Ab Excretionē bilis atræ, in vulneratis contingente.

23. 4.

DE VVLNERIBVS CEREBRI SPECIATIM.

Quibus præscinditur cerebrū, necesse est febrem & bilis vomitum superuenire.

SIGNA quædam DIAGNOST. Cerebri vulnerati, Febris & bilis vomitus, accedentes vulnere.

50. 6.

Ὁ κόσισιν αὐτὸ ἐλκεφθῆσθαι διακοπῇ, τετέοισιν ἀνάλκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἐμετον ἐπιγίνεσθαι.

Quibus cerebrum, occasione aliqua, fuerit valdè concussū, mutos protinus fieri necesse est.

SIGNVM Concussio- nis cerebri est Aphonia repentina,

58. 7.

Ὁ κόσισι δὲ αὐτὸ ἐλκεφθῆσθαι σπεινῇ ὑπὸ πρὸς περὶ αὐτοῦ, ἀνάλκη ἀφώνεος γίνεσθαι, παραχρῆμα.

M ij

PROGNOST.
Delirij futu-
ri, in vulne-
re seu fra-
ctura Cranii,
à profunditate seu pe-
netratione
vulneris ad
spatium va-
cuum inter
meninges &
cerebrum.

Ab ossis capitis præcisione, de-
lirium, si in vacuum vsque pene-
trauerit.

24. 7.

Ἐπὶ ὅσας διακοπὴν παρεφροσύνη, καὶ
κενέον λάβη.

PROGNOST.
malū à stu-
pore cum
delirio.

Propter plagam in capite acce-
ptam, stupor & delirium, malum.

14. 6.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς πτωὶ κεφαλῇ ἐκ πληξίς
ἢ παρεφροσύνη, κακόν.

PROGNOST.
solutionis
Sphaelli ce-
rebri, ad sa-
lutem vel
mortem.

Quibus syderatum est cere-
brum, intra dies tres intereunt: si
vero hos euaferint, sani fiunt.

50. 7.

Ὅσοισιν ἂν σφακελιῶν ὁ ἐκ κεφαλῆς,
ἐν τριπὶν ἡμερησιν ἀπόλλω. καὶ ὅταν
ταῖς διαφύωσιν, ὑγιέες γίνωνται.

A P H O R I S M I

*Ad Februm Curationem spe-
Etantes, pauci.*

Victus humidus febricitan-
tibus omnibus confert: Ma-
ximè vero pueris, & aliis omni-
bus, qui tali victu vti consueue-
runt.

CVRATIO
FEBR. VM.

Primo Vi-
ctv idoneo,
tum in qua-
litate humi-
da, ac etiam
frigida, vt-
pote febrì
contraria.

16. I.

Ἰσχυρὰ δὲ αἰτᾶται πᾶσι τοῖσι πυρεταῖν-
σι συμφέρει, μάλιστα δὲ παιδίοις, καὶ
τοῖσιν ἡσίοις, τοῖσιν ἔτι εἰς ἡμέρας
διδάσκω.

*Lac dare capite dolentibus, & febrici-
tantibus malum, &c.*

initio. 64 s.

1. Vi-
Qualitate
noxio pro-
hibito, vt la-
cte,
tum Victus
tempore
commodo;

*Si quis febricitanti cibum præ-
beat, valenti quidem robur, labo-
ranti vero, morbus.*

65. 7.

Ἢν τις πρὸ πυρετοῦ πρὸς φιλίαν δίδω, πρὸ
μὲν ὑγίαινον, ἰσχυρὸς πρὸ δὲ κάμνον, ὅ-
τι.

Demum ve-
re REMEDIO
CONVENIEN-
TI (si febris
non sit ab
humore pu-
tido) nempe
Balneo & a-
quæ Lotio-
ne.
Diariæ enim
& hæcticæ co-
curantur Re-
medio.

Si febris non ex bile sit, aqua
multa calida, capiti superfusa, fe-
brem soluit.

42. 7.

Ἡν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδα-
τος πολλῆ καὶ θερμῆ κατὰ κεφαλήν ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς, αὐτὴς τῷ πυρετῷ γίνεσθαι.

*De signis febrium Prognosticis abun-
dè, supra, in Aphorismis Prognosim spe-
ctantibus, actum fuit.*




METHODI
APHORISMORVM
DISPOSITIVÆ

SECTIO QVARTA.

PRÆSCRIBENS LEGES
THERAPEVTICAS,
*Medendi Methodum vniuersa-
lem statuentes.*

PRÆFATIO.

 Xercitationem ineunti
Medico Rationali, Ascle-
piadum scholæ sacrum,
istud in primis ob oculos versari
debet, *μη τολμη, μαλλον η γνωμη.*
Quo sancitum, Morborum
Medelam fœlici ductu, recto-
que calle incedentem Con-
silio prius maturè instituto,

Ex Hippoc.
lib. de arte.

Ex eodem
lib. de ele-
gantia.

Galen. 6.
Methodi
cap. 1.

seu *Recta* ratione auspicandam, cuius sagaci examine suscepta demum ex votis, omnis succedat medicatio. Πᾶν γὰρ τὸ ποιηδὲν τεχνικῶς, ἐν λόγῳ ἀννέχθη, μὴ ποιηδὲν ὁ μεθόδῳ ἀτέχνῳ δεικτικὸν ἐξυήθη. Quare *Therapeutice* pars Medicinæ præclarissima, merito primam agendi ordine sui partem venditat βελ-
τικῶ, *Medendi* nempe *Methodum*, *Consilium* ac *Rationem*, quæ salutifera Morborum Præsidia solerter inuenit, eorumque Vsum salubrem indicat & innuit. Altera enim, quæ tanquam Οἰκονομικὴ *Auxiliorum materiam*, siue instrumentorum ad curationem utilium, nempe Pharmacis, Chirurgis, & Diæticis materiæ, cognitionem subiicit: Primæ vt Architectonicæ subnectenda: Quandoquidem, nisi quis sit in *Methodo* ante versatus, copiosam instrumentorum medicorum suppellectilem in usum flectere nusquam valeat: contra inueniet *recta remedia* & inuentis dextere utetur, quisquis in *Medendi Methodo* est exercitatus. Huius ideo tanquam
certæ

certæ Cynosuræ ad leges collinea-
re debent Medici, certoque hoc
filo ad praxim artis dirigi, ne in
diuersum, à vera Medendi via ab-
iripiantur, aut fluctuantes cæco
ductu per vastum Medicinæ pe-
lagus errabundi ferantur.

Istius autem *Methodi Remediorum*
Inuentricis, hæc est norma, vt quidē
Primo *Indicationes certas*, veluti
Consilia, proponat; Quæ rei Agen-
dæ seu Auxilij ad Curationem
conducentis cognitionem innuūt.
Deinde *Scopos agendi* nonnullos, ad
Therapiam necessarios, ab Indi-
cationibus examussim in Auxilio
designandos, Primario, scilicet
Quid agendum, siue ad Curationem
conuerens Præsidium: Secundario
vero in eius Recto vsu, Quæ *Quan-*
titate, quo *ten pore*, Quo *loco*, *utendi*
modo & ordine vsurpandum. Quibus
nempe, æqua indicationum lance
sic expensis, perspectum fiat, &
exquisitè definitum, morbo cui-
uis Remedium idoneum:

Methodi
Remediorū
inuentricis
duæ Partes.

Q V A R E huic insistendo or-
dini Apherismos Hippocratis, ad

Institutum
authoris.

N

Medendi Methodum spectantes
seu therapeuticas leges, hoc tenui
programme disposui, quo nimi-
rum *Primarios curandi scopos*, in qui-
bus exequendis, vniuersa consistit
therapia, vno velut obtutu liceat
intueri; *Vitale* quidem, seu Naturæ
virium custodiam primo inten-
dens, Diæteticum Præsidium: sub-
inde vero *Curatiuum* scopum, nem-
pe Remedium, Affectui præter
naturam contrarium, eiusque iti-
dem genera præcipua, siue *Maiora
diætæ præsidia* (& de quibus dunta-
xat Hippocrates egit in Aphorif-
mis) vnà cum *Scopis* in eorum *usu
recto* spectandis, Indicationibus
propriis apprimè designata, ad
cuius paradigma cætera equidẽ
Scoporum curationis, seu Reme-
diorum genera, quæ hîc deside-
rantur, fas erit componere, & ea-
dem lege ac norma, ex Hippocra-
tis aliis voluminibus, nec non Ga-
leni effatis contexta diductaque
tradere.

APHORISMI
DE SCOPO VITALI,
SCILICET
CONSERVATIONE NA-
TURÆ VIRIVM

in Ægris instituenda,

*Victus seu Alimenti, præsertim
subsidio vsu recto, conuenien-
tique ratione exhibendi:*

ID EST
DE DIÆTA SEV VICTVS
RATIONE PROPRIE

sumpta,
NEMPE ALIMENTORVM VSV LE-
GITIMO IN AEGRIS

Atq; obiter, in conualescentibus & sanis:

PRIMO
DE VICTVS FORMA

IDONEA,
plena seu crassa, tenui vel exquisita.
ET QVANTITATE,
DEFFINIENDA,
sue dosi ac copia, maiori vel minori,

IMpura corpora, quò plenius
Inutries, eò magis lædes. 10.2

N ij

INDICATIO-
NE seu CON-
SILIO peti-
to, A mul-
tis rebus.
Et primo à
MORBI
CAUSA IN-
TERNA, Et
præcisè à
CAUSA EX-
TERNA infe-
stante.

Victus for-
ma tenuis
& copia
minor, pre-
scribitur.

Τὰ μὴ κατὰ τὴν σωματικὴν, ὀκείον
αὐτοῦ τῆς, μάλλον βλάψει.

3. A MORE
DIFFEREN-
TIA, in di-
urnitate vel
acutic, sua-
detur etiam
Victus for-
ma, vel te-
nuis, vel
plena.

VICTVS TENVIS & exquisitus, in
morbis longis semper, & in acutis,
vbi non conuenit, periculosus. Et
rursus qui extremè tenuis est, gra-
uis est. Nam & repletiones ad ex-
tremum progressæ, graues exi-
stunt.

4. I.

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς διαίται, καὶ ἐν
τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ παῖδες, καὶ ἐν τοῖσιν
ὀξέσιν, ἢ μὴ ὀπδέχεσθαι, σφοδρῶς. Καὶ
πάλιν αἰεὶς τὸ ἔλαττον λεπτότητι ἀφί-
μωται διαίτη, χαλεπαί. Καὶ γὰρ αἱ πλη-
ρόστες, αἰεὶς τὸ ἔλαττον ἀφίμωται, χα-
λεπαί.

3. A VICTVS
EVOQUE
FORMA DI-
VERSA inter
se collata,
Quæ forma
sit AD VI-
CIUM CVS
TODIAM
conuenien-
tior, tam in
sanis, quam

IN TENVI VICTV peccant æ-
groti, quo fit ut magis lædantur,
omnis siquidem error in eo com-
missus grauior est, quam in paulo
pleniore victu: Propterea etiam
sanis periculosus est valdè tenuis,
status & exquisitus victus, quia er-
rores grauius ferunt. Quare tenuis

peractusque victus, paulo pleniore in ægris in-
magna ex parte periculofior. dicatur.

5. I.

Εν τῇσι λεπτήσι διαίτησιν ἀμύρτανε-
σιν οἱ νοσέοντες, διό μᾶλλον βλάπτονται.
Πᾶν γὰρ τὸ σμάρτημα, ὃ ἀν γίνηται, μέγα
γίνεται μᾶλλον ἐν τῇσι λεπταῖς, ἢ ἐν τῇ-
σιν ὀλίγον ἀδροτέρῃσι διαίτησι. Διὰ τὸ
καὶ τοῖσιν ὑγιαίνειν προθυραὶ αἱ πάνυ λε-
πτὰ καὶ κατεσκηῖαι καὶ ἀκριβέες διαίται, ὅτι
τὰ ἀμύρτανά μὲν χαλεπώτερον φέρουσι.
Διὰ τὸ ἐν αἱ λεπτὰ καὶ ἀκριβέες διαίται
προθυραὶ ἐς τὰ πλεῖστα τῆς συμφορᾶς ἀδρ-
πέου.

Cum itaque Morbus peracu-
tus est, & statim extremos habet
labores; Tunc extremè tenuissi-
mo victu necesse vtendum est; V-
bi vero non, tunc pleniorẽ vi-
ctum exhibere licet, tantum à vi-
ctu tenui recedendo, quantum
morbus extremis fuerit remis-
sior.

4. A MORV
MORBI, vel
celeri ad vi-
gorem, vel
tardiori:
Itidem de-
cernitur que
Victus for-
ma vsur-
panda.

7. I.

Ὅτι μὲν οὐ κατὰ τὸ νόσημα αὐτῷ
κατὰ τὰς ἐλάττους πόδας ἔχει, καὶ τῇ ἐλάττω

N iij

λεπιοτάτη διαίτη ἀναγκᾶν χρεέσθαι
ὅκκ' ὅ μὴ, ἀλλ' ἐνδέκεται ἀδρότερος
διαίτην, τοσῶτον ὑποκαταβαίνειν, ἐκό-
σον αὖ ἢ νῦν ὁ μακροχρόνιος τῆς ἐλά-
των ἤ.

5. A TEM-
PORIBVS V-
niuersalibus
morbi, &
præsertim à
statu,

Idem im-
peratur.

Quando morbus in vigore suo
consistit; tum victu tenuissimo est
utendum.

8. I.

Ὁ κόταν ὅ ἀκμάζει τὸ νόσημα, τότε καὶ
τῇ λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκᾶν χρεέσθαι.

6. A VIRI-
BUS AEGRI,
in morbi
decursu sus-
fecturis, seu
à compara-
tione viri
ægri cum
Morbo,

Idem sta-
uitur.

Coniectari autem simul oportet, an æger cum tali victu perstare
possit ad usque morbi vigorem
anvè prius ille deficiat, nec cum
illo victu sustineri valeat, aut mor-
bus ante deficiat & remittatur.

9. I.

Συντεκμαίρεσθαι δὲ καὶ τὸν νοσέον-
τα, εἰ ἐξαρχέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ὀκ-
μὴν τῆς νόσου, καὶ πρὸτερον ἐκείνου ἀπα-
θήσει πρὸτερον καὶ ἐκ ἐξαρχέσει τῇ διαί-
τῃ, ἢ ἢ νῦν ὁ πρὸτερον ἀπαθήσει καὶ
ἀμελιωθεῖ.

7. A STATV
MORBI, (vel
statim, vel
tardius fu-
turo,

Quibus igitur vigor statim fu-
turus est, hos protinus tenuiter

alere conuenit; Quibus vero tar- *Idem do-*
 dius vigor futurus est, his in ipso *cerur.*
 vigore & paulo ante ipsum, de vi-
 ctu subtrahendum Antea verò
 plenius alendum est, vt æger suffi-
 cere possit.

10. r.

Ὁ κόσμοι μὲν οὐκ αὐτὴν τὴν ἀκμὴν αὐ-
 τῆς λέγειν διατῶν. ὁ κόσμοι δὲ ἐς ὑπε-
 ρον ἢ ἀκμὴν, ἐς ἐκείνο καὶ πρὸς ἐκείνους μι-
 κρὸν ἀραιρετέον. ἔμπροσθεν δὲ πωτέρος
 διατῶν, ὡς αὐτὸς ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

Si à Morbo cibum assumens
 quispiam non corroboratur, ali-
 mento pluri corpus vti significat:
 Si vero parcius epulanti hoc ac-
 cidat, vacuatione indigere scien-
 dum est.

8. 2.

Ἦν ἐκ νέου θροῦ λαμβάνων πε-
 ρὴ ἰσχύη, σημαίνει ὅτι πλείονι θροῦ τὸ
 σώμα χρέεται. Ἦν δὲ θροῦ μὴ λαμβά-
 νοντος, τὸ το γίγνηται, χρὴ εἰδέναι, ὅτι
 καὶ ὡς οὗτος δέξεται.

N iij

IN CONVA-
 LESCENTI-
 BUS A VI-
 RIVM IMBE-
 CILLITATE:
 Qualitas ali-
 menti indi-
 catur.

Si enim im-
 becillitas à
 cibi copia
 grauantè, o-
 riatur, tum
 Viæus te-
 nuis præscri-
 bendus, sin-
 minus, fiat à
 caco-chymia
 infestante:
 huic Purga-
 tio compe-
 tit.

IN SANES
VERO spe-
ciatim, indi-
catio Vetus
copiae, ac
paucitatis &
indolentiae, da-
ctur

1. A COR-
PORIS HA-
BITU, hu-
mido vel
secco.

2. AB AETATE
TIBVS VA-
RIIS,
Vetus quā-
ritas maior
vel minor,
praescribi-
tur.

Corporibus carnes humidās
habentibus famem imperare con-
uenit : fames enim corpora sic-
cat.

59. 7.

59. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς
σάρκας ἔχουσιν, δεῖ λιμὸν ἐμποιεῖν. Λι-
μὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

SENEs ieiunium facillime fe-
runt, deinde qui constanti sunt æ-
tate, minus adolescentes, mini-
mè verò omnium pueri, & inter
eos hi præsertim qui sunt animo
acriori præditi.

13. 1.

Γέροντες ἀρεστότατα νηεῖν φέρου-
σι. Ἰσχυρότεροι οἱ καθεσκότες ἥματα μη-
ράκια πάντων ὅ μάλιστα παῖδα τε-
τέων ὅ αὐτέων ἀφ' ἐν τύχῃ αὐτὰ εἶναι
ὅτι σφοδρότερον εἶναι.

QVI CRESCVNT, plurimum ha-
bent caloris natiui, plurimo igitur
egent alimento; alioquin corpus
absumitur; Senes vero paucum
habent calorem innatum, ideo
paucis egent alimentis, siquidem

DE SCOPO VITALI. 151
à multis extinguitur; Quapropter
etiam febres senibus, non similiter
acutæ fiunt, frigidum enim eorum
corpus.

14. I.

Τὰ αὐξανόμενα πλείστον ἔχει τὸ ἐμ-
φυτον θερμὸν. πλείους οὖν δέεται θερμῆς.
εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀσθίσκεται. Γέρουσι ὅ-
λῳ τὸ θερμὸν. διὰ τοῦτο ἄρα ὀλίγων
ἐσθλῶν τροφῶν δέονται. ὑπὸ πολλῶν γὰρ
ἀποσβέννυται. διὰ τοῦτο καὶ οἱ πυρετοὶ
τοῖσι γέρονσι ἐχθροὶ ὡς ὀξείας, ψυχρὰν
γὰρ τὸ σῶμα.

VENTRES hyeme ac vere
natura calidissimi sunt, & somni
longissimi, quare his temporibus
plura alimenta sunt exhibenda:
tunc enim caloris nativi pluri-
mum habent, ideo pluribus indi-
gent alimentis: Indicio sunt ætates
& athletæ.

1. A TEM-
PORIBUS
ANNI QUA-
TUOR, IDEM
suadetur.

15. I.

Αἱ κοιλίαι χειμῶν καὶ ἡρὸς θερ-
μώταται φύσει, καὶ ὕπνοι μακρότατοι. ἐν
πύττει οὖν τῇσιν ἄρῃσι καὶ τὰ προσάρ-
ματα πλείω δότεον. καὶ γὰρ τὸ ἐμφυτον
θερμὸν πλείον ἔχει. θερμῆς οὖν πλείον

εὐθὺς δέον. σημεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ
ἐθνηταί.

Æstate & Autumno cibi co-
piam ferunt difficillimè, Hyeme
facillimè, Vereminus.

18. 1.

Θέρει καὶ φθινοπώρῃ σίτια δυσφο-
ρότατα φέρει, χειμῶν ῥήϊστα, ἢ εὖ
δέτερον.

DE VICTVS QVA- LITATE CONVENIENTI præscribenda.

Primo. A
MORBO in-
dicatur.

Victus Qua-
litas huic cō-
traria (v.g. à
Febre, Cali-
da & sicca
intemperie,
postulatur
Humida
frig.)

2. AB AE-
TATE, CON-
SVETVDINE,
& DELECTA-
TIONE IN CI-
BO ALIQVO,

Victus humidus febricitantibus om-
nibus confert; maximè verò
pueris, & aliis qui tali victu uti con-
sueverunt.

16. 1.

Paulo deterior cibus & potus,
suauior tamen, meliori, sed ingra-
tiori, præferendus.

38. 2.

Τὸ σμικρὸν χεῖρον πρῶμα καὶ σίτιον, ἢ

DE SCOPO VITALI. 153

διον ὃ, τῷ βελπόνων μὲν, ἀνδεσέρον
ὃ, μᾶλλον αἰρετέον.

Indicatur si-
milis illis
Vidus qua-
litas.

DE VICTVS TEMPORE
idoneo eligendo.

IN accessionibus cibo abstinere
oportet, nam præbere noxium;
& cum morbi per circuitus ac-
cessionibus habent, in ipsis accessio-
nibus abstinendum.

IN MORBIS
PERIODICIS
SPECIATIM.
1. A Tempore
accessionis,
& inter-
missionis
indicatio pe-
titur Tem-
poris Vidus
idonei.

II. I.

Εν τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι
χρὴ, τὸ προσιδέναι γὰρ βλάπτει. καὶ ὅσοτα
καὶ περὶ ὧν παροξύνει, ἐν τοῖσι παρο-
ξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι χρὴ.

*Si quis febricitanti cibum præbeat:
valenti quidem robur, laboranti vero
morbis.*

2. In febril-
bus specia-
tim.

A febris in-
termittētis,
paroxysmo
& intermis-
sione.

65. 7.

Quibus per circuitus accessio-
nes fiunt, nihil dare, nec cogere;
sed adiectioni detrahare oportet
ante iudicationes.

3. A Motu
morbi pe-
riodico, &
die critico
proximo.

19. I.

Τοῖσι τῇσι περὶ δόξαι παρῴναι
 ῥητοῖσι μηδὲν δίδοναι, μηδ' ἀνασχά-
 ζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῷ περὶ δόξαι τῷ
 τῷ κρίσει.

Potus nocte
 haud assu-
 mendus.
 Sed sitis no-
 cturna som-
 no restin-
 guenda.

Qui noctu bibere appetunt, his
 d modum sitientibus, obdormire
 bonum est.

27. 5.

Ὁ κόσμος τῷ πέν ὁρέξεις νύκτωρ, τοῖ-
 σι πάνυ δειψοῖται, καὶ ἐπκοιμηθῶσιν,
 ἀγασθῶν.

*De Modo exhibendi Viæus, scilicet (ra-
 ro, vel sæpe, pluribusque vicibus) se-
 mel, aut partite; repente ac con-
 fertim, lentè aut sensim.*

VIETVE EX-
 HIBENDI
 MODVS.
 I. Statuitur
 in agris, In-
 dicatione
 sumpta, ab
 Etate,
 Tépera-
 mento,
 Tempore
 & Con-
 suetudine

Q Vos etiam semel, aut bis, plus
 aut minus, & per vices, ale-
 re conueniat, spectandum: Dan-
 dum vero aliquid tempori, regio-
 ni, ætati & consuetudini.

17. I.

Καὶ οἷσιν ἀπὸ τῆς, καὶ πλείω, ἢ
 ἐλάττω, καὶ κατὰ μέρος. Δοτέον δὲ π καὶ τῇ
 ᾠρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τῇ ἔθνε.

Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet: quæ vero breui, repente.

7. 2.

Τὸ ἐν πολλῷ καὶ ὀλίγῳ ἀεὶ πρὸς ὁμοίαν ἐσθίματα, καὶ ἀδρόως ἐπαλατρεφθῆναι δεῖ. 1α δὲ ἐν ὀλίγῳ, ἐλίγως.

Plurimum atque repente vacuare, vel replere, calefacere vel refrigerare, aut alio quouis modo corpus mouere, periculosum, &c.

in 51. 2.

Vbi fames, laborandum non est.

16. 2.

Facilius est refici potu, quam cibo.

12. 2.

Ῥᾶον πληρῆσθαι ποτῶ, ἢ σιτί.

Eorum quæ confertim & velociter nutriunt, celeres etiam fiunt excretiones.

18. 2.

Τῶν πρὸς ὁμοίαν ἀδρόως καὶ ταχέως, καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται.

2. IN CONVALESCENTIVS, INDICATUR A CORPORIS HABITU sensim, aut repente collapso reficiendo,

Cautio in inania.

QUIBUS ALIMENTIS CITO NVTRIVM.

1. In forma liquida seu Potulentis.

2. Substantia alimenti } euchyma & eupepta quæ dignoscitur celeris excretionis,

3 Potu, ut a-
qua leuissi-
ma, quæ ce-
leri calefa-
ctione & re-
frigeratione
dignoscitur.

Aqua, quæ cito calefit, & cito
refrigeratur, leuissima. 26. 5.

Ἰδὼς τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ
ταχέως ψυχόμενον, κερότατον.

QVÆ ALIMENTA,
MORBIS NONNVLIS
conueniant.

1. Vinum
dilutū, sym-
ptomatis
multis est
utile Præ-
dium.

IN anxietudine, oscitatione,
horrore vinum pari aquæ por-
tione potum Morbum soluit.

56. 7.

Ἀλύκη, χάσμη, φείκη, οἶν & ἴσ &
ἴσ & πινόμην &, λύει τὴν νόσον.

2. Vinam
meracum
quibusdam
est quoque
egregium.

Famem meri potio soluit.

21. 2.

Λιμὸν δώρηξις λύει

Dolores oculorum meri potio, aut bal-
neum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut
medicatio soluit.

31. 6.

Stranguriam & dysuriam meri potio
& venæ sectio soluit, secunda vero venæ
interiores.

48. 7.

Lac dare capite dolentibus
malum, & febricitantibus, & qui-
bus hypochondria elata & mur-
murantia, ac siticulosis malum:
Item quibus biliosæ deiectiones,
febres acutæ & copiosa sanguinis
euacuatio facta est. Lac vero dare
confert tabidis, non valde febric-
itantibus, & in febribus longis &
languidis, si nullum ex prædictis
signis adsit, & præter rationem
extenuatis.

Lac, quibus
morbis &
symptoma-
tis noxium.

Lac quibus-
nam conue-
niens ali-
mentum.

64.5.

Γάλα δίδοναι κεφαλῇ γένοι, κακόν.
κακόν ὃ καὶ πυρεταίνῃσι, καὶ οἷσιν ὑποχόν-
δρια μετέωρα διαβορθεύειζοντα, καὶ τοῖσι
διψώδεσι κακόν ὃ καὶ οἷσι χολώδεες αἱ
διαχωρήσεις, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσι πυρετοῖ-
σιν ἐῖσι, καὶ οἷσιν αἵματος πολλῆ διαχώ-
ρησις γέρονεν Ἀρμόζι ὃ τοῖσι φθινώδεσι
μηλίῳ πολλῷ πυρέσασσι δίδοναι γάλα,
καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι, καὶ βληχροῖσι,
μηδενὸς τῆς περὶ τῶν σημείων πα-
ρεόντος, ἀλλὰ λόγον ὃ ἐκτετηκόσι.

DE CONSVETVDINE IN

*Victus ratione, ac Vsu omnium
rerum non naturalium
Spectanda.*

PRÆSE-
TYM VNI-
VERSALE,
in vsu sex
rerum non
naturalium,
Consuetudi-
nem esse
spectandam
atque ser-
uandam.

CONSVETA longo tempo-
re, etiam si deteriora sint, in-
suetis minus molesta esse solent.
Quare ad insolita quoque facien-
da mutatio.

50. 2.

Τὰ ἐκ πολλῆς χρόνου σωήθεια, καὶ ἢ
χείρω, τῶν ἀσωήθων ἥσπον ἐνοχλεῖν εἴω-
θε. Δεῖ οὖν καὶ ἐς τὰ σωήθεια μετα-
βῆναι.

Speciale,
1. DE EXER-
CITIO seu la-
bore ferēdo.
In quo vis
maxima cō-
suetudinis,

Solitis laboribus affucti, quam-
uis inualidi sint aut senes, insuetis
etsi robustis ac iuuenibus facilius
ferunt.

49. 2.

Οἱ ἐνδοσμήσοι τὰς σωήθειας πένες
φέρειν, καὶ ὅσιν ἀδενέες ἢ γέροντες, τῶν
ἀσωήθων, ἰσχυρόν τε καὶ νέων, ῥᾶον φέ-
ρουσι.

2. IN VICTU,
Qualitas cō-
sueti est ser-
uanda.

*Victus humidus febricitantibus omni-
bus confert, maximè vero pueris, et aliis
qui tali victu vi consueuerunt.*

16. 1.

Quos

Quos etiam semel aut bis, plus aut
 minus, & per vices alere conueniat, spe-
 ctandum: Dandum vero aliquid tempo-
 ri, regioni, atati, & consuetudini.

17. I.

1. Victus
 quoque quā-
 titas & ex-
 hibendi mo-
 dus.
 Consuetus,
 Obseruan-
 dus.

Et hæc

De diæta, constituta, tanquam præsidio,
 Natura viribus conseruandis idoneo. Est
 tamen etiam diæta, cum pharmacia &
 chirurgia instrumentum curatiuum, af-
 fectuum præter naturam ablationi inser-
 uiens & accommodum.



APHORISMI DE SCOPO CURATIVO,

*Sine Ablatione Affectuum præ-
ter naturam per Remedia,
recta Ratione usurpa-
ta, ineunda.*

Scopus Cu-
ratiuus, Pri-
mus, atque
Communif-
simus, qui
REMEDIUM
dicitur.

Est id quod
Affectui præ-
ter naturam
auferendo
est CONTRA-
RIUM, ex
Gal. definit.
c. 89. artis
med.

REMEDIUM,
seu Auxilium Curatiuum, in
genere statuitur ab Hip-
pocrate.

CONTRARIUM,
Affectus præter naturam destructiuum.

Sive Contraria, Contrariorum Affe-
ctuum præter naturam sunt Remedia.

(*Aphor. 22. 2. sect. & lib. de flat.*)

Scopi Cura-
tini specia-
les, seu re-
media.

In specie vero
REMEDIORVM GENERA
statuuntur.

CONTRARIA Affectuum
præter naturam generibus relu-
stantia: Nempe Præseruatiua, quæ
Contraria Causis: Curatiua pro-
pria, opposita Morbis; Mitigan-
tia, aduersa Symptomatis.

Prima autem

Præcipuè inter Remedia, Cu-
rationem Morborum ineuntia, (&
de quibus in Aphor.) sunt CON-
TRARIA CAUSIS MORBORVM
INTERNIS, scilicet Contentorum
Vitiis Repugnantia: Ex quibus
nominatim,

VACVATIO contraria Humo-
rum Redundantiæ.

REPLETIO contr. Defectui seu
Inanitioni.

ALTERATIO contr. Qualita-
ti vitiosæ.

MOTVS Cohibitio, contr. Mo-
tui præter naturam, &c.

*Quæ quidem præ cæteris, ab Hippocrate
seqq. Aphor. generatim adstruuntur.*

Q Vicūque Morbi à Repletio-
ne fiūt, hos curat Euacuatio.

VACVATIO
remediū est
humorum.

O ij

quantitatis
immodicæ
seu repletio-
onis.

Et qui ab Euacuatione, Repletio,
cæterorumque Contrarietas, est
Remedium.

22. 2.

& ADIECTIO
seu REFLE-
CTIO humo-
rum defectus
seu inanitionis.

Ἀπὸ πληθύνου ὀκείου αὐτῶν νοσήματα
ἔσονται, κένωσης ἰσχύος. καὶ ὀκείου ἀπὸ κενώ-
σεως, πληθύνου. καὶ τῶν δυνάμεων ἢ ἐνεναν-
τίως.

MORVS CO-
HIBITIO hu-
morū Mo-
tus præter
naturalis fluxus
est re-
medium, &
huius duo
Modi præ-
cipui, nempe
REVULSION &
DERIVATIO.

Quicumque Morbi à fluxioni-
bus fiunt, primum fluxiones sedare
oportet, deinde quod influxit
educere.

*Sententia Aphoristica hinc spectans ex
lib. de locis.*

REDUCTIO ve-
ro, seu VA-
CVATIO EX
PARTE AF-
FECTA, Hu-
moris alicui
bi præter na-
turam quies-
centis & in-
fluxi est me-
dela.

Ὅταν μὲν νοσήματα ἀπὸ τῆς ῥέσεως
ζίνονται, τὰς ῥέσεις πᾶν καὶ πρῶτον
ἐπιτελεῖται τὸ συνερρηκτικὸν ἐξάλειν.

ALTERATIO
remediū est
intemperiei,
cum humo-
rum, cum
partium.

Quæ perfrigerata sunt, excal-
facere oportet; exceptis iis qui-
bus sanguis fluit, aut fluxurus est.

19. 5.

Ὅκοτα χατέψυκται, ἐκδερμαίνεν
δεῖ, πλὴν ὅκοσι αἰμορραγίῃ, ἢ πέλλει.

Putr calefa-
ctio refrige-
rationis, &
sic de cæt.

Extremis morbis, extrema ex-
quisite remedia optima.

CONTRARIA
seu remedia,
pari grāda
in oppositū,
debent esse
Morbo æ-
qualia, scilicet
extremis
valida, leui-
bus mitiora,

6. I.

Ἐς τὰ ἐλαττα νοσήματα, αἱ ἐλαττα
δεσπεύου ἐς ἀκριβέως, κράτισται.

Ex constitutis vero, Remediorum
Causas demolientium, precipuis generi-
bus, speciatim ferè duntaxat, de Vacua-
tione, egregia Hippocrates in Apho-
rismis protulit decreta, nec non de Re-
pletione quoque nonnulla, in præceptis
de victus ratione præpositis. De reliquis
autem Medendi Scopis, Remediisve Causas
morbiferas, internas nempe Contento-
rum vitia expugnantibus in usum fle-
tendis (v. g. Intemperiei altera-
tione, Qualitatum secundarum
emendatione, Putredinis corre-
ctione, Malignitatis coërtione,
Motus humorum pravi cohibi-
tione) pauca edixit, aut ferè nulla.

Remediorum autem genera. Mor-

O iij

BORVM variis generibus AC SYM-
PTOMATIS formaliter contraria,
neque omnino expresse eo loco attingit.
Verum hac ex lege Contrarietatis, præsti-
tuta Medicis, facili negotio invenientur,
& in Hippocratis aliis voluminibus sta-
biliter, conspiciuntur, spectabili ordine
instituto, huc si lubeat referenda.

APHORISMI
DE VACVATIONE,
HYMORVM REDVNDAN-
tiæ remedio.

AC

Primo de Vacuatione Sanguinis
per Venæ sectionem,
seu Phlebotome

Rite decernenda & administranda.

¶ QVIS AF-
FECTVS præ-
ter naturam
quodve vi-
tium indicat
PHLEBOTO-
MIAM Vt
Remedium
sibi conse-

Athletarum bonus corpo-
ris habitus ad summum ple-
nitudinis gradum perductus, pe-
riculosus est, si in extremo consti-
terit. Nec enim in eodem statu
permanere & consistere potest:

Cum vero non consistat, nec possit in melius proficere, superest ut decidat in deterius. Quamobrem, pleniorum illum corporis habitum protinus soluere expedit, ut rursus corpus nutriri incipiat. Non autem ad extremam vasorum concidentiam ducenda vacuatio, periculosum enim; sed qualis fuerit natura eius qui perferre debet, eo usque ducenda est. Sic & omnes vacuationes ad extremum perducat periculosæ, & rursus refectioes extremæ si fuerint, periculosæ.

rens & idō-
neum;
Est Corpo-
ris plenus
Habitus,
seu
ἐνεξία,
αἰσθητική,
Vel aptius,
Plethora
humorum
quatuor Vi-
tium in quan-
titate exu-
peranti: Quæ
ἐνεξίαν
inducit.

2. QVA
QUANTITA-
TE sanguis
mittendus,
Indicant æ-
gri natura
seu tempe-
ries, &
ἀσφορίαι,
quæ VIRES
ferendo pa-
res designāt
ad sanguinis
missionem
necessarias.

3. I.

Εν τοῖσι γυμνασικοῖσιν αἱ ἐπ' ἀ-
χρον ἐνεξίαι σφοδραὶ, καὶ ἐν τῷ ἐ-
χάτῳ ἔωσιν. ἢ γὰρ διώκονται μόνον ἐν
τῷ αὐτῷ, ἢ ὅτι ἀπρεμέειν. Ἐπεὶ ὅτι ἐκ
ἀπρεμέειν, ἢ δὲ πὶ διώκονται ἐπὶ τὸ
βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐπὶ τὸ
χρεῖον. Τυτῶν οὐκ εἶνεκα πλεονε-
ξίῳ λυεῖν θυμὸν μὴ βραδέως, ἵνα
πάλιν ἀρχῇ ἀναδρέψῃ λάβῃ τὸ σῶμα.
Μηδὲ τὰς θυμῶσιν ἐς τὸ ἔλαττον ἄλγιν,
σφοδρὸν γὰρ. ἀλλ' ἐκκοῖν αὐτὴν ἢ φύσις ἢ.

τῷ μέλλοντι ὁ ὑπομύειν, ἐς τὸ αἷον.
ὡσαύτως ὃ καὶ αἱ κεν ὥσπερ, αἱ ἐς τὸ ἔχα-
τον ἄγασαι, σφοδραί. καὶ πάλιν αἱ ἀνα-
φρέψας αἱ ἐν τῷ ἐλάτῳ ἔῃσι, σφοδε-
ραί.

3. QVO TEM-
PORE fan-
guis mittera-
dus?

1. Ad Præ-
cautionem
Verno tem-
pore.

Quibus sanguinem è venis
mittere confert, his verno tempo-
re secare venam oportet.

53. 7.

Ὁ κόσμος συμφέρει αἷμα ἀραιεῖσθαι
ἀπὸ τῶν φλεβῶν, τετέισι καὶ ἡ
φλεβοτομία.

2. Ad Cura-
tionem Morbi
ignatio.

In principijs Morborum si quid mō-
mendum videtur, mone: in statu autem
melius est quiescere.

29. 2.

4. QUIBUS
MORBUS ac
Symptoma-
tis in specie
Venzectio
medeatur,

1. Ruptioni-
bus.

Quæcumque ruptiones ex dorso ad
cubitos feruntur, vena sectio soluit.

22. 6.

Ὁ κόσμος ῥήγματα ἐκ τοῦ νώτου ἐς τὰς
ἀσκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομία λύει.

2. Dysuriz
& Strangu-
riz, à calida
causa & in
flamatione.

Stranguriam & dysuriam vini po-
tio & vena sectio soluit, secunda vero
interiores.

48. 7.

Dolores

DE VACVATIONE. 167

Dolores oculorum post meri potionem, & aquæ calentis balneum, vena sectione curato.

Dolori oculorum, ab inflammatione.

46.7.

Dolenti partem posteriorem capitis; recta in fronte excurrent vena secta, prodest.

QVÆ VENA SECANDA, in Cephalalgia, & posticæ partis, Vena frontis tundenda est, in Dysuria Vena Cubiti interior.

68.5

Mulier vtero gerens, secta vena abortit, eoque magis si fœtus sit grandior.

*QUIBUS SAN-
GVINIS MIS-
SIO NOXIA
interdum &
periculosa.*

30.5.

P.

DE VACVATIONE,
PER MEDICAMENTVM,
seu Purgatione Humorum
vitiosorum;

AC PRÆSERTIM

*Per aluum, aut vomitum, eius-
que usu & administratio-
ne recta.*

HUMORES *Primo, Quinam Qualesve Humores, in*
genere, ac specie Purgationem
possulant.
**qui Purga-
tionem in-
dicant ne-
cessariam.**

IN GENERE
**sunt HUMO-
RES VITIOSI**
Qualitate
sua, quique
agris noxii
ac molesti,
seu CAVAE
MORBORVM
PROFICACII
ess.

IN SPECIE
vero QUI ET
QVALES pec-
cent, & pur-
gandi sint:
INDICATIO
ducenda.

IN perturbationibus alui, &
vomitibus spontaneis, si talia
purgentur, qualia purgari oportet,
confert & facile ferunt ægri;
sin minus, contra. Sic & vasorum
euacuatio (arte præstita,) siquidẽ
fiat, qualem fieri oportet; confert
& facile perferunt, sin minus con-
tra. Spectanda proinde est re-
gio, tempus & ætas, & Morbi, in
quibus talia vacuare conueniat,
nec ne.

2. I

Εν τῇσι παραχῇσι τῆς κοιλίης, καὶ
τοῖσιν ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτομάτως γνο-
μύοισιν, ὡς μὲν οἷα δεῖ καθαίρειν κα-
θαίρων, ὁξυμφέρει τε, καὶ εὐφρόως φέρου-
σιν· ὡς δὲ μὴ, τεναντίον. Οὕτω δὲ καὶ ἡ
κενεαλγία, ὡς μὲν οἷα δεῖ γίγνεσθαι γί-
γνηται, ὁξυμφέρει τε καὶ εὐφρόως φέρουσιν·
ὡς δὲ μὴ, τεναντίον. Ἐπιδέειν οὖν δεῖ
καὶ χολικῶς, καὶ ὡρίως, καὶ ἡλικίως, καὶ νέους,
ἐν ᾗσι δεῖ, ἢ ἔ.

IN MEDICATIONIBVS, talia ex corpore educenda, qualia etiam sponte prodeuntia, iuuant. Contrario vero modo exeuntia, sistenda.

2. Ab Excretis spontanea excretionem, Euphoriam aegro conferentibus.

2. 4.

Qui humor in specie purgandus sit, etiam indicatur.

2. Ἐν τῇσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ἄξιον
ἐκ τοῦ σώματος, ἐκοῖα καὶ αὐτόματα ἰέν-
ται χηρίσμα· τὰ δὲ ἐναντίως ἰόντα, πά-
νεν.

Si qualia oportet purgentur, confert & facile ferunt: si contraria, difficulter.

3 4.

25. Ἢν οἷα δεῖ καθαίρειν καθαίρων-
ται, ὁξυμφέρει τε, καὶ εὐφρόως φέρουσι· τὰ
δὲ ἐναντία, δυσχερῶς.

P 1.

QVI PURGATIONE EVACVANDI SINT,

Corpora nempe Cacochymia scatentia signis nonnullis hic designantur.

Expurganda sunt in primis AEGRO-
RVM ET
NEVTRO-
RVM COR-
PORA, quæ
scatent Ca-
cochymia.

Sudor multus, calidus aut frigidus semper fluens, humorū copiam adesse significat; Vacuandum idcirco, robusto quidem superne, debili vero inferne.

61. 7.

Cuius signa quædam petuntur.

1. A Sudore copioso, cætinuo profuente.

Ἰδρὼς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ῥέων αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πλησμονὴν ὑγρῶν. ἀπαρχειν οὐκ ἔχει τὴν μὲν ἰσχυρῶ ἀνῶθεν, τὴν δὲ ἀδενεῖ κατωθεν.

2. A Sudore copioso, in somno erupente.

(Quo notatur etiam Cacochymia, eiusque remedium purgatio, nisi is sudor a Ciborū co-

Sudor multus, in somno factus, sine manifesta causa, significat corpus uti pluri cibo: Quod si cibum parcius assumentis hoc accadat, vacuatione indigere significat.

41. 4.

Ἰδρὼς πολὺς ἐξ ὕπνου αἰεὶ φανερῆς

ἀπὸ τῆς γαστρῆς, τὸ σῶμα σημαίνει pia prodeat
 πλεονεξία. Ὁ δὲ χεῖρ. ὡς δὲ ὁ δὲ μὴ quæ victa
 ἀμβλύνοντι τὸ το γίνηται, σημαίνει ὅτι tenui est cu-
 κεν ὡς δὲ δέξ. randa.)

Et quibus deiectiones si residere permi-
 seris, nec moueris, veluti strigmenta subsi-
 stunt, si pauca fuerint, levis est morbus: si
 multa, magnus; His confert alui purgatio.
 Quod si aluo non purgata sorbitiones de-
 deris, eo magis nocebis.

67.7.

Mulier mensis decolores, nec eodem
 semper modo & tempore prodeuntes,
 purgationem indicant necessariam.

36.5.

Si à Morbo, quispiam cibum assu-
 mens non corroboratur, alimento pluri
 corpus vti significat: Quod si parcius e-
 pulanti hoc accadat, vacuatione indigere
 sciendum est.

8.2.

P iij

3. A Deie-
 ctionibus re-
 tētis & strig-
 mentosis,
 Alui Solutio
 seu Purgatio
 indicatur.

4. A Menfi-
 bus decolo-
 ribus in mu-
 liere, caco-
 chymia eius-
 que remediū
 purgatio de-
 signatur.

Tandē CON-
 VALESCEN-
 TIVM COR-
 POR A quæ
 vires, à Victu
 nō resumūt;
 Expurgāda,
 quia huius
 imbecillita-
 tis causa est
 Caco-chymia
 à crisi nō va-
 cuata (modo
 à Ciborum
 grauante co-
 pia nō oria-
 tur.

*Qui Purgatione non sunt
evacuandi.*

i. Cacochy-
mia exper-
tes,
Sani.

Qui bona sunt corporis vale-
tudine, molestè ferunt medi-
cationes.

37. 2.

Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμα-
κὰ ἐπὶ σφύδας.

2. Intempe-
rantes in
Vitu, etiam
si Cacochy-
mi.

Qui corporis sanitate sunt præ-
diti, medicamentis purgati cito
exoluuntur, & qui pravo utuntur
cibo.

36. 2.

Οἱ ὑμεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν τῇ
φαρμακείῃ καὶ ἐν τοῖς ἐλεόμοις, ἐκλύονται
ταχέως, καὶ οἱ πονηρῶς ἐσθὲν χερόμοι.

Carnes sanas habentibus, elle-
borus periculosus, conuulsionem
enim inducit.

16. 4

Ἐλέβορος ὁ πικρὸς ποῖσι τὰς
σφύδας ὑμέας ἔχει· σπασμὸν γὰρ ἐμποι-
εῖ.

De Preparatione Purgationi præmittenda.

Concocta medicari ac mouere oportet, non vero cruda, nec in principiis, nisi turgeant (humores) vt plurimum vero non turgent.

22. I.

Πέποινα φαρμακείν κ' κινέειν,
μὴ ὠμά, μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ὡς μὴ ὄργῃ.
τὰ δ' ὅπλα πλεῖστα ἐκ ὄργῃ.

Corpora cum quispiam purgare voluerit, ea fluxilia faciat oportet.

9. 2

Et si quidem supra, velit, alius sistenda: si vero infra, laxanda.

*

70.7 *

Τὰ σώματα χεῖρ ὅκ' ἐπὶ βίλεται κα-
δαίρειν, ὡς αὖ ποιεῖν κ' ὡς μὲν ἄνω βέ-
ληται ὡς αὖ ποιεῖν, σῆσαι τὴν κοιλίαν.
ὡς δ' ἡπάτω, ὑπελῶαι.

Secunda PRAEPARATIO, est CORBORIS PARTIVM ET MEATVVM. Quæ vel est COMMVNIS vtrique Purgationi, seu per aluum, seu vomitum: Nempe APERTIO Viarū ad hepar tendentium FLUXILITATE humorum obstruentium concilianda.

P iiij

PRAEPARATIO necessaria ante Cathartici suspensionem duplex est.

Prima est humorum

CONDITIO quædam prærequisita earumque triplex, scilicet vel

eorum ORGASMVS, siue motus effusus, Vel COCTIO in crudis & putridis succis molienda & expectanda,

Ac demum FLUXILITAS arte præstanda, scilicet

Qualitatis humorum

Purgationi obstat Cor-
rectione v.g.

Crassitie attenuatione.

Tenuitatis & acrimoniae

Mitigatione, lentoris detersione, &c.

Nec non etiā
ROBUR seu
CRASSITIES,
incolumitas
ve partium
abdominis
prærequisita.

Vel SPECIA-
TRM, in Alui
Purgatione
intestinarū
laxitas præ-
mittenda.

Vel Vomitu
præponēda,
tūm Alui ad
strictio, tūm
Corporis ha-
bitus diffi-
culty solu-
bilis P R A E-
HUMECTA-
TIO Vi-
da pluri &
humido,
quiete atque
somno ineū-
da, (itidemq;
Balneo, ex 6.
epidē. sect. 5)

In omnibus morbis Partes ad umbili-
cum & imum ventrem attinentes, crassi-
tiem obtinere melius, multum vero exte-
nuari & contabescere malum. Sed hoc
quoque ad infernas purgationes periculo-
sum.

35. 2.

Qui ex ellebore difficulter su-
pra purgantur, horum corpora,
ante potionem largiori cibo &
quiete præhumeētanda.

13. 4.

Περὶ τῶν ἐλεβορέων τοῖσι μὴ ῥηιδίως
ἀνω καθαροῖσι, πρὸ τῆς πόσιος,
προὔχουσιν τὰ σώματα πλείονι τροφῇ
καὶ ἀναπαύσει.

Per quas Partes, meatúsve ido-
neos, Purgatio instituenda.

An per Aluum aut vomitum.

PURGATIO-
NIS VIA IDO-
NEA, vel per
aluum aut
vomitum.

Q Væ ducere oportet, quo ma-
ximè natura vergit, per loca

DE PURGATIONE. 175
conferentia, eo ducere oportet.

21. 1.

Ἄ δεῖ ἄγειν, ὅκτι αὐτὴ μάλιστα ῥέπει ἡ φύ-
σις, ταύτῃ ἄγειν, διὰ τῆς συμφερόντων
χωρίων.

Melancholicos vehementius in-
fra purgabis, eadem ratione con-
trariam adhibens vacuandi viam.

9. 4.

Τὸς δὲ μελαγχολικὸς ἀδρότερος τὰς
χρῆται, τῷ αὐτῷ λογισμῷ τ' ἐναντία πρε-
σιδέντες.

Vomentes difficulter & modi-
cè carnosos infernè purgabis, ca-
uendo æstatem.

7. 4.

Τὸς ὃ δυσημείας καὶ μέσως ἐνσάρκους
χρῆται, ὑποσελλομένους δέξθαι.

Graciles & ad vomendum faci-
les per superiora purgare con-
fert, cauendo hyemem.

5. 4.

Indicatur
primo ab hu-
morū Motu,
seu inclina-
tione natu-
rali in crisi

διὰ τῶν
συμφερόν-
των χωρίων,
attamen Im-
perfecta, nec
omnino ab-
soluta.

2. A Tem-
peramento,
vel Humore
dominante,
tūm melan-
cholico, tum
bilioso, &c.

3. Ab Habi-
tu corporis
agri vel gra-
cili, vel car-
noso.

4. A facili-
aut agra vo-
mendi tole-
rantia.

Τὰς ἰσχυρὰς καὶ ἐνυμίας ἀνω φαρμακείαν,
ὑποσελλομένους χειρῶν α.

5. Ab Aëre Medicari, æstate superiores po-
per Anni tē- tius partes, hyeme vero inferio-
pora Varia, res.
vel hyemē, 4.4
vel æstatem,

Corpora no- Φαρμακείαν δὲρε ὅ μὲν μᾶλλον ταῖς
stra supra ἀνω χειρῶν ὅ δὲ ταῖς κατω.

6. Ab Affe- Tabidos vero, per inferiora
ctuum præ- purgabis, cauendo supernas pur-
ternaturam gationes.
partium Qui 8.4
busdam spe- ciebus.

Purgatione Τὰς ὅ φθινώδεις, ὑποσελλομένους ταῖς
indigētibus. ἀνω [φαρμακείας.]

7. Nempe à Phthisi aut dispositione ad Phthysim
inferna pur- gatio indica- tur.

8. A Dolore Dolores supra septum trans-
supra vel in- uersum qui purgatione egent, per
fra diaphrag- superna purgandum esse signifi-
ma infestan- cant. Qui vero infra sunt, per in-
e, superna ferna.

18.4
tur inferna
purgatio, in-
anuatur.

Τὰ ὑπὲρ τῆς φρενῶν ὀδυνηματα, ὅ-
κόσπε κατάρσεως δεόντων, ἀνω φαρμακεί-
ης δεῖν ὅς τι μαλὶν δὲ ὅκόσπε ὅ κατω, κατω.

Febris experti, cibi fastidium, cordis morsus, vertigo tenebri-
fa & oris amaror, purgatione per
superna opus esse significant.

3. A Sym-
ptomatis,
ventriculi &
stomachi.

17. 4.

Ἀπυρέτω ἐόντι ὑποσιτίη, καὶ καρδίᾳ
μὸς, καὶ σκοπόδιον, καὶ σῶμα ἐκπύρε-
τον, ἀνὰ φαρμακείης δεῖξαι σημαίνει.

Febris expertibus, si tormina
acciderint, & genuum grauitas, &
lumborum dolor, inferna purga-
tione opus esse significant.

4. A Sym-
ptomatis,
ventris infe-
rioris, & ar-
tuum infe-
riorum.

20. 4

Ἀπυρέτοισιν ἐῦσιν ἡνίκα σπύρονται,
καὶ γενάτων βόρον, καὶ ὀσφύον δῆγμα,
καὶ τῶ φαρμακείης δεῖξαι σημαίνει.

Quorum ventres lenteria la-
borant, hos hyeme supra purga-
re, malum.

5. Sociatim;
& Lienteria.

12. 4

Ὁ κόσισι κοιλίαι λαιεντεριάδες,
χειμῶν φαρμακδεῖν ἀνὰ κακόν.

Sudor multus, calidus aut frigidus, sem-
pe fluens humorū copiā adesse significat,

6. Ab agri-
tandem vi-
ribus con-
sistentibus

Purgatio per *vacuandum idcirco, robusto quidem su-*
 superna vel *perne, debili vero infere* 61. 7.
 inferna, in *dicetur.*

*De Tempore, Purgationi apto
 eligendo, ac intempesti-
 uo, cauendo.*

PURGATIO
 NIS TEMPVS
 duplex.

Primum ELB
 CTIONIS, in
 Præcautione
 Morborum,
 quod vel est

ELIGENDVM
 scilicet anni
 tempus ver-
 nale,

vel EVITAN-
 SYM, scilicet
 Tempus æ-
 tiuū, & ma-
 gime sydere
 caniculæ do-
 minante.

Iterum est
 EMPVS NE-
 SSITATIS;
 Curatione
 morborum
 quod vel
 ONEVM,
 ac
 PRIMO qui-

Quibus venæsectio aut purga-
 tio confert, his verno tempo-
 re venam secare, aut purgare o-
 portet.

47. 6

Ὁ κόσμῳσι φλεβοτομῆν ἢ φαρμακείην
 συμφέρει, τὸ τέχνης πρῶτον τῷ ἡρῶ
 φλεβοτομεῖν, ἢ φαρμακείην.

Sub cane & ante canem diffici-
 les sunt purgationes.

5. 4.

Ὑπὶ κυῶα καὶ πρὸ κυῶα, ἐργάσεις αἱ
 φαρμακείαι.

In principiis morborū, si quid
 mouendum videtur, moue. In sta-
 tu autem melius est quiescere.

29. 2

Ἀρχαίων ὅς νύσσων ἡ πύδοκῃ κινέειν, κινεί· ἀκμάζουσιν ὅ ἡσυχίῳ ἔχειν βέλπεν ἔστιν.

Circa initia, & fines, omnia imbecilliora : circa statum vero vehementiora.

30. 2

Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη, πάντα ἀδενέσσει· περὶ ὅ τὰς ἀκμάς, ἰσχυρότερον.

Ratio est Aph. superioris.

Concocta medicari, & mouere oportet, non vero cruda, nec in principis, nisi turgent (humores) ut plurimum vero non turgent.

22. I

In acutis morbis raro, & in principis, medicamentis purgantibus est utendum ; Idque cum præmeditatione faciendum.

24. I

Ἐν τοῖσιν ὅξέσι πάθεσιν ὀλιγάκις, καὶ ἐν ἀρχῇσι τῇσι φαρμακείησι χρεώδης. καὶ τὸ πλεονάζειν ἡσυχίῳ ποιέειν.

dem IN OMNIBVS MORBIS,

&

Est PRINCIPIVM, in quo humores crudi, orgasmo sunt perciti.

Deinde DECLINATIO MORBI. In

qua scilicet humores tū perfecte cocti, crisi nulla vel imperfecta, haud vacuati sunt,

tunc temporis enim expurgandi metu recidunt.

Secundo. IN MORBIS ACUTIS speciatim TEMPVS PRINCIPII purgationi aptum, sed raro, &c.

duntaxat in humorū orgasmo (humores enim quieti, eo tempore crudi, non purgandi,

IN PERACUTIS autem, in quibus materia à principio organismo est effera.

Medicari in peracutis, si materia turgeat, eodem ipso die: differre enim in talibus, malum.

10. 4

TEMPUS PURGANDI idoneum est Præstatim Principium

Φαρμακὸν δ' εἶν ἐν τοῖσι λίαν ὀξέσιν, καὶ ἄργα, αὐθιμέρον. χρονίζειν δ' ἐν τοῖσι τοῖς τοῖσι κακόν.

Porro TEM- PUS PURGA- TIONI INE- PTVM atque cauendum 1. Est Principiū morbi, in quo materia cruda, quæta est, nec agitata:

Quæ iudicantur & iudicata sunt integrè, mouere non oportet, nec quidquam nouare, siue medicamentis, siue aliis irritamentis, sed finire.

20. 1

2. Status, in quo Naturæ motus fuit, nempe cō- stio humo- rum & cri- sis.

Τὰ κρίνόμενα καὶ τὰ πεκριμένα ἀρ- τίως, μὴ κινεῖν, μηδὲ νεωτεροποιεῖν μήτε φαρμακείῃσι, μήτε ἄλλοις ἐρεδι- σμαῖσιν, ἀλλ' εἶν.

3. In die Cri- sis perfectæ, & post cri- sim perfe- ctam.

Quæ relinquuntur in morbis à Crisi, recidivas facere consueuerunt.

(ideo expurganda.) 12. 2

(Post crisim tamē imper- fectā in De- clinatione morbi, tempus purgationi est idoneum, ne recidiva contingat.

Prægnantes purgandæ, si materia turgeat, à quarto mense vsque ad septimum, sed has minus: Minore vero, aut grandiore fœtu abstinentium.

QVO TEM-
PORE GE-
TATIONIS in
muliere præ-
gnante, in-
stituenda
purgatio.

I. 4.

Τὰς κυέσας φαρμακεύειν, ὡς ὅρῳ,
περὶ ἡμέρας, καὶ ἀρχὴ ἐπὶ ἡμέρας ἡσίων
τῶν πάντων. τὰ δὲ νήματα καὶ πρὸς βύτρεχ
ἐν λαβέειν καὶ χεῖρ.

DE QUANTITATE PURGATIONIS definienda,

*Seu Medicamenti Purgantis vi,
ac Mole, maiori vel mino-
ri statuenda.*

EXtremis morbis, extrema exquisitè
remedia, optima.

6. I

Quæ vacuantur, copia non
sunt æstimanda, sed si qualia aut minori,

INDICATIO
ducenda est
purgationis
lenis aut va-
lidioris.

I. A Magni-
tudine Mor-
bi, siue reces-
su à naturali
statu maiori
aut minori.

2. A viribus egri validis, aut imbecillis, ut cōsentientibus Purgatio mitior aut vehemē-
tior, & ad animi vsque deliquium, molienda indicatur.

oportet excernantur, & facile ferant: Et vbi ad animi deliquium educere conuenit, præstandum, si æger tolerare queat. 23. I.

Τὰ χαρέοντα μὴ πρὸ πλήθους τεκμαί-
ρεσθαι, ἀλλ' ὡς αὐτὸν χαρέη οἷα δεῖ καὶ φέρει
ἐν φέρεσσι, καὶ ὅκα δεῖ, μέχρι λειποθυμίας
ἄγειν, καὶ τὰ τοιαυτά ποιεῖν, ὡς ἐξαρκεσθὲν νο-
σέων.

DE MODO VSVRPAN- DAE PURGATIONIS Quantitatis,

Indicatio
huius sumi-
tur ab Axio-
mate medi-
co.

*Aut semel, ac vniuersim; aut partitis vi-
cibus, seu κατ' ἐπίκρασιν.*

OMNE NI-
MIUM ET RE-
PENTINUM
NATURAE
EST INIMI-
CUM, ideo
Purgatio co-
piōrior &
repentina,
periculōrior
partita autē
& paulatim
præstita, se-
curior.

PLurimum atque repentē va-
cuare, vel replere; calefacere,
vel refrigerare, aut alio quouis
modo corpus mouere, periculo-
sum. Omne siquidem nimium,
naturæ est inimicū. Sed quod pau-
latim fit tutum est, præsertim cū
ab altero ad alterum fit transitus.

51. 2.

Τὸ κατὰ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενεῖν, ἢ
πληρῶν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως
ἠχοτῆν τὸ σῶμα κινεῖν, σφοδρὸν. καὶ γὰρ
πάν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ δ'
κατ' ὀλίγον, ἀσφοδρὸς, καὶ ὁμοῦς ὡς καὶ πρὸς
ἐξ ἑτέρου ἐφ' ἑτέρου μεταβαίνει.

*Quicumque empyici aut hydropici
vruntur, aut secantur; si pus aut aqua
vniuersim effluxerit, omnes moriuntur.*

27. 6.

DE MOLITIONE POST
sumptionem medicamenti pur-
gantis, nonnunquam
adhibenda.

POto elleboro, corpus mo-
uendum potius, quam somno
aut quieti tradendum; Indicat
autem nauigatio, turbari motione
corpus.

14. 4.

Ἐπὶ τὴν πῆν πρὸς ἐλέβορον, πρὸς μὲν τὰς
κινήσεις τῆς σωματικῆς μάλλον ἀγειν, πρὸς
δὲ τὰς ὑπνους καὶ μὴ κινήσεις ἥσων: δι-
λοῖ δὲ καὶ ἡ ναυπλῖη, ὅτι κινήσεις τὰ
σώματα ταραττει.

Ab Affini
exemplo, ex
Vacuatione
puris & a-
quæ in hy-
dropicis &
empyicis,
docetur tu-
torem esse
purgationē
parite & sē-
sim factam,
quam con-
fertim & co-
piosè.

MEDICI MV-
NVS post Ca-
thartici sum-
ptionem, du-
plex esse po-
test.

AUT VIS ME-
DICAMENTI
CIENDA, Mo-
tu corporis
si Purgatio
satisfacere
non videa-
tur.

Q

2. VIS MEDI-
CAMENTI
REFRENAN-
DA ET SIS-
TENDA.

Somno ac
quiete,

cum si im-
modica sit
purgatio;

Tum etiam
si Humores
qui non pec-
cant, quive
corpori vti-
les sunt pur-
gari videan-
tur.

Cum elleborum magis ducere
volueris, moue corpus; Cum vero
sistere, somnum concilia, nec mo-
ucto. 15.4

Ἐπὶν βέλῃ μάλλον ἄλξιν τὸν ἐλλέβο-
ρον, κίνησ' τὸ σῶμα· ἐπὶ δὲ πᾶσαι, ὕπνον
ποιήσ', καὶ μὴ κίνησ'.

*In medicationibus, talia ex corpore
educenda, qualia sponte etiam prodeun-
tia iuuant (contrario autem modo) ex-
euntia sistenda.*

4.2

DE SIGNIS PUR- GATIONIS PERFE- ctæ & utilis.

Primò. EX-
CRETIONES,
in quibus nō
sola copia,
sed Humo-
ris Noxij
qualitas &
species, ap-
paret,

2. EUPHO-
RIA AEGRI
consequens

Qua vacuantur, copia non sunt a-
stimanda, sed si qualia oportet
excernantur & facile ferant, &c

IN 23. I

Si qualia oportet purgari, pur-
gentur, confert & facile ferunt: si
contraria, difficulter. 25.1

DE PURGATIONE. 185

Ἦν μὲν οἷα δεῖ καθαίρειν καὶ καθαίρων, ξυμφέρει τὲ, καὶ ἐν φόβῳ φέρει· τὰ δ' ἐναντία, δυσχερῶς.

A Medicamento, talia excerni eo melius, quanto plures fuerint eorum colores minimè pravi.

3. Colores hamorum excretorum varij apparentes.

in fine 21. 4.

Qui potionē medica, dum purgantur non sitiunt, purgationem integrè non absoluunt, donec sitiuerint.

4. Sitis post purgationē inducta est signum absolutæ purgationis.

19. 4

Ὁ κόσμος ἐν τῇ φαρμακοποιίᾳ μὴ διψῶσι καὶ καθαίρονται, καὶ πάντες ἔτι πίνουσιν.

De Signis Purgationis inutilis ac violentæ.

A Medicamenti potionē, convulsio lethalis.

SYMPTOMATA ab immedica Purgatione excitata.

25. 7.

Ἐκ φαρμακοποιίης ἀσθενὲς, θανάτωδες.

Q ij

Conuulsio
& singultus,

Ab immodica purgatione, con-
uulsio vel singultus superueniens,
malum.

4.5

Ἐπὶ ὑπερχαδάρσει σπασμὸς ἢ λυγ-
μὸς ἐπιγινώσκῃ, κακόν.

Conuulsio ex elleboro, letha-
lis.

1.5

Σπασμὸς ἐξ ἐλλεβόρου, θανάσιμος.

Si senibus, supra modum pur-
gatis singultus superueniat, ma-
lum.

41.7

Ἦν ὑπερχαδαρμύων τῆς πρεσβυ-
τέρου λυγξ ἐπιγίνεται, ἐκ ἀγαθόν.

PRÆCEPTVM, MEDICÆ
praxeos veluti Corollarium de
Vsu Remediorum.

OMnia secundum rationem
agenti, si non succedat se-
cundum rationem, haud protinus
ad aliud transeundum est, manen-
te eo quod à principio visum est.

§2.2

Πάντα κατὰ λόγον ποιεῖν π, καὶ μὴ γνο-
μεύων τῶ κατὰ λόγον, μὴ μεταβαίνειν ἐφ'
ἑτέρον, μένοντος τῶ δόξαν τῶ ἐξ ἀρχῆς.

*Ethac de Vacuatione, eiusque sum-
mis generibus, phlebotomia & pur-
gatione salutifera Hippocratis in A-
phorismis decreta: ut nempe de Maiori-
bus ad curationem morborum vocatis
Praesidiis, certo indicationum ductu &
consilio in usum salubrem reuocandis.*

DE MITIGATIONE

SYMPTOMATVM VEHE-
mentium quandoque
molienda.

*Ac praesertim insigniorum nem-
pe Doloris & Humorū prae-
ter naturam floris.*

Aphorismi pauci.

*Primo, De Doloris Solatione diuersis
modis inuenda.*

DVobis doloribus diuersas
partes infestantibus, qui

DOLORIS
SEDATIO fit
praecipue
tribus mo-
dis.

Et i. Impro-
priè. Sensu
DOLORIS
GRAVIORIS,
vim sensificā
totam ad se
trahentis.

vehementior est, alterius sensum
obscurat.

46. 2

Δύο πόνων ἀμα γινόμενων μὴ χεῖ τὸν
αὐτὸν τόπον, ὁ σφόδρος ἀμα εἰ τὸν
ἐτερον.

2. FRIGIDIS
STUPEFACI-
ENTIBVS,
Quæ sensum
tactus obrū-
dunt,

Tumores articulorum & dolores, etiam
podagricos & convulsiones. plerumque
frigida large effusa leuat, extenuat, lenit-
que dolorem. Nam modicus stupor dolo-
rem soluit.

25. 5

3. Propriè
dict's Ano-
dynis, nem-
pe CALEFA-
CIENTIBVS
MODERATIS,
Quæ partes
sensiles Do-
lorificè læ-
sas blandè
afficiunt, &
rare faciunt.

Calidum suppurationem faciens (non
tamen in omni ulcere) maximum secu-
ritatis est indicium, cutem molliat, exte-
nuat, dolorem lenit, &c.

in 22. 5

DE PRÆTERNATV- RALIS HUMORVM FLVORIS Remediis,

As PRIMO Humorum utilium
Effluxus sine sanguinis, seu
alius humoris naturalis,
& Vtilis

ADSTRICTIONE
*Præsidiis multis ab Hippocrate
in Aphor. præstitutis, ineunda,*

SCILICET

I. EVACVATIONE SANGVINIS,
REPULSIVA, seu arte præstita, seu
naturali: v. g. *menstruorum fluxu, in
vomitu sanguinis.* aphor. 32. 5

2. CUCURBITULARVM APPOSI-
TIONE IN PARTE OPPOSITA: v. g.
ad mammas in mensium fluore immodico.
50. 5.

3. REFRIGERANTIBVS ET AS-
TRINGENTIBVS MEDICAMENTIS
INTVS SVMPPTIS: v. g. *in vomitu
sanguinis.* 37. 7

4. IISDEM MEDICAMENTIS, ex-
trà circa originem fluxionis ad-
motis: v. g. *in omni sanguinis fluxu.*
23. 5

5. SOMNIFERIS ET QUIETE AD-
HIBITIS: v. g. *in Purgatione nimia hu-
morum vitilium per aluum.*

190 APHOR. DE HUM. PURG.

Secundò, De humorum inutilium
profluvij, sed copia immoderati, CO-
HIBITIONE quoque præstanda, iisdem
videlicet auxiliis. statuitur

aph. 31. & 32. 2

Tertiò, De humorum vitiosorum
profluvij, deficientis & imperfecti,
PROMOTIONE tentanda. statuitur
aph. 21. 1

DEMVM vero De Humorum no-
xiorum & inutilium, Excretionem & va-
cuationem perfectam & moderatam (tam
spontaneam & criticam, quam arte institu-
tam) non sistendam, nec etiam ullis auxiliis
promouendam, sed SINENDAM, & NA-
TURÆ SOLI PERMISSIONE CON-
CEDENDAM. statuitur aph. 20. 1

Aliorum quoque symptoma-
tum Mitigationem prodit Hip-
pocrates in aphor. Puta Convulsio-
nis & Rigoris, &c.

22. & 25. & 21. 5. sect.

FINIS.

tra. Purg.

namque insulana

moderat, Co-

regenda, Nemo

namur

ph. 1. & 11. 1

non vultum

imperfectum,

namur

aph. 11. 1

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

namur

